CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Point fixe quand f([a, b]) ⊂ [a, b]

Énoncé

Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continue telle que $f([a, b]) \subset [a, b]$. Montrer que f admet un point fixe.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f continue sur $[a, b]$.
- Pour tout $x \in [a, b]$, $f(x) \in [a, b]$.

Ce qu'on te demande. Trouver $x \in [a, b]$ tel que $f(x) = x$.

Corrigé

1. La fonction auxiliaire

On pose $\varphi(x) = f(x) - x$ sur $[a, b]$. Elle est continue comme différence de fonctions continues. Un point fixe de f est un zéro de φ.

2. Signe en a

Par hypothèse, $f(a) \in [a, b]$, donc $f(a) \geqslant a$ et $\varphi(a) = f(a) - a \geqslant 0$.

3. Signe en b

De même, $f(b) \in [a, b]$, donc $f(b) \leqslant b$ et $\varphi(b) = f(b) - b \leqslant 0$.

4. Conclusion

φ est continue sur $[a, b]$, positive en a et négative en b. Par le théorème des valeurs intermédiaires, elle s'annule en un $x \in [a, b]$: $f(x) = x$.

Le piège

Oublier que $\varphi(a)$ et $\varphi(b)$ peuvent être nuls : les inégalités sont larges, et le TVI s'applique quand même.

La méthode

Pour un point fixe, étudie $\varphi(x) = f(x) - x$ et montre qu'elle change de signe.

Rappels de cours utilisés

- **Opérations sur les fonctions continues.** Sommes, produits, quotients (dénominateur non nul) et composées de fonctions continues sont continues. Les fonctions usuelles sont continues sur leur domaine. $x \mapsto |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$.
- **Théorème des valeurs intermédiaires.** Si f est continue sur un intervalle I et si $a, b \in I$, alors f prend toutes les valeurs comprises entre $f(a)$ et $f(b)$. En particulier, si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes opposés, f s'annule entre a et b.