

OMS - Troubles anxieux

Il arrive à tout le monde de ressentir de l'anxiété par moments. Chez les personnes atteintes de troubles anxieux, cependant, la peur et l'inquiétude sont fréquentes, intenses et excessives. Ces sentiments s'accompagnent fréquemment d'une tension physique et d'autres symptômes comportementaux et cognitifs. Ils sont difficiles à maîtriser, entraînent une détresse importante et peuvent durer longtemps en l'absence de traitement. Les troubles anxieux perturbent les activités courantes et peuvent entraver la vie quotidienne sur le plan familial, social, scolaire ou professionnel.

D'après les estimations, les troubles anxieux touchent actuellement 4,4 % de la population mondiale (1) . En 2021, 359 millions de personnes dans le monde en étaient atteintes, ce qui en fait la catégorie de troubles mentaux la plus répandue (1) .

Alors qu'il existe des traitements très efficaces contre ces troubles, seule une personne sur quatre qui en auraient besoin (27,6 %) en bénéficie actuellement (2). Plusieurs facteurs font obstacle aux soins, notamment le manque d'informations sur le caractère traitable de ces troubles, l'insuffisance des investissements dans les services de santé mentale, la pénurie de soignantes et de soignants qualifiés et la stigmatisation sociale.

Les personnes présentant un trouble anxieux peuvent ressentir de la peur ou des inquiétudes excessives par rapport à une situation donnée (par exemple, une attaque de panique ou une situation sociale) ou, dans le cas du trouble anxieux généralisé, par rapport à un large éventail de situations du quotidien. Généralement, elles présentent ces symptômes pendant une longue période (plusieurs mois au moins) et cherchent à éviter les situations qui suscitent leur anxiété.

Les troubles anxieux peuvent également entraîner d'autres symptômes, tels que :

Les troubles anxieux majorent le risque de dépression et de troubles liés à l'usage de substances psychoactives, ainsi que le risque de pensées et de comportements suicidaires.

Il existe plusieurs types de troubles anxieux, tels que :

Une même personne peut connaître simultanément plusieurs troubles anxieux. Souvent, les symptômes débutent pendant l'enfance et l'adolescence et persistent à l'âge adulte. Les femmes et les filles sont plus sujettes à ces troubles que les hommes et les garçons.

Les troubles anxieux, comme les autres problèmes de santé mentale, découlent d'interactions complexes entre des facteurs sociaux, psychologiques et biologiques. Tout le monde peut présenter un trouble anxieux, mais les personnes qui ont vécu des abus, connu de graves pertes ou traversé d'autres difficultés sont plus exposées à ce risque.

Les troubles anxieux sont étroitement liés à la santé physique, qui a elle-même une influence sur eux. De nombreuses conséquences de l'anxiété (par exemple, tensions physiques, hyperactivité du système nerveux ou usage nocif de l'alcool) sont également des facteurs de risque d'autres maladies, notamment cardiovasculaires. D'autre part, les personnes qui ont ces maladies présentent souvent des troubles anxieux qui découlent des difficultés rencontrées dans la prise en charge.

Des approches communautaires efficaces permettent de prévenir l'anxiété, notamment l'éducation parentale et des programmes scolaires visant à améliorer les compétences socioémotionnelles et à renforcer la capacité des enfants et des adolescents à faire face et à s'adapter de façon positive. Des programmes fondés sur la pratique d'exercice physique peuvent aussi s'avérer efficaces pour prévenir les troubles

anxieux chez l'adulte.

Il existe plusieurs traitements efficaces contre les troubles anxieux. Les personnes qui ont des symptômes d'anxiété doivent consulter.

Les psychothérapies sont des traitements essentiels contre les troubles anxieux. Elles prennent le plus souvent la forme d'une thérapie par la parole, dans laquelle on échange avec un(e) thérapeute professionnel(le) ou non-professionnel(le) encadré(e). Grâce à ces psychothérapies, les personnes apprennent à réfléchir autrement et à s'adapter, mais aussi à appréhender leur anxiété et leur rapport aux autres et au monde. Elles apprennent à faire face aux situations, aux événements, aux personnes ou aux lieux qui déclenchent leur anxiété.

Des psychothérapies peuvent être organisées pour une personne ou un groupe, en présentiel ou en ligne. Elles peuvent aussi être menées par la personne elle-même, au moyen de manuels, de sites Web ou d'applications ? on parle alors d'auto-prise en charge. Celles qui se fondent sur les thérapies comportementales et cognitives (TCC) sont les plus solidement étayées pour le traitement d'un large éventail de troubles anxieux. La thérapie par exposition, qui consiste à aider les gens à affronter leurs peurs, appartient à cette catégorie.

En outre, l'apprentissage de la gestion du stress, par exemple les techniques de relaxation et de pleine conscience, peut contribuer à réduire les symptômes des troubles anxieux.

Les antidépresseurs, tels que les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), peuvent également être utiles dans le traitement des adultes présentant des troubles anxieux. Les soignantes et les soignants doivent tenir dûment compte des effets indésirables éventuels de ces médicaments, des moyens disponibles pour l'une ou l'autre de ces catégories d'interventions (compétences et/ou traitements disponibles), et des préférences personnelles.

Les benzodiazépines, longtemps prescrites dans cette indication, ne sont généralement pas recommandées pour la prise en charge des troubles anxieux car elles comportent un risque élevé de dépendance et ont une efficacité limitée à long terme.

L'auto-prise en charge joue un rôle important à l'appui du traitement. Ainsi, pour maîtriser ses symptômes d'anxiété et améliorer son bien-être, il est recommandé :

Le Plan d'action global pour la santé mentale 2013-2030 de l'OMS présente les mesures nécessaires pour mettre en œuvre des interventions adaptées pour les personnes qui ont des troubles de santé mentale, y compris celles qui présentent des troubles anxieux.

Le trouble d'anxiété généralisée et le trouble panique figurent parmi les problèmes de santé mentale prioritaires couverts par le Programme d'action Comblant les lacunes en santé mentale (mhGAP). Ce programme a pour but d'aider les pays à élargir les services destinés aux personnes atteintes de troubles mentaux, neurologiques ou liés à l'utilisation de substances psychoactives, moyennant des soins dispensés par des soignants qui ne sont pas spécialisés en santé mentale.

L'OMS a élaboré de courts manuels qui présentent des interventions psychologiques qui peuvent être dispensées par des thérapeutes non professionnels aux individus et aux groupes. Ces interventions ont démontré leur efficacité pour de nombreux problèmes de santé mentale, dont l'anxiété et la dépression. Le manuel Gestion des problèmes Plus (PM+), par exemple, se fonde sur les principes de la TCC et utilise des techniques telles que la gestion du stress, la thérapie par la résolution des problèmes et le renforcement du soutien social. En outre, le cours Self-Help Plus (SH+) de gestion du stress en groupe, et l'ouvrage

d'auto-prise en charge Faire ce qui compte en période de stress , très apprécié, présentent des compétences utiles pour réduire l'anxiété et le stress.

(1) 2021 Global Burden of Disease (GBD) [base de données en ligne]. Seattle: Institute for Health Metrics and Evaluation; 2024 (<https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/> , consulté le 13 août 2025).

(2) Alonso J, Liu Z, Evans-Lacko S, et al. Treatment gap for anxiety disorders is global: results of the World Mental Health Surveys in 21 countries. *Depress Anxiety*. 2018; 35(3):195-208. doi:10.1002/da.22711.