1. 20 litres of H_2 gas at S.T.P. weigh about.
(1) 12.2g
(2) 448g
(3) 1.8g
(4) 20g

2. For combustion of 10 ml mixture of methane (CH_4) and propane (C_3H_8), 41 ml O_2 is required then composition of mixture is -
(1) 3 ml CH_4 + 9 ml C_3H_8
(2) 5 ml CH_4 + 5 ml C_3H_8
(3) 3 ml CH_4 + 7 ml C_3H_8
(4) 1 ml CH_4 + 9 ml C_3H_8

3. Which of the following oxides of nitrogen have 30.5% nitrogen -
(1) NO
(2) NO_2
(3) N_2O_3
(4) N_2O_5

4. 20 g of an ideal gas contains only atoms of S and O occupies 5.6 L at 1 atm and 273 K. What is the mole weight of gas -
(1) 64
(2) 80
(3) 96
(4) None

5. 80 gram of NH_4NO_2 gives 16.8 Ltr of $N_2(g)$ at STP on complete decomposition. Percentage purity of NH_4NO_2 will be -
(1) 40%
(2) 60%
(3) 75%
(4) 90%

6. A mixture of gases contains CH_4 and O_2 gases in the ratio 1 : 4 (w/w). What is the molar ratio of the two gases in the mixture -
(1) 16 : 1
(2) 8 : 1
(3) 1 : 2
(4) 1 : 4

1. S.T.P. पर H_2 गैस के 20 लीटर का भार लगभग है
(1) 12.2g
(2) 448g
(3) 1.8g
(4) 20g

2. मैथेन (CH_4) तथा प्रोपेन (C_3H_8) के 10ml मिश्रण के दहन के लिए 41 ml O_2 की आवश्यकता होती है तो मिश्रण का संगठन होगा-
(1) 3 ml CH_4 + 9 ml C_3H_8
(2) 5 ml CH_4 + 5 ml C_3H_8
(3) 3 ml CH_4 + 7 ml C_3H_8
(4) 1 ml CH_4 + 9 ml C_3H_8

3. निम्न में से कौनसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड में 30.5% nitrogen है -
(1) NO
(2) NO_2
(3) N_2O_3
(4) N_2O_5

4. सल्फर तथा ऑक्सीजन परमाणुओं से बनी एक आदर्श गैस के 20 g का 1 atm तथा 273 K पर आयतन 5.6 L है। गैस का मोलर द्रव्यमान होगा -
(1) 64
(2) 80
(3) 96
(4) कोई नही

5. 80 ग्राम, NH_4NO_2 के पूर्ण विघटन से STP पर 16.8 लीटर $N_2(g)$ मुक्त होती है। NH_4NO_2 की प्रतिशत शुद्धता होगी -
(1) 40%
(2) 60%
(3) 75%
(4) 90%

6. एक गैस के मिश्रण में CH_4 तथा O_2 गैस का अनुपात 1 : 4 (w/w) है। मिश्रण में इन दोनों गैसो का मोलर अनुपात है -
(1) 16 : 1
(2) 8 : 1
(3) 1 : 2
(4) 1 : 4

Scanned with CamScanner

7. The number of moles of $CaCO_3$ which contains 5.4 moles of oxygen atoms is -
(1) 0.9
(2) 1.8
(3) 2.7
(4) 5.4

8. 74.5 g of a metallic chloride contains 35.5 g of chlorine. The equivalent mas of the metal is -
(1) 19.5
(2) 35.5
(3) 39.0
(4) 78.0

9. H_3PO_4 can be neutralised by NaOH, $Ca(OH)_2$ and $Al(OH)_3$. The required mole of each for 1 equivalent of H_3PO_4 are in ratio -
(1) 1 : 1 : 1
(2) 1 : 0.5 : 0.33
(3) 1 : 2 :3
(4) 2 : 3 : 6

10. Which of the following relation is correct -
(1) Molar mass of gas = 2 × vapour density
(2) Normality = Molarity × Valency factor of solute
(3) Molar mass = Equivalent weight × Valency factor
(4) All of these

11. Cl_2 changes to Cl^- and ClO^- in cold NaOH. Equivalent weight of Cl_2 will be–
(1) M
(2) M/2
(3) M/3
(4) 2M/3

12. For which of the following Kjeldahl's method is applicable-
(1) $CH_3 - NO_2$
(2) $CH_3 - N = N - C_2H_5$
(3) $C_6H_5NH_2$
(4) 


7. $CaCO_3$ के मोलो की संख्या जिसमें 5.4 मोल ऑक्सीजन परमाणु है -
(1) 0.9
(2) 1.8
(3) 2.7
(4) 5.4

8. 74.5 g धात्विक क्लोराइड में 35.5 g क्लोरीन हैं। धातु का तुल्यांकी भार है -
(1) 19.5
(2) 35.5
(3) 39.0
(4) 78.0

9. H_3PO_4 का उदासीनीकरण NaOH, $Ca(OH)_2$ तथा $Al(OH)_3$ द्वारा होता है। H_3PO_4 के 1 तुल्यांक के लिए प्रत्येक के आवश्यक मोल का अनुपात होगा-
(1) 1 : 1 : 1
(2) 1 : 0.5 : 0.33
(3) 1 : 2 :3
(4) 2 : 3 : 6

10. निम्न में से कौनसा सम्बन्ध सही है-
(1) गैस का मोलर द्रव्यमान = 2 × वाष्प घनत्व
(2) नॉर्मलता = मोलरता × विलेय का संयोजकता कारक
(3) मोलर द्रव्यमान = तुल्यांकी भार × संयोजकता कारक
(4) उपरोक्त सभी

11. Cl_2 ठण्डे NaOH में Cl^- व ClO^- में परिवर्तित होता है। Cl_2 का तुल्यांकी भार होगा-
(1) M
(2) M/2
(3) M/3
(4) 2M/3

12. निम्न में से किस के लिए कैल्डॉल विधि लागू होती है-
(1) $CH_3 - NO_2$
(2) $CH_3 - N = N - C_2H_5$
(3) $C_6H_5NH_2$
(4) 

Scanned with CamScanner

13. 0.2 litre of hydrocarbon on complete combustion produces 800 ml $CO_2(g)$ and 1000 ml of $H_2O(g)$. The hydrocarbon is –

(1) C_4H_5

(2) C_8H_{10}

(3) C_4H_8

(4) C_4H_{10}

14. An organic compound contains 40% carbon and 6.67% hydrogen by mass. Which of the following represents the empirical formula of the compound-

(1) CH_2

(2) CH_2O

(3) C_2H_4O

(4) CH_3O

15. Number of significant figures present in 1.34×10^{-2} are -

(1) Zero

(2) 2

(3) 3

(4) 5

13. 0.2 लीटर हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन करने पर 800 ml $CO_2(g)$ तथा 1000 ml, $H_2O(g)$ गैस देता है, तो हाइड्रोकार्बन है-

(1) C_4H_5

(2) C_8H_{10}

(3) C_4H_8

(4) C_4H_{10}

14. एक कार्बनिक यौगिक 40% कार्बन तथा 6.67% हाइड्रोजन भार रूप में रखता है, तो निम्न में से कौनसा यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को प्रदर्शित करता है-

(1) CH_2

(2) CH_2O

(3) C_2H_4O

(4) CH_3O

15. 1.34×10^{-2} में सार्थक अंकों की संख्या है

(1) शून्य

(2) 2

(3) 3

(4) 5

Scanned with CamScanner

16 Sulphur trioxide is prepared by the following two reactions

$S_8(s) + 8O_2(g) \rightarrow 8SO_2(g)$

$2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g)$

How many grams of SO_3 are produced from 1 mol of S_8?

(1) 1280.0 (2) 640.0

(3) 960.0 (4) 320.0

17 If 0.5 mol of $BaCl_2$ is mixed with 0.1 mole of Na_3PO_4, the maximum number of mole of $Ba_3(PO_4)_2$ that can be formed is :

(1) 0.7 (2) 0.05

(3) 0.30 (4) 0.10

18 4 g of hydrogen is ignited with 4 g of oxygen, the amount of water formed is ?

(1) 2.5 g (2) 0.5 g

(3) 4.5 g (4) 8 g

19 The molarity of the solution containing 2.8% mass-volume solution of KOH is

(1) M/10 (2) M/2

(3) M/5 (4) 1 M

20 300 ml of 3.0 M NaCl is added to 200 ml of 4.0 M $BaCl_2$ solution. The concentration of Cl^- ions in the resulting solution is

(1) 7 M (2) 1.6 M

(3) 1.8 M (4) 5 M

21 If one mole of ethanol (C_2H_5OH) completely burns to form carbon dioxide and water, the weight of carbon dioxide formed is about -

(1) 22 gm (2) 45 gm

(3) 66 gm (4) 88 gm

22 The moles of O_2 required for reacting with 6.8 gm of ammonia.

(..... NH_3 +..... O_2 → ..... NO + ... H_2O) is

(1) 5 (2) 2.5

(3) 1 (4) 0.5

23 What mass of calcium chloride in grams would be enough to produce 14.35 gm of AgCl.

(At. mass Ca = 40, Ag = 108) -

(1) 5.55 gm (2) 8.295 gm

(3) 16.59 gm (4) 11.19 gm

24 1.35 gm of pure Ca metal was quantitatively converted into 1.88 gm of pure CaO. What is atomic weight of Ca -

(1) 40.75 (2) 50

(3) 60 (4) 70

सल्फर ट्राई ऑक्साइड निम्न दो अभिक्रियाओं से बनता है।

$S_8(s) + 8O_2(g) \rightarrow 8SO_2(g)$

$2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g)$

S_8 के 1 मोल से कितने ग्राम SO_3 बनेगी ?

(1) 1280.0 (2) 640.0

(3) 960.0 (4) 320.0

यदि $BaCl_2$ के 0.5 मोल को Na_3PO_4 के 0.1 मोल के साथ मिश्रित किया गया, तो बनने वाले $Ba_3(PO_4)_2$ के अधिकतम मोलों की संख्या है :

(1) 0.7 (2) 0.05

(3) 0.30 (4) 0.10

4 g ऑक्सीजन के साथ 4 g हाइड्रोजन को प्रज्जवलित किया जाता है तो उत्पादित जल की मात्रा निम्न है?

(1) 2.5 g (2) 0.5 g

(3) 4.5 g (4) 8 g

उस विलयन की मोलरता क्या होगी जो KOH का 2.8% (द्रव्यमान–आयतन) रखता हो।

(1) M/10 (2) M/2

(3) M/5 (4) 1 M

3.0 M NaCl विलयन के 300 ml को 4.0 M $BaCl_2$ विलयन के 200 ml के साथ मिलाया जाता है। परिणामी विलयन में Cl^- आयन की सान्द्रता निम्न है :

(1) 7 M (2) 1.6 M

(3) 1.8 M (4) 5 M

यदि एक मोल एथेनॉल (C_2H_5OH) पूर्ण रूप से जलकर कार्बन डाईऑक्साइड तथा जल देता है तो बनी कार्बन डाईऑक्साइड का भार है -

(1) 22 gm (2) 45 gm

(3) 66 gm (4) 88 gm

6.8 ग्राम अमोनिया से क्रिया करने के लिये ऑक्सीजन के कितने मोल की आवश्यकता है–

(..... NH_3 +..... O_2 → ..... NO + ... H_2O)

(1) 5 (2) 2.5

(3) 1 (4) 0.5

14.35 ग्राम AgCl. बनाने के लिये कितने ग्राम $CaCl_2$ की आवश्यकता होगी (परमाणु भार Ca = 40, Ag = 108) -

(1) 5.55 gm (2) 8.295 gm

(3) 16.59 gm (4) 11.19 gm

यदि 1.35 ग्राम शुद्ध Ca धातु को 1.88 ग्राम CaO में परिवर्तित कर दिया जाता है तो Ca का परमाणु भार कितना होगा–

(1) 40.75 (2) 50

(3) 60 (4) 70

Scanned with CamScanner

25 If V ml of the vapours of substance at NTP weight W g. Then mol w. of substance is :

(1) (W/V) × 22400 (2) $\frac{V}{W} \times 22.4$

(3) (W–V) × 22400 (4) $\frac{W \times 1}{V \times 22400}$

यदि NTP पर एक पदार्थ के V ml वाष्प का भार W g है, तो पदार्थ का अणुभार है

(1) (W/V) × 22400 (2) $\frac{V}{W} \times 22.4$

(3) (W–V) × 22400 (4) $\frac{W \times 1}{V \times 22400}$

26 Vapour density of a volatile substance w.r.t. CH_4 is 4(CH_4 = 1). Its molecular weight would be –

(1) 8 (2) 32

(3) 64 (4) 128

एक वाष्पशील पदार्थ का CH_4 के सापेक्ष वाष्प घनत्व 4(CH_4 = 1) है। इसका अणुभार होगा :

(1) 8 (2) 32

(3) 64 (4) 128

27 If 500 ml of 1 M solution of glucose is mixed with 500 ml of 1 M solution of glucose final molarity of solution will be :

(1) 1 M (2) 0.5 M

(3) 2 M (4) 1.5 M

यदि 1 M ग्लूकोस विलयन के 500 ml को ग्लूकोस के ही 1 M विलयन के 500 ml के साथ मिलाया जाता है, तो विलयन की अन्तिम मोलरता निम्न होगी।

(1) 1 M (2) 0.5 M

(3) 2 M (4) 1.5 M

28 What is the concentration of nitrate ions if equal volumes of 0.1 M $AgNO_3$ and 0.1 M NaCl are mixed together :

(1) 0.1 M (2) 0.2 M

(3) 0.05 M (4) 0.25 M

यदि 0.1 M $AgNO_3$ तथा 0.1 M NaCl के समान आयतन को मिश्रित किया जाता है, तो नाइट्रेट आयनों की सान्द्रता क्या होगी:

(1) 0.1 M (2) 0.2 M

(3) 0.05 M (4) 0.25 M

29 The volume of water that must be added to a mixture of 250 ml of 0.6 M HCl and 750 ml of 0.2 M HCl to obtain 0.25 M solution of HCl is :

(1) 750 ml (2) 100 ml

(3) 200 ml (4) 300 ml

0.6 M HCl के 250 ml तथा 0.2 M HCl के 750 ml के मिश्रण में जल का कितना आयतन मिलाना चाहिए जिससे HCl का 0.25 M विलयन प्राप्त हो :

(1) 750 ml (2) 100 ml

(3) 200 ml (4) 300 ml

30 Volume occupied by one molecule of water (density =1 gcm^{-3}) is :-

(1) 3.0×10^{-23} cm^3 (2) 5.5×10^{-23} cm^3

(3 9.0×10^{-23} cm^3 (4) 6.023×10^{-23} cm^3

जल (घनत्व =1 $g\ cm^{-3}$) के एक अणु का आयतन है :-

(1) 3.0×10^{-23} cm^3 (2) 5.5×10^{-23} cm^3

(3 9.0×10^{-23} cm^3 (4) 6.023×10^{-23} cm^3

Scanned with CamScanner

31. In the reaction,

$xFeCl_3 + yH_2S \rightarrow FeCl_2 + S + HCl$

(1) x = 2,y = 1

(2) x = 3,y = 2

(3) x = 4,y = 3

(4) x = 2,y = 2

32. $Cr_2O_7^{2-} + X \xrightarrow{H^+ion} Cr^{3+}$ + oxidation product of X, X in the above reaction cannot be -

(1) $C_2O_4^{2-}$

(2) FeC_2O_4

(3) SO_4^{2-}

(4) S^{2-}

33. The value of n in the reaction -

$$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + ne^- \longrightarrow 2Cr^3 + 7H_2O$$

(1) 4

(2) 6

(3) 2

(4) 3

31. अभिक्रिया के लिए

$xFeCl_3 + yH_2S \rightarrow FeCl_2 + S + HCl$

(1) x = 2,y = 1

(2) x = 3,y = 2

(3) x = 4,y = 3

(4) x = 2,y = 2

32. $Cr_2O_7^{2-} + X \xrightarrow{H^+ion} Cr^{3+} + X$ का ऑक्सीकरण उत्पाद उपरोक्त अभिक्रिया में X नहीं हो सकता-

(1) $C_2O_4^{2-}$

(2) FeC_2O_4

(3) SO_4^{2-}

(4) S^{2-}

33. निम्न अभिक्रिया में n का मान है -

$$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + ne^- \longrightarrow 2Cr^3 + 7H_2O$$

(1) 4

(2) 6

(3) 2

(4) 3

Scanned with CamScanner

34. In the reaction; $8Al + 3Fe_3O_4 \longrightarrow 4Al_2O_3 + 9Fe$, the number of electrons transferred from reductant to oxident is -
(1) 7
(2) 24
(3) 8

34. अभिक्रिया $8Al + 3Fe_3O_4 \longrightarrow 4Al_2O_3 + 9Fe$ में, ऑक्सीकरण से अपचयन में परिवर्तित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है -
(1) 7
(2) 24
(3) 8
(4) 4

35. Oxidation no. of C in CH_2Cl_2 and CCl_4 are respectively
(1) 0 and 4
(2) 0 and – 4
(3) – 2 and – 4
(4) 2 and 4

35. CH_2Cl_2 व CCl_4 में C का ऑक्सीकरण अंक क्रमशः है -
(1) 0 व 4
(2) 0 व –4
(3) –2 व –4
(4) 2 व 4

36. In some amount of (glucose) $C_6H_{12}O_6$, 12 moles of carbon are present then moles of hydrogen atom will be -
(1) 12
(3) 36
(4) 18

36. ग्लूकोज $C_6H_{12}O_6$ के किसी निश्चित भार में यदि कार्बन के 12 मोल उपस्थित है, तो हाइड्रोजन परमाणु के कितने मोल उपस्थित होंगे -
(1) 12
(2) 24
(3) 36
(4) 18

37. Three flasks of equal volumes contain CH_4, CO_2 and Cl_2 gases respectively. They will contain equal number of molecules if -
(1) the mass of all the gases is same
(2) the moles of all the gas is same but temperature is different
(3) temperature and pressure of all the flasks are same
(4) temperature, pressure, and masses are same in the flasks

37. समान आयतन के तीन फ्लास्क में क्रमशः CH_4, CO_2 तथा Cl_2 गैस भरी हुई है। ये अणुओं की समान संख्या से बनी होगी यदि-
(1) सभी गैसों के द्रव्यमान समान हो।
(2) सभी गैसों के मोल समान हो लेकिन ताप भिन्न हो।
(3) सभी फ्लास्को के ताप तथा दाब समान हो।
(4) फ्लास्को में ताप, दाब तथा द्रव्यमान समान हो।

38. Arrange the following in increasing order of weight -
I. 6.023×10^{23} molecules of H_2
II. 2 moles of CO
III. 1 g atm of Nitrogen
IV. 44.8 L O_2 at 0°C and 1 atm pressure
(1) I < II < III < IV
(2) IV < II < III < I
(3) I < III < II < IV
(4) I < III < IV < II

38. निम्न को भार के बढ़ते हुए क्रम मे व्यवसित कीजिए -
I. H_2 के 6.023×10^{23} अणु
II. CO के 2 मोल
III. नाइट्रोजन के 1 ग्राम परमाणु
IV. 1 atm दाब तथा 0°C पर 44.8 L O_2
(1) I < II < III < IV
(2) IV < II < III < I
(3) I < III < II < IV
(4) I < III < IV < II

Scanned with CamScanner

39. For the estimation of nitrogen, 2.8 g of an organic compound was digested by kjeldahl's method and the evolved ammonia was absorbed in 40ml of $\frac{M}{10}$ sulphuric acid. The unreacted acid required 20mL of $\frac{M}{10}$ NaOH for complete neutralisation. The percentage of nitrogen in the compound is -

(1) 3 %
(2) 5 %
(3) 6 %
(4) 10 %

40. Find the incorrect match (M = molar mass)

Compound	Equivalent mass
(1) Al_2O_3	M/3
(2) H_3BO_3	M
(3) $KCl.MgCl_2.6H_2O$	M/3
(4) $Ca(OH)_2$	M/2

41. Equivalent weight of chlorine molecule in the equation is :

$3Cl_2 + 6NaOH \longrightarrow 5NaCl + NaClO_3 + 3H_2O$

(1) 42.6
(2) 35.5
(3) 59.1
(4) 71

42. A compound contains 69.5% oxygen and 30.5% nitrogen and its molecular weight is 92. The formula of that compound is -

(1) N_2O
(2) NO_2
(3) N_2O_4
(4) N_2O_5

43. The normality of 0.4M $Al_2(SO_4)_3$ is -

(1) 1.8 N
(2) 0.3 N
(3) 2.4 N
(4) 0.9 N

44. The equivalent weight of a monobasic acid, if 0.915g of it requires 25 mL of 0.3 N NaOH for complete neutralization is -

(1) 242
(2) 60
(3) 74
(4) 122

39. नाइट्रोजन के आकलन के लिए 2.8 g कार्बनिक यौगिक केल्डहल विधि के अनुसार अपचयन किया गया तथा मुक्त हुए अमोनिया को 40ml $\frac{M}{10}$ सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित किया गया अभिशेष अम्ल के पूर्ण उदासीकरण के लिए 20mL, $\frac{M}{10}$ NaOH की आवश्यकता होती है यौगिक मे नाइट्रोजन की प्रतिशतता हैं -

(1) 3 %
(2) 5 %
(3) 6 %
(4) 10 %

40. कौनसा युग्म सही सुमेलित नहीं है - (M = molar mass)

यौगिक	तुल्यांकी भार
(1) Al_2O_3	M/3
(2) H_3BO_3	M
(3) $KCl.MgCl_2.6H_2O$	M/3
(4) $Ca(OH)_2$	M/2

41. समीकरण में क्लोरीन अणु का तुल्यांकी भार है-

$3Cl_2 + 6NaOH \longrightarrow 5NaCl + NaClO_3 + 3H_2O$

(1) 42.6
(2) 35.5
(3) 59.1
(4) 71

42. एक यौगिक में 69.5% ऑक्सीजन तथा 30.5% नाइट्रोजन है तथा इसका अणुभार 92 है। इस यौगिक का सूत्र है -

(1) N_2O
(2) NO_2
(3) N_2O_4
(4) N_2O_5

43. 0.4M $Al_2(SO_4)_3$ की नॉर्मलता होगी-

(1) 1.8 N
(2) 0.3 N
(3) 2.4 N
(4) 0.9 N

44. 0.915g एकल क्षारकीय अम्ल का तुल्यांकी भार क्या होगा यदि इसके पूर्णत: उदासीन करने के लिए 25 mL, 0.3 N NaOH की आवश्यकता होती है-

(1) 242
(2) 60
(3) 74
(4) 122

Scanned with CamScanner

45. Calculate the total no. of electrons present is 18 ml. of water :(d = 1 gm./ml.)
(1) 10
(2) 18
(3) $10\ N_A$
(4) $18\ N_A$

46. Which of the following product is possible if one mole of $KClO_4$ accepts 6 mole electrons -
(1) $KClO_3$
(2) $KClO_2$
(3) KOCl
(4) KCl

47. In a triatomic molecule the oxidation states of atoms A, B and C are + 6, + 1 and – 2 respectively. The molecular formula of the compound will be -
(1) B_2AC_4
(2) $B_2A_2C_7$
(3) Both of the above
(4) None of the above

48. $P_4(s) + 3OH^-(aq) + 3H_2O(l) \rightarrow PH_3(g) + 3H_2PO_2^-(aq)$. For this reaction, the oxidizing and reducing agents are, respectively -
(1) P_4 and OH^-
(2) OH^- and P
(3) P and H_2O
(4) P_4 and P_4

49. 25 g of an unknown hydrocarbon upon burning produces 88 g of CO_2 and 9 g of H_2O. This unknown hydrocarbon contains-
(1) 18 g of carbon and 7 g of hydrogen
(2) 20 g of carbon and 5 g of hydrogen
(3) 22 g of carbon and 3 g of hydrogen
(4) 24 g of carbon and 1 g of hydrogen

50. 0.32 g of a metal gave 112 ml of hydrogen gas at STP complete react with an acid. Equivalent mass of metal will be -
(1) 16 (2) 24
(3)32 (4) 58

45. 18 मिली. पानी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए.- (d = 1 gm./ml.)
(1) 10
(2) 18
(3) $10\ N_A$
(4) $18\ N_A$

46. यदि एक मोल $KClO_4$ द्वारा 6 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण किये जाते है तो निम्न में से कौनसा उत्पाद संभव है-
(1) $KClO_3$
(2) $KClO_2$
(3) KOCl
(4) KCl

47. एक त्रिपरमाणविक अणु में परमाणुओं A, B तथा C की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्रमशः + 6, + 1 तथा – 2 है। यौगिक का आणविक सूत्र होगा –
(1) B_2AC_4
(2) $B_2A_2C_7$
(3) उपर्युक्त दोनों
(4) इनमें से कोई नही

48. $P_4(s) + 3OH^-(aq) + 3H_2O(l) \rightarrow PH_3(g) + 3H_2PO_2^-(aq)$ अभिक्रिया में क्रमशः ऑक्सीकारक तथा अपचायक है –
(1) P_4 तथा OH^-
(2) OH^- तथा P
(3) P तथा H_2O
(4) P_4 तथा P_4

49. एक अज्ञात हाइड्रोकार्बन के 25 g का दहन करने पर 88 g CO_2 तथा 9 g H_2O प्राप्त होता है। हाइड्रोकार्बन में है –
(1) 18 g कार्बन तथा 7 g हाइड्रोजन
(2) 20 g कार्बन तथा 5 g हाइड्रोजन
(3) 22 g कार्बन तथा 3 g हाइड्रोजन
(4) 24 g कार्बन तथा 1 g हाइड्रोजन

50. एक धातु का 0.32 g अम्ल के साथ पूर्णतः अभिकृत होकर STP पर 112 ml हाइड्रोजन गैस देता है। धातु का तुल्यांकी भार होगा –
(1) 16 (2) 24
(3) 32 (4) 58

Scanned with CamScanner