

关于反性工作的落实办法（草稿）

目录：

- 第一章 序言
- 第二章 冲破性瘾
- 第三章 生物学上的诊疗方案
- 第四章 长期巩固

第一章 序言

第一节 思想指导

本案一切思想引导方案，均根基于《反色情总纲》、和《关于<反色情总纲>的解释及落实细则》中的思想精髓，就其核心精神，作此案。

第二节 声明

再次强调：坚持本政策是个人的选择；本政策需要终生坚持；坚持本政策者必须明确本政策的后果；我们不解释本政策。

在坚持本政策前，请务必确保您不是性少数群体或恋物癖、恋童癖等性恶俗群体人士。我们不会对您的模仿行为负责。

本案有相当多的践行方法的相关内容已向大众公开。我们社所发布的一切文案及方法，均不构成任何专业或权威意义，且我们不对任何对此模仿的行为负责。

本案不建立于任何哲学礼仪之类的道德基础，不接受任何道德评价。

第三节 正文前言

“当你决定执行本案时，那你必须是准备好终生与反性思想相伴，你从一开始就清晰此行带来的后果，且你的意志坚定以至于可以奉其为个人信仰，并一条路走到黑。否则，你不配执行它。”

--■■■■部长.■■■■

必须承认：本政策的执行期限是终身，影响后果也是终生，且执行本政策不一定会为执行者带来任何积极效益。本政策有相当多的反人类成分，请注意慎别。

第四节 基本概念

本文件中可能有歧义用词，以下是对歧义用词的重定义：

- 反色情：反对性别物化、反对性客体化、反对性固化、反对性化、反对性对象化、反对父权社会、反对女性沙文主义。
- 反性：反对一切非直接繁衍目的的生殖行为。
- 性少数群体：即 LGBT，即：非异性恋和跨性别群体
- 性活动：围绕性器官及其附属的活动。
- 自性活动：围绕自己的性器官及其附属的活动，行为者在行为时有相当快感。嫖娼和性犯罪同属于自性活动。

自性活动的要件：

主体要件：行为人可以感受到性快感。

主观要件：行为者发生行为的目的为行为过程中的快感或为潜意识所驱动等无明确目的的行为。

客体要件：行为支持行为人产生性快感。

客观要件：行为者已经开始作手行为，并已经感受到此过程中的快感。

- 对于一些法学概念，本文件有另外定义：

中止的判定：在性行为前，行为人将支持性行为的物件舍弃。或因非性行为的目的强行中断性行为，并 48 小时内的无性行为发生。

未遂的判定：非行为人意愿的事件导致性行为或预备性行为的行为中断。

- 模因：文化传播的最小单位
- 正模因（简写：模因）：极易被传播的文化
- 逆模因：难以被传播的文化
- 触媒：吸引文化传播的媒介

若不加说明，本文件所描述事件的时点为十二月

- 强烈性瘾者：平均每三天有三次性活动，或更多。
- 性瘾者：平均每周有两次性活动以上，或，有无意识的自性活动（即梦游中）
- 有性瘾者：平均每个月有一次性活动或以上。
- 性癖好者：有十二分之一的闲暇时间自愿分配给性活动，或更多。
- 性沉迷者：非直接工作目的，会主动获取性活动的方面的资讯的人。
- 有性者：不排斥性活动的人。

第二章 冲破性瘾

第一节 “破四旧”

第一条 破除过去封建思想，破除过去反动和保守的作风。以马克思列宁主义毛泽东思想为指导，坚持共产主义，憧憬人类社会的大好前途。

第二条 极端抵制过去保守思想和自身的保守作风。树立新风，做好重塑自身的准备

第二节 性瘾者的戒除方法

第一条 戒除性瘾的首要任务就是自我的思想斗争，可参考《个体反色情工作的办法推广》等公共文件。

第二条 冲破戒除期的重要途径就是深刻的思想斗争还有与之为辅的生物学理上的调节。见本文件“第三章 生物学上的诊疗方案”。

第三章 生物学上的诊疗方案

第一节 对于性瘾者的戒除的初步生物学理方案

第一项 解除性瘾的武装，从根本上破坏性快感的触媒，可以尝试：

（一）紊乱性快感的触媒，可以强迫自己在从对排泄物、腐尸、恶臭垃圾等机体反感物进行自性活动。以此形成性-厌恶的反射闭环。

（二）反复深化（一）项，并注意自己在此自性活动中情绪对象。

（三）紊乱性快感的发生器，可以自性活动中用火烙、大头针、过消毒钢丝等刺激性用具（严禁使用“情趣用具”）刺激自己主要的性快感发生器。

（四）转移心态，努力将对性的依赖转移到对建设的热情上来。努力建设自己，建设祖国。时刻怀揣着对未来的无限憧憬。

（五）上述累计训练时间最短不低于 2 次/周，2 月总。

第二节 药物资料（无医学意义）

前言：就反性工作的绝对性，以下方案不会考虑到执行者生殖能力的保留与否。

第一项 针对男性的反性治疗

（一）可用药物：

孕酮类药物：左炔诺孕酮片、屈螺酮炔雌醇片、醋酸环丙孕酮片、黄体酮软胶囊等。

抗雄类药物：醋酸环丙孕酮片、非那雄胺片、度他雄胺片、螺内酯等。

一般类保健品：大豆异黄酮、木瓜葛根片等。

#注意：醋酸环丙孕酮可能会增加脑膜瘤的风险，因此需要在医生的指导下使用，并可能需要定期进行 MRI 检查。

#另外，极不建议使用戊酸雌二醇等雌激素进行反性的戒断等治疗。

（二）使用方案：

就反性工作的绝对性，药物的使用因维持形成不药物依赖的最高限度，参考：

一般孕酮类	0.15mg/天
黄体制剂	3.25mg/天
5 α -还原酶抑制剂	1mg/天
保钾利尿药	20mg/天

#为确保健康，请每月至少进行一次肝功能检查。

第二项 针对女性的反性治疗

（一）可用药物：

醋酸环丙孕酮片、屈螺酮炔雌醇片、来曲唑片、阿拉曲唑片等

（二）使用方案：

档案中女性研究样本不足。有需求者请遵医嘱用药。

第三项 通用项

（一）无性别要求的反性药物：

舍曲林、氟西汀、阿米替林片、阿戈美拉汀、丙戊酸钠缓释片等。

（二）使用方案：
遵医嘱用药。用药量通常与双相情感障碍患者的用药相似。