

7.2 初等积分法

一、可分离变量微分方程

二、齐次方程

三、一阶线性微分方程

四、伯努利方程

五、可降阶高阶微分方程

一、可分离变量微分方程——分离变量法

形式: $\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$

解法: (1) $g(y) \neq 0$.分离变量

$$\frac{1}{g(y)} dy = f(x) dx$$

两边积分 $\underbrace{\int \frac{1}{g(y)} dy}_{G(y)} = \underbrace{\int f(x) dx}_{F(x)}$

则有 $G(y) = F(x) + C$ ——隐式通解

(2) $g(y) = 0$, 即 $g(y) = 0$ 有实根 y_1, y_2, \dots, y_n .

则 $y(x) \equiv y_1, y(x) \equiv y_2, \dots, y(x) \equiv y_n$ 都是该方程的解 (特解).

故求原方程的通解则求出 $G(y) = F(x) + C$ 即可. 若要得到所有解还需考虑 $g(y) = 0$ 所得的特解. 此外, 特解 $y(x) \equiv y_1, y(x) \equiv y_2, \dots, y(x) \equiv y_n$ 可能包含在通解 $G(y) = F(x) + C$ 中.

例1. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = 3x^2 y$ 的通解.

解: (1) $y \neq 0$ 时分离变量得 $\frac{dy}{y} = 3x^2 dx$

两边积分 $\int \frac{dy}{y} = \int 3x^2 dx$

得 $\ln|y| = x^3 + C_1$

即 $y = \pm e^{x^3 + C_1} = \pm e^{C_1} e^{x^3}$ (C_1 为任意常数)

\downarrow 令 $C = \pm e^{C_1}$

$y = C e^{x^3}$ (C 为常数, $C \neq 0$)

(2) $y = 0$ 为原方程特解

综上所述, 通解为 $y = C e^{x^3}$ (C 为任意常数)

例2. 解初值问题
$$\begin{cases} xydx + (x^2 + 1)dy = 0 \\ \underline{y(0) = 1} \end{cases}$$

解: (1) $y \neq 0$ 时分离变量得
$$\frac{dy}{y} = -\frac{x}{1+x^2} dx$$

两边积分得
$$\ln|y| = \ln \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} + \ln|C|$$

即
$$y\sqrt{x^2 + 1} = C \quad (C \text{ 为常数}, C \neq 0)$$

(2) $y = 0$ 为原方程特解

综上所述,原方程所有解为 $y\sqrt{x^2 + 1} = C$ (C 为任意常数)

由初始条件得 $C = 1$, 故所求特解为

$$y\sqrt{x^2 + 1} = 1$$

练习: 求方程 $\frac{dy}{dx} = e^{x+y}$ 的通解.

解法 1 分离变量 $e^{-y} dy = e^x dx$

$$-e^{-y} = e^x + C$$

即 $(e^x + C)e^y + 1 = 0 \quad (C < 0)$

解法 2 令 $u = x + y$, 则 $u' = 1 + y'$

故有

$$u' = 1 + e^u$$

积分

$$\int \frac{du}{1 + e^u} = x + C$$

$$\int \frac{(1 + e^u) - e^u}{1 + e^u} du$$

$$u - \ln(1 + e^u) = x + C$$

所求通解: $\ln(1 + e^{x+y}) = y - C$ (C 为任意常数)

例4. 已知放射性元素铀的衰变速度与当时未衰变原子的含量 M 成正比, 已知 $t = 0$ 时铀的含量为 M_0 , 求在衰变过程中铀含量 $M(t)$ 随时间 t 的变化规律.


解: 根据题意, 有
$$\begin{cases} \frac{dM}{dt} = -\lambda M \quad (\lambda > 0) \\ M|_{t=0} = M_0 \quad (\text{初始条件}) \end{cases}$$

对方程分离变量, 然后积分: $\int \frac{dM}{M} = \int (-\lambda) dt$

得 $\ln M = -\lambda t + \ln C$, 即 $M = C e^{-\lambda t}$

利用初始条件, 得 $C = M_0$

故所求铀的变化规律为 $M = M_0 e^{-\lambda t}$.



例5. 设降落伞从跳伞塔下落后所受空气阻力与速度成正比, 并设降落伞离开跳伞塔时($t = 0$) 速度为0, 求降落伞下落速度与时间的函数关系.

解: 根据牛顿第二定律列方程 $m \frac{dv}{dt} = mg - kv$

初始条件为 $v|_{t=0} = 0$

对方程分离变量, 然后积分: $\int \frac{dv}{mg - kv} = \int \frac{dt}{m}$

得 $-\frac{1}{k} \ln(mg - kv) = \frac{t}{m} + C$ (此处 $mg - kv > 0$)

利用初始条件, 得 $C = -\frac{1}{k} \ln(mg)$

代入上式后化简, 得特解 $v = \frac{mg}{k} (1 - e^{-\frac{k}{m}t})$

t 足够大时

$$v \approx \frac{mg}{k}$$

解微分方程应用题的方法和步骤

(1) 找出事物的共性及可贯穿于全过程的规律列方程.

常用的方法:

1) 根据几何关系列方程

2) 根据物理规律列方程

3) 根据微量分析平衡关系列方程

(2) 利用反映事物个性的特殊状态确定定解条件.

(3) 求通解, 并根据定解条件确定特解.

二、齐次方程

形如 $\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ 的方程叫做**齐次方程** .

解法: 令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $y = ux$, $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$,

代入原方程得 $u + x \frac{du}{dx} = \varphi(u)$

分离变量: $\frac{du}{\varphi(u) - u} = \frac{dx}{x}$

两边积分, 得 $\int \frac{du}{\varphi(u) - u} = \int \frac{dx}{x}$

积分后再用 $\frac{y}{x}$ 代替 u , 便得原方程的通解.

例1. 解微分方程 $y' = \frac{y}{x} + \tan \frac{y}{x}$.

解: 令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $y' = u + xu'$, 代入原方程得

$$u + xu' = u + \tan u \quad (7.2.1)$$

(1) $\tan u \neq 0$ 时分离变量 $\frac{\cos u}{\sin u} du = \frac{dx}{x}$

两边积分 $\int \frac{\cos u}{\sin u} du = \int \frac{dx}{x}$

得 $\ln |\sin u| = \ln |x| + \ln |C|$, 即 $\sin u = Cx$

从而 $\sin \frac{y}{x} = Cx$ (C 为常数, $C \neq 0$)

(2) $\tan u = 0$ 时, $u = k\pi$ 为方程(7.2.1)的特解, 故原方程有特解 $y = k\pi x$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$).

综上, 原方程所有解为 $\sin \frac{y}{x} = Cx$ (C 为任意常数)

例2. 解微分方程 $(y^2 - 2xy)dx + x^2 dy = 0$.

解: 方程变形为 $\frac{dy}{dx} = 2\frac{y}{x} - (\frac{y}{x})^2$, 令 $u = \frac{y}{x}$, 则有

$$u + xu' = 2u - u^2 \quad (7.2.2)$$

(1) $u^2 - u \neq 0$ 时分离变量

$$\frac{du}{u^2 - u} = -\frac{dx}{x} \quad \text{即} \left(\frac{1}{u-1} - \frac{1}{u} \right) du = -\frac{dx}{x}$$

积分得 $\ln \left| \frac{u-1}{u} \right| = -\ln|x| + \ln|C|$, 即 $\frac{x(u-1)}{u} = C$

代回原变量 $x(y-x) = Cy$ (C 为常数, $C \neq 0$)

(2) $u^2 - u = 0$ 时, 方程(7.2.2)有特解 $u = 0, u = 1$. 故原方程有特解 $y = 0, y = x$

综上, 原方程的所有解为 $x(y-x) = Cy$ (C 为任意常数) 和 $y = 0$.

例3. 求下述微分方程的通解:

$$y' = \sin^2(x - y + 1)$$

解: 令 $u = x - y + 1$, 则

$$u' = 1 - y'$$

故有 $1 - u' = \sin^2 u$

即 $\sec^2 u \, du = dx$

解得 $\tan u = x + C$

所求通解: $\tan(x - y + 1) = x + C$ (C 为任意常数)

例 求方程 $x + yy' = (x^2 + y^2 + 1) \tan x$ 的通解

解 作代换 $u = x^2 + y^2$, 则 $u' = 2x + 2yy'$, 方程变为

$$\frac{1}{2}u' = (1 + u) \tan x.$$

分离变量得

$$\frac{1}{2(1+u)} du = \tan x dx, \quad (u \geq 0)$$

两边积分得

$$\frac{1}{2} \ln(1 + u) = -\ln |\cos x| + \frac{1}{2} \ln C,$$

故通解为

$$(1 + x^2 + y^2) \cos^2 x = C.$$

例3. 在制造探照灯反射镜面时, 要求点光源的光线反射出去有良好的方向性, 试求反射镜面的形状.

解: 设光源在坐标原点, 取 x 轴平行于光线反射方向, 则反射镜面由曲线 $y = f(x)$ 绕 x 轴旋转而成.

过曲线上任意点 $M(x, y)$ 作切线 MT ,

由光的反射定律: 入射角 = 反射角


可得 $\angle OMA = \angle OAM = \alpha$

从而 $AO = OM$

而 $AO = AP - OP = y \cot \alpha - x = \frac{y}{y'} - x$

$$OM = \sqrt{x^2 + y^2}$$

于是得微分方程: $\frac{y}{y'} - x = \sqrt{x^2 + y^2}$



利用曲线的对称性, 不妨设 $y > 0$, 于是方程化为

$$\frac{dx}{dy} = \frac{x}{y} + \sqrt{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2} \quad (\text{齐次方程})$$

↓

令 $v = \frac{x}{y}$, 则 $x = yv$, $\frac{dx}{dy} = v + y \frac{dv}{dy}$

$$y \frac{dv}{dy} = \sqrt{1 + v^2}$$

积分得 $\ln(v + \sqrt{1 + v^2}) = \ln y - \ln C$

故有 $\frac{y^2}{C^2} - \frac{2yv}{C} = 1$

$$\begin{aligned} v + \sqrt{1 + v^2} &= \frac{y}{C} \\ \left(\frac{y}{C} - v\right)^2 &= 1 + v^2 \end{aligned}$$

代入 $yv = x$, 得 $y^2 = 2C\left(x + \frac{C}{2}\right)$ (抛物线)

故反射镜面为旋转抛物面.

说明: $y^2 = 2C(x + \frac{C}{2})$


若已知反射镜面的底面直径为 d ,
顶到底的距离为 h , 则将

$$x + \frac{C}{2} = h, \quad y = \frac{d}{2}$$

代入通解表达式得 $C = \frac{d^2}{8h}$

这时旋转曲面方程为

$$y^2 + z^2 = \frac{d^2}{4h} \left(x + \frac{d^2}{16h} \right)$$



内容小结

1. 微分方程的概念

微分方程; 阶; 定解条件; 解; 通解; 特解

说明: 通解不一定是方程的全部解.

例如, 方程 $(x + y) y' = 0$ 有解

$$y = -x \text{ 及 } y = C$$

后者是通解, 但不包含前一个解.

2. 可分离变量方程的求解方法:

分离变量后积分; 根据定解条件定常数.

3. 齐次方程---化为可分离变量方程

思考与练习

求下列方程的通解：

$$(1) (x + xy^2)dx - (x^2y + y)dy = 0$$

$$(2) y' + \sin(x+y) = \sin(x-y)$$

提示: (1) 分离变量 $\frac{y}{1+y^2}dy = \frac{x}{1+x^2}dx$

(2) 方程变形为 $y' = -2\cos x \sin y$

$$\longrightarrow \ln \left| \tan \frac{y}{2} \right| = -2\sin x + C$$

三、一阶线性微分方程

一阶线性微分方程标准形式: $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$

若 $Q(x) \equiv 0$, 称为**齐次方程**;

若 $Q(x) \neq 0$, 称为**非齐次方程**.

1. 解齐次方程 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0$

分离变量 $\frac{dy}{y} = -P(x)dx$

两边积分得 $\ln|y| = -\int P(x)dx + \ln|C|$

故通解(全体解)为 $y = C e^{-\int P(x)dx}$ (C为任意常数).

2. 解非齐次方程 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$

解：在方程两边同时乘以 $e^{\int P(x)dx}$ (注意这里 $\int P(x)dx$ 只需取 P 的一个原函数即可, 无需加上任意常数.) 则原方程变为

$$y'(x)e^{\int P(x)dx} + P(x)y(x)e^{\int P(x)dx} = Q(x)e^{\int P(x)dx}.$$

即

$$\longrightarrow [y(x)e^{\int P(x)dx}]' = Q(x)e^{\int P(x)dx}.$$

$$\longrightarrow y(x)e^{\int P(x)dx} = \int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C.$$

此处 $\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx$ 也只需取 $Q(x)e^{\int P(x)dx}$ 的一个原函数.

从而原方程的通解(全体解)为

$$y(x) = e^{-\int P(x)dx} \left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right].$$

2. 解非齐次方程 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$

或用**常数变易法**：已知相应齐次方程的通解为 $y = C e^{-\int P(x)dx}$.

设原方程有如下形式的解

$$y(x) = u(x) e^{-\int P(x)dx}, (*) \quad \text{则}$$

$$u' e^{-\int P(x)dx} - P(x) u e^{-\int P(x)dx} + P(x) u e^{-\int P(x)dx} = Q(x)$$

即
$$\frac{du}{dx} = Q(x) e^{\int P(x)dx}$$

两端积分得 $u = \int Q(x) e^{\int P(x)dx} dx + C$, 带入(*) 则得

通解(全体解)为
$$y = e^{-\int \underset{\textcircled{1}}{P(x)}dx} \left[\int Q(x) e^{\int \underset{\textcircled{2}}{P(x)}dx} dx + C \right]$$

(1)(2)两处应取P(x) 的同一个原函数

(1) 用常数变易法求解非齐次方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

时,先求出相应齐次方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0$$

的通解 $y = C e^{-\int P(x)dx}$,再将其中的常数C变成函数:

$$y(x) = u(x) e^{-\int P(x)dx},$$

将上式带入非齐次方程求出**所有**满足原方程的 $u(x)$ 即得通解.

(2) 通解公式中三处的不定积分积出后无需加任意常数.

此外该公式两处出现 $\int P(x)dx$ 的地方需取同一个原函数.

例1. 解方程 $\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = (x+1)^{5/2}$.

解: 先解 $\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = 0$, 即 $\frac{dy}{y} = \frac{2dx}{x+1}$

积分得 $\ln|y| = 2\ln|x+1| + \ln|C|$, 即 $y = C(x+1)^2$

用常数变易法求通解. 令 $y = u(x) \cdot (x+1)^2$, 则

$$y' = u' \cdot (x+1)^2 + 2u \cdot (x+1)$$

代入非齐次方程得 $u' = (x+1)^{1/2}$

解得 $u = \frac{2}{3}(x+1)^{3/2} + C$

故原方程通解为 $y = (x+1)^2 \left[\frac{2}{3}(x+1)^{3/2} + C \right]$

例2. 求方程 $\frac{dx}{\sqrt{x}y} + \left[\frac{2}{y} - \sqrt{\frac{x}{y^3}} \right] dy = 0$ 的通解 .

解: 注意 x, y 同号, 当 $x > 0$ 时, $\frac{dx}{\sqrt{x}} = 2d\sqrt{x}$, 故方程可变形为 $2\frac{d\sqrt{x}}{dy} - \frac{\sqrt{x}}{y} = -\frac{2}{\sqrt{y}}$

这是以 \sqrt{x} 为因变量, y 为自变量的一阶线性方程

由一阶线性方程**通解公式**, 得

$$\begin{aligned}\sqrt{x} &= e^{\int \frac{dy}{2y}} \left[\int -\frac{1}{\sqrt{y}} e^{-\int \frac{dy}{2y}} dy + \ln|C| \right] \\ &= \sqrt{y} \left[-\int \frac{1}{\sqrt{y}} \cdot \frac{1}{\sqrt{y}} dy + \ln|C| \right] = \sqrt{y} \ln \left| \frac{C}{y} \right|\end{aligned}$$

所求通解为 $y e^{\sqrt{\frac{x}{y}}} = C \quad (C \neq 0)$

例3 如图所示, 平行于 y 轴的动直线被曲线 $y = f(x)$ 与 $y = x^3$ ($x \geq 0$) 截下的线段PQ之长数值上等于阴影部分的面积, 求曲线 $f(x)$.

解


$$\int_0^x y dx = x^3 - y,$$

两边求导得 $y' + y = 3x^2,$

$$\begin{aligned} \text{解得 } y &= e^{-\int dx} \left[C + \int 3x^2 e^{\int dx} dx \right] \\ &= Ce^{-x} + 3x^2 - 6x + 6, \end{aligned}$$

由 $y|_{x=0} = 0$, 得 $C = -6$,

所求曲线为 $y = 3(-2e^{-x} + x^2 - 2x)$.



四、伯努利 (Bernoulli) 方程

伯努利方程的标准形式:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n \quad (n \neq 0, 1)$$

解法: 以 y^n 除方程两边, 得

$$y^{-n} \frac{dy}{dx} + P(x)y^{1-n} = Q(x)$$

\downarrow 令 $z = y^{1-n}$, 则 $\frac{dz}{dx} = (1-n)y^{-n} \frac{dy}{dx}$

$$\frac{dz}{dx} + (1-n)P(x)z = (1-n)Q(x) \quad (\text{线性方程})$$

求出此方程通解后, 换回原变量即得伯努利方程的通解.

例4. 求方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = a(\ln x)y^2$ 的通解.

解: 令 $z = y^{-1}$, 则方程变形为

$$\frac{dz}{dx} - \frac{z}{x} = -a \ln x$$

其通解为
$$z = e^{\int \frac{1}{x} dx} \left[\int (-a \ln x) e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right]$$
$$= x \left[C - \frac{a}{2} (\ln x)^2 \right]$$

将 $z = y^{-1}$ 代入, 得原方程通解:

$$y x \left[C - \frac{a}{2} (\ln x)^2 \right] = 1$$

内容小结

1. 一阶线性方程 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$

方法1 先解齐次方程，再用常数变易法.

方法2 用通解公式

$$y = e^{-\int P(x)dx} \left[\int Q(x) e^{\int P(x)dx} dx + C \right]$$

2. 伯努利方程 $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n \quad (n \neq 0, 1)$

令 $u = y^{1-n}$ ，化为线性方程求解.

思考与练习

判别下列方程类型:

$$(1) \quad x \frac{dy}{dx} + y = xy \frac{dy}{dx}$$

$$\longrightarrow \frac{y-1}{y} dy = \frac{dx}{x}$$

可分离
变量方程

$$(2) \quad x \frac{dy}{dx} = y (\ln y - \ln x)$$

$$\longrightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} \ln \frac{y}{x}$$

齐次方程

$$(3) \quad (y - x^3) dx - 2x dy = 0$$

$$\longrightarrow \frac{dy}{dx} - \frac{1}{2x} y = -\frac{x^2}{2}$$

线性方程

$$(4) \quad 2y dx + (y^3 - x) dy = 0$$

$$\longrightarrow \frac{dx}{dy} - \frac{1}{2y} x = -\frac{y^2}{2}$$

线性方程


$$(5) \quad (y \sin x - 2) y dx = x dy$$

$$\longrightarrow \frac{dy}{dx} + \frac{2}{x} y = \frac{\sin x}{x} y^2$$

伯努利
方程

例题

1. 求一连续可导函数 $f(x)$ 使其满足下列方程:

$$f(x) = \sin x - \int_0^x f(x-t) dt$$


令 $u = x - t$

提示: $f(x) = \sin x - \int_0^x f(u) du$

则有
$$\begin{cases} f'(x) + f(x) = \cos x \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

利用公式可求出

$$f(x) = \frac{1}{2}(\cos x + \sin x - e^{-x})$$

2. 设有微分方程 $y' + y = f(x)$, 其中

$$f(x) = \begin{cases} 2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & x > 1 \end{cases}$$

试求此方程满足初始条件 $y|_{x=0} = 0$ 的连续解.

解: 1) 先解定解问题 $\begin{cases} y' + y = 2, & 0 \leq x \leq 1 \\ y|_{x=0} = 0 \end{cases}$

利用通解公式, 得

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int dx} \left(\int 2e^{\int dx} dx + C_1 \right) \\ &= e^{-x} (2e^x + C_1) = 2 + C_1 e^{-x} \end{aligned}$$

利用 $y|_{x=0} = 0$ 得 $C_1 = -2$

故有 $y = 2 - 2e^{-x} \quad (0 \leq x \leq 1)$

2) 再解定解问题
$$\begin{cases} y' + y = 0, & x > 1 \\ y|_{x=1} = y(1) = 2 - 2e^{-1} \end{cases}$$

此齐次线性方程的通解为 $y = C_2 e^{-x} \quad (x \geq 1)$

利用衔接条件得 $C_2 = 2(e - 1)$

因此有 $y = 2(e - 1) e^{-x} \quad (x \geq 1)$

3) 原问题的解为

$$y = \begin{cases} 2(1 - e^{-x}), & 0 \leq x \leq 1 \\ 2(e - 1) e^{-x}, & x \geq 1 \end{cases}$$

五、可降阶高阶微分方程

1、 $y^{(n)} = f(x)$ 型的微分方程

2、 $y'' = f(x, y')$ 型的微分方程

3、 $y'' = f(y, y')$ 型的微分方程

1、 $y^{(n)} = f(x)$ 型的微分方程

令 $z = y^{(n-1)}$, 则 $\frac{dz}{dx} = y^{(n)} = f(x)$, 因此

$$z = \int f(x) dx + C_1$$

即 $y^{(n-1)} = \int f(x) dx + C_1$

同理可得 $y^{(n-2)} = \int [\int f(x) dx + C_1] dx + C_2$

$$= \int [\int f(x) dx] dx + C_1 x + C_2$$

依次通过 n 次积分, 可得含 n 个任意常数的通解 .

例1. 求解 $y''' = e^{2x} - \cos x$.

解: $y'' = \int (e^{2x} - \cos x) dx + C_1'$

$$= \frac{1}{2} e^{2x} - \sin x + C_1'$$

$$y' = \frac{1}{4} e^{2x} + \cos x + C_1' x + C_2$$

$$y = \frac{1}{8} e^{2x} + \sin x + C_1 x^2 + C_2 x + C_3$$

$$(\text{此处 } C_1 = \frac{1}{2} C_1')$$

2、 $y'' = f(x, y')$ 型的微分方程 (不显含y)

设 $y' = p(x)$, 则 $y'' = p'$, 原方程化为一阶方程

$$p' = f(x, p)$$

设其通解为 $p = \varphi(x, C_1)$

则得 $y' = \varphi(x, C_1)$

再一次积分, 得原方程的通解 $y = \int \varphi(x, C_1) dx + C_2$

注: $y^{(n)} = f(x, y^{(k)}, \dots, y^{(n-1)})$ 型

因变量换元: $p = y^{(k)}$

降阶为 $p^{(n-k)} = f(x, p, \dots, p^{(n-k-1)})$ 。

例2. 求解
$$\begin{cases} (1+x^2)y'' = 2xy' \\ y|_{x=0} = 1, \quad y'|_{x=0} = 3 \end{cases}$$

解: 设 $y' = p(x)$, 则 $y'' = p'$, 代入方程得

$$(1+x^2)p' = 2xp \xrightarrow{\text{分离变量}} \frac{dp}{p} = \frac{2x dx}{(1+x^2)}$$

积分得 $\ln|p| = \ln(1+x^2) + \ln|C_1|$, 即 $p = C_1(1+x^2)$

利用 $y'|_{x=0} = 3$, 得 $C_1 = 3$, 于是有 $y' = 3(1+x^2)$

两端再积分得 $y = x^3 + 3x + C_2$

利用 $y|_{x=0} = 1$, 得 $C_2 = 1$, 因此所求特解为

$$y = x^3 + 3x + 1$$

3、 $y'' = f(y, y')$ 型的微分方程 (不显含自变量 x)

$$\text{令 } y' = p(y), \text{ 则 } y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$$

故方程化为 $p \frac{dp}{dy} = f(y, p)$

设其通解为 $p = \varphi(y, C_1)$, 即得

$$y' = \varphi(y, C_1)$$

分离变量后积分, 得原方程的通解

$$\int \frac{dy}{\varphi(y, C_1)} = x + C_2$$

例4. 求解 $yy'' - y'^2 = 0$.

解: 设 $y' = p(y)$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$

代入方程得 $yp \frac{dp}{dy} - p^2 = 0$, 即 $\frac{dp}{p} = \frac{dy}{y}$

两端积分得 $\ln|p| = \ln|y| + \ln|C_1|$, 即 $p = C_1 y$,

$\therefore y' = C_1 y$ (一阶线性齐次方程)

故所求通解为 $y = C_2 e^{C_1 x}$

例5. 解初值问题 $\begin{cases} y'' - e^{2y} = 0 \\ y|_{x=0} = 0, \quad y'|_{x=0} = 1 \end{cases}$

解: 令 $y' = p(y)$, 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 代入方程得

$$p \, dp = e^{2y} \, dy$$

积分得 $\frac{1}{2} p^2 = \frac{1}{2} e^{2y} + C_1$

利用初始条件, 得 $C_1 = 0$, 根据 $p|_{y=0} = y'|_{x=0} = 1 > 0$, 得

$$\frac{dy}{dx} = p = e^y$$

积分得 $-e^{-y} = x + C_2$, 再由 $y|_{x=0} = 0$, 得 $C_2 = -1$

故所求特解为 $1 - e^{-y} = x$


例6. 设函数 $y(x)$ ($x \geq 0$) 二阶可导, 且 $y'(x) > 0$, $y(0) = 1$, 过曲线 $y = y(x)$ 上任一点 $P(x, y)$ 作该曲线的切线及 x 轴的垂线, 上述两直线与 x 轴围成的三角形面积记为 S_1 , 区间 $[0, x]$ 上以 $y(x)$ 为曲边的曲边梯形面积记为 S_2 , 且 $2S_1 - S_2 \equiv 1$, 求 $y = y(x)$ 满足的方程.

解: 因为 $y(0) = 1$, $y'(x) > 0$, 所以 $y(x) > 0$.

设曲线 $y = y(x)$ 在点 $P(x, y)$ 处的切线倾角为 α , 于是

$$S_1 = \frac{1}{2} y^2 \cot \alpha = \frac{y^2}{2 y'}$$

$$S_2 = \int_0^x y(t) dt$$



利用 $2S_1 - S_2 = 1$, 得 $\frac{y^2}{y'} - \int_0^x y(t) dt = 1$

两边对 x 求导, 得 $yy'' = (y')^2$

定解条件为 $y(0) = 1, y'(0) = 1$


令 $y' = p(y)$, 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 方程化为

$$yp \frac{dp}{dy} = p^2 \longrightarrow \frac{dp}{p} = \frac{dy}{y}$$

解得 $p = C_1 y$, 利用定解条件得 $C_1 = 1$, 再解 $y' = y$, 得

$y = C_2 e^x$, 再利用 $y(0) = 1$ 得 $C_2 = 1$, 故所求曲线方程为

$$y = e^x$$



内容小结

可降阶微分方程的解法 —— 降阶法

1. $y^{(n)} = f(x)$

逐次积分

2. $y'' = f(x, y')$

令 $y' = p(x)$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx}$

3. $y'' = f(y, y')$

令 $y' = p(y)$, 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$

思考与练习

1. 方程 $y'' = f(y')$ 如何代换求解？

答: 令 $y' = p(x)$ 或 $y' = p(y)$ 均可.

一般说, 用前者方便些.

有时用后者方便.

2. 解二阶可降阶微分方程初值问题需注意哪些问题？

答: (1) 一般情况, 边解边定常数计算简便.

(2) 遇到开平方时, 要根据题意确定正负号.

例题 设物体 A 从点 $(0, 1)$ 出发, 以大小为常数 v 的速度沿 y 轴正向运动, 物体 B 从 $(-1, 0)$ 出发, 速度大小为 $2v$, 方向指向 A, 试建立物体 B 的运动轨迹应满足的微分方程及初始条件.

提示: 设 t 时刻 B 位于 (x, y) , 如图所示, 则有

$$y' = \frac{1 + vt - y}{-x}$$


$$s = \int_{-1}^x \sqrt{1 + y'^2} dx$$

去分母后两边对 x 求导, 得

$$x \frac{d^2 y}{dx^2} = -v \frac{dt}{dx} \quad (1)$$

又由于 $2v = \frac{ds}{dt} = \sqrt{1 + y'^2} \frac{dx}{dt}$

弧微分 $ds = \sqrt{1 + y'^2} dx$



$$\therefore \frac{dt}{dx} = \frac{1}{2v} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$$

代入 ① 式得所求微分方程:

$$x \frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{1}{2} \sqrt{1 + y'^2} = 0$$

其初始条件为

$$y|_{x=-1} = 0, \quad y'|_{x=-1} = 1$$

