

Exercícios Propostos¹△ Integral indefinida

1. Encontre a primitiva mais geral da função, isto é, a *integral indefinida* de $f(x)$ com respeito a x : $\int f(x)dx = F(x) + C$, onde $F'(x) = f(x)$.

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} f(x) = 7x^2 + 5x + 2 & \text{(c)} f(x) = \frac{2}{x\sqrt{x}} + \sqrt[3]{x} & \text{(e)} f(x) = 7x^4 - \sec^2 x \\ \text{(b)} f(x) = x^{3/4} & \text{(d)} f(x) = e^{4x} + 3\cos x & \text{(f)} f(x) = 3e^x + \frac{1}{4x} - \sin x \end{array}$$

2. Resolva os problemas de valor inicial (PVI) abaixo.

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \frac{dy}{dx} = 2x - 5, \quad y(2) = 0 & \text{(d)} \frac{d^2y}{dx^2} = 2 - 6x; \quad y'(0) = 4, \quad y(0) = 1 \\ & \text{(sugestão: defina } u = y'(x) \text{ e } u' = y''(x)) \\ \text{(b)} y' = x^{-1}, \quad y(\pi) = -3 & \\ \text{(c)} y' = \frac{1}{x^2} + x, \quad x > 0; \quad y(2) = 1 & \text{(e)} y'' = x + \sqrt{x}; \quad y'(1) = 2, \quad y(1) = 1 \end{array}$$

△ Teorema Fundamental do Cálculo

3. Determine o valor das integrais abaixo usando o teorema da variação total.

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} \int_{-1}^5 (1 + 3x) dx & \text{(d)} \int_{-2}^{-1} \left(\frac{1}{x^3} + \frac{2}{x} + x \right) dx & \text{(g)} \int_0^{\pi/4} \sec^2 x dx \\ \text{(b)} \int_{-2}^0 (x^2 + x) dx & \text{(e)} \int_0^{\pi/2} (x + \cos x) dx & \text{(h)} \int_0^2 (e^x + x^e) dx \\ \text{(c)} \int_0^1 (x^3 - 3x^2 + 8) dx & \text{(f)} \int_0^{\pi} (2\sin x - 5^x) dx & \text{(i)} \int_1^4 \frac{1}{2\sqrt{x}} dx \end{array}$$

4. Calcule as integrais definidas a seguir.

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \int_0^4 f(x)dx, \text{ onde } f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{se } 0 \leq x \leq 2 \\ 2x, & \text{se } 2 < x \leq 4 \end{cases} \\ \text{(b)} \int_0^3 f(x)dx, \text{ onde } f(x) = \begin{cases} 7 - x, & \text{se } x < 2 \\ x + 3, & \text{se } x \geq 2 \end{cases} \\ \text{(c)} \int_{-4}^4 f(x)dx, \text{ onde } f(x) = |x - 1| \end{array}$$

5. Use o teorema fundamental do cálculo para encontrar a derivada da função g .

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} g(x) = \int_0^x \sqrt{1 + \sec^2 t} dt & \text{(c)} g(x) = \int_x^2 \frac{u^3}{1 + u^2} du & \text{(e)} g(x) = \int_{\sqrt{x}}^0 \tan(t^2) dt \\ \text{(b)} g(x) = \int_1^x \ln u du & \text{(d)} g(x) = \int_1^{\cos x} t^2 \sin t dt & \end{array}$$

¹Resolva os exercícios sem omitir nenhuma passagem em seus cálculos. Respostas sem resolução e/ou justificativa não serão consideradas. **Data máxima de entrega: 21/03/2024 até 14:00 horas**

△ Valor médio de uma função

6. O valor médio M_f de uma função contínua $f(x)$ no intervalo $[a, b]$ é definido como

$$M_f = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx. \text{ Calcule o valor médio das funções no intervalo dado.}$$

(a) $f(x) = x^2 - 1, \quad [0, \sqrt{3}]$

(d) $g(x) = \sqrt{x}, \quad [1, 4]$

(b) $f(x) = \frac{1}{x}, \quad [1, 4]$

(e) $f(t) = e^{-t}, \quad [0, 5]$

(c) $g(x) = \cos x, \quad [0, \pi/2]$

(f) $f(\theta) = \sec \theta \tan \theta, \quad [0, \pi/4]$

7. Uma partícula move-se ao longo de uma reta com posição $s(t)$ e velocidade instantânea $v(t) = s'(t)$. Seja $a(t) = v'(t) = 2t - 1$ sua aceleração instantânea e $v(0) = -6$ m/s sua velocidade inicial.

(a) Encontre $v(t)$ e estude seu sinal para $t \geq 0$.

(b) Determine o deslocamento da partícula durante o período de tempo $1 \leq t \leq 4$ usando o teorema da variação total, isto é, $\Delta s = s(4) - s(1) = \int_1^4 v(t) dt$, e calcule a velocidade média $v_m = \Delta s / \Delta t$ da partícula nesse período de tempo.

(c) Determine a distância percorrida pela partícula nesse mesmo período de tempo, isto é, calcule $\int_1^4 |v(t)| dt$. (O módulo de $v(t)$ é necessário para incluir no cálculo as distâncias percorridas com velocidade negativa que foram subtraídas no cálculo do deslocamento.)

△ Área entre gráficos

8. Determine a área da região delimitada por:

(a) $y = f(x) = x$ e $y = g(x) = x^2 - x$.

(b) $y = f(x) = -x + 1$, o eixo x e as retas $x = -2$ e $x = 0$.

(c) $y = f(x) = x^2$ e $y = g(x) = -x^2 + 4x$.

(d) $y = f(x) = 7 - 2x^2$ e $y = g(x) = x^2 + 4$.

9. Calcule a área assinalada nas figuras a seguir.

