

# Einführung in die Mathematik für Informatiker, Cheatsheet

Tobias Kadenbach

February 23, 2020

## Contents

<b>1</b>	<b>Gruppen</b>	<b>1</b>
1.1	Definition . . . . .	1
1.2	Darstellung und abelsche Gruppen . . . . .	2
1.3	Gruppenisomorphie . . . . .	2
1.4	Erzeugendensystem . . . . .	2
1.5	Einheitengruppen . . . . .	3
<b>2</b>	<b>Satz von Euler Fermat</b>	<b>3</b>

## 1 Gruppen

### 1.1 Definition

$(G, \cdot)$  ist eine Gruppe falls:

- abgeschlossen bzgl.  $\cdot$
- assoziativ
- neutrales Element mit  $\exists e \in G \forall g \in G e \cdot g = g \cdot e = g$
- Inverse:  $\forall g \in G \exists g^{-1} \in G g \cdot g^{-1} = g^{-1} \cdot g = e$

## 1.2 Darstellung und abelsche Gruppen

Eine mögliche Darstellung einer Gruppe ist eine sogenannte Gruppentafel dabei wird jedes Element der Gruppe in eine Zeile und eine Spalte geschrieben und anschließend werden so die Elemente der Gruppe mit der Gruppenoperation verbunden. Das ausfüllen erfolgt dabei nach dem Sudokuprinzip (in jeder Zeile und Spalte darf jedes Element nur exakt einmal vorkommen). Eine Gruppe wird auch abelsche genannt falls diese zur Hauptdiagonale symmetrisch ist.

## 1.3 Gruppenisomorphie

Eine Gruppe  $g$  ist Isomorph zu einer anderen Gruppe  $h$  wenn:

- $h$  ist selber eine Gruppe
- es existiert ein Isomorphismus der jedem Element der Gruppe  $g$  ein Element der Gruppe  $h$  eineindeutig zuordnet es muss gelten wenn  $a \mapsto x$ ,  $b \mapsto y$  und  $c \mapsto z$  und gilt  $a \cdot b = c$ , dann muss auch  $x \cdot y = z$  gelten.
- die Homomorphie Eigenschaft ist erfüllt ( $h(a \cdot b) = h(a) \cdot h(b)$ )

## 1.4 Erzeugendensystem

Ein Element einer Gruppe ist Erzeugendensystem wenn mit diesem Element und der Gruppenoperation jedes Element der Gruppe erzeugt werden kann.  
Beispiel:

$(\mathbb{Z}_n, +)$ :  $m \in \mathbb{Z}_n$  ist Erzeuger gleichbedeutend sind:

- $m$  ist Einheit
- $\text{ggT}(m, n) = 1$

( $\mathbb{Z}_n$  ist **zyklisch**, denn z.B.  $\langle \{1\} \rangle = \mathbb{Z}_n$ )

Die Anzahl an Erzeugern (o.a. Primitivwurzeln) lässt sich durch:  $\phi(n)$  errechnen.

Beispiel:

$(\mathbb{Z}_{13}, +)$  hat  $\phi(13) = 12$  Erzeuger.

## 1.5 Einheitengruppen

Einheiten Gruppen  $\mathbb{Z}_n^*$  enthalten nur die Einheiten der Gruppe  $\mathbb{Z}_n$

Beispiel:

Eine Primitivwurzel von  $\mathbb{Z}_{13}^*$  finden:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$2^n$	2	4	8	$16 \equiv 3$	6	12	$24 \equiv 11$	$22 \equiv 9$	$18 \equiv 5$	10	$20 \equiv 7$	$14 \equiv 1$

## 2 Satz von Euler Fermat

Seien  $a, n \in \mathbb{N}$  und  $\text{ggT}(a, n) = 1$  dann gilt:

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

Rechenbeispiel:

Berechnen Sie die letzten zwei Ziffern der Zahl  $211^{1043}$ : Also  $211^{1043} \pmod{100}$  da 2 Stellen.