


Guide d'administration par injection sous-cutanée de Noromby® (énoxaparine sodique) pour les professionnels de la santé



La graisse située dans le bas-ventre est le site d'injection recommandé. Choisissez une zone sur le côté droit ou gauche de l'abdomen. N'injectez pas à moins de 5 cm du nombril. Alternez les sites d'injection, en fonction de la dernière zone injectée.



Faites asseoir ou allonger le patient dans une position confortable. Lavez-vous les mains. Nettoyez (ne frottez pas) la zone d'injection avec un tampon imbibé d'alcool.



Enlevez délicatement le capuchon de l'aiguille en le tirant bien droit de la seringue. N'expulsez pas la bulle d'air de la seringue préremplie de 30 ou de 40 mg (pour éviter la perte de médicament).




Pincez délicatement la zone nettoyée de l'abdomen entre votre index et votre pouce pour former un pli dans la peau. Assurez-vous de tenir le pli cutané tout au long de l'injection.



Tenez la seringue de manière à ce que l'aiguille pointe directement vers le bas (verticalement, à un angle de 90°). Insérez toute la longueur de l'aiguille dans le pli cutané. Une fois l'aiguille insérée, il ne faut pas bouger la seringue. Injectez lentement le contenu en poussant le piston et en maintenant le pli cutané.

Assurez-vous que la seringue est vide avant de la retirer de l'abdomen du patient.



1. En gardant votre pouce sur le piston, enlevez l'aiguille en la tirant à angle droit.
 2. Une fois que l'aiguille est sortie de l'abdomen du patient, enfoncez le piston jusqu'au fond (ce qui nécessite une certaine pression); vous entendrez un « clic » lorsque le manchon protecteur recouvrira l'aiguille. Appliquez une légère pression sur la peau au site d'injection pendant plusieurs secondes avec un tampon imbibé d'alcool, ce qui aidera à réduire tout suintement du médicament ou saignement. Ne frottez pas le site d'injection.
- Jetez la seringue usagée dans un récipient pour objets pointus et tranchants.

NOROMBY (énoxaparine sodique) est indiqué en :

- prophylaxie des troubles thromboemboliques (thrombose veineuse profonde – TVP) consécutifs aux interventions chirurgicales suivantes :
 - ◊ chirurgie orthopédique de la hanche ou du genou; l'emploi de NOROMBY est indiqué pendant l'hospitalisation ou après le congé de l'hôpital pour la prévention à long terme de la maladie thromboembolique veineuse à la suite d'une chirurgie de remplacement de la hanche;
 - ◊ chirurgie abdominale, gynécologique ou urologique comportant un risque élevé;
 - ◊ chirurgie colorectale.
- prophylaxie de la TVP chez les patients hospitalisés recevant des soins médicaux qui sont exposés à un risque modéré de TVP, alités en raison d'une insuffisance cardiaque aiguë modérée ou grave (insuffisance cardiaque de classe III ou IV selon la NYHA), d'une insuffisance respiratoire aiguë ayant révélé la présence ou s'étant compliquée d'une insuffisance respiratoire chronique mais n'exigeant pas de ventilation assistée et d'une infection aiguë des voies respiratoires (à l'exception d'un choc septique), et qui doivent recevoir un traitement prophylactique de courte durée contre la TVP.
- prévention de la formation de thrombus dans le circuit de la circulation extracorporelle durant l'hémodialyse.

L'emploi de NOROMBY est aussi indiqué dans les cas suivants :

- traitement de la TVP, en présence ou en l'absence d'une embolie pulmonaire;
- traitement de l'angine instable ou de l'infarctus du myocarde (IM) sans onde Q, associé à la prise d'acide acétylsalicylique (AAS);
- traitement de l'infarctus aigu du myocarde avec sus-décalage du segment ST (STEMI), y compris chez les patients devant recevoir des soins médicaux ou de pair avec une intervention coronarienne percutanée (ICP) subséquente.

Pour de plus amples renseignements sur les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, les interactions, la posologie et les conditions d'usage clinique, veuillez consulter la monographie au <https://irp.cdn-website.com/bbcdb0d5/files/uploaded/NOROMBY-PM-FR-2023-03-28.pdf>. Vous pouvez aussi obtenir les modalités de l'autorisation de mise sur le marché en appelant Juno Pharmaceuticals Canada au 1 888 882-8827 ou au 1 866 663-1747.

Il faut inspecter visuellement la solution Noromby pour vérifier si elle est claire et s'il y a des particules, un précipité, un changement de couleur ou des fuites avant l'administration. Ne pas utiliser si la solution est trouble ou si elle présente des particules, un changement de couleur ou une fuite.