#bangga melayani bangsa BerAKHLAK

BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
STASIUN KLIMATOLOGI D.I YOGYAKARTA

Foto : Senja di Pantai Kesirat, Gunungkidul

PREDIKSI MUSIM KEMARAU 2026 D.I YOGYAKARTA

MARET 2026

PMK 2026

0811-2638-113

staklim-yogya.bmkg.go.go.id

staklim-yogyakarta@bmkg.go.go.id

staklim_jogja

KATA PENGANTAR

Publikasi buletin prediksi musim kemarau 2026 di D.I Yogyakarta merupakan salah satu bentuk pelayanan jasa klimatologi yang dihasilkan oleh Stasiun Klimatologi D.I Yogyakarta. Publikasi buletin prediksi musim kemarau 2026 di D.I Yogyakarta disusun berdasarkan analisis data curah hujan dari stasiun kerjasama BMKG di D.I Yogyakarta dengan memperhatikan dinamika atmosfer - laut skala lokal, regional, dan global.

Buletin prediksi musim kemarau 2026 berisi informasi prediksi awal musim kemarau 2026, prediksi sifat hujan selama periode musim kemarau 2026, perbandingan awal musim kemarau 2026 terhadap rata-ratanya atau normalnya selama 30 tahun (1991-2020), prediksi puncak musim kemarau 2026, prediksi durasi musim kemarau 2026, prediksi curah hujan Musim Kemarau tahun 2026 dan prediksi akhir musim kemarau 2026 di wilayah D.I Yogyakarta. Berdasarkan pengelompokan pola distribusi curah hujan rata - rata bulanan periode 30 tahun (1991-2020) maka secara klimatologis di wilayah D.I Yogyakarta terdiri atas 8 Zona Musim (ZOM) yaitu daerah yang mempunyai batas yang jelas antara periode Musim Kemarau dan periode musim kemarau.

Awal musim kemarau 2026 di D.I Yogyakarta diprakirakan pada bulan **Dasarian III April 2026** sebanyak **5 ZOM (62.5 %),** dan **Dasarian I Mei 2026** sebanyak **3 ZOM (37.5).** Sifat hujan musim kemarau 2026 D.I Yogyakarta diprediksi **7 ZOM (87.5%) dalam kategori Bawah Normal (BN)** dan **1 ZOM (12.5%) dalam kategori Normal (N) .** Jika **dibandingkan terhadap normalnya** selama 30 tahun (1991-2020), perbandingan awal musim kemarau 2026 D.I Yogyakarta dari 8 Zona Musim (ZOM) di D.I Yogyakarta, **5 ZOM (62.5%) sama dengan rata-ratanya, 2 ZOM (25 %)** diprediksi **maju 1 dasarian dari rata-ratanya** dan **1 ZOM (12.5%) mundur 1 dasarian dari rata-ratanya**. Puncak musim kemarau 2026 diprediksi seluruhnya **8 ZOM (100**%) terjadi pada bulan **Agustus 2026**. Durasi musim kemarau 2026 D.I Yogyakarta **7 ZOM (87.5%)** diprediksi selama **19 - 21 dasarian** dan **1 ZOM (12.5%) diprediksi selama 16 - 18 dasarian.** Prediksi curah hujan pada Musim Kemarau tahun 2026 sebanyak **2 ZOM (25 %) diprediksi memiliki curah hujan antara 250 - 300 mm, 3 ZOM (37.5 %) antara 301 - 350 mm, 3 ZOM (37.5 %) Antara 351 - 400 mm.** Akhir musim kemarau 2026 D.I Yogyakarta diprediksi **7 ZOM (87.5 %)** diprediksi berakhir pada **Dasarian I November 2026, 1 ZOM (12.5%) pada Dasarian II Oktober 2026.**

Produk buletin prediksi musim kemarau 2026 di D.I Yogyakarta ini didiseminasikan kepada gubernur, walikota, bupati, instansi pemerintah dan swasta terkait di D.I Yogyakarta guna kepentingan daerah dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan pertanian dan pembangunan lainnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan publikasi ini. Kami juga menerima kritik serta saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan produk selanjutnya.

Yogyakarta, Maret 2026

KEPALA,

Reni Kraningtyas, S.P., M. Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
LAMPIRAN iii
I. PENDAHULUAN 1
A. Posisi Geografis Indonesia 1
1. *El Niño Southern Oscillation* (ENSO) 1
2. *Indian Ocean Dipole* (IOD) 1
3. Sirkulasi Monsun Asia-Australia 2
4. Daerah Pertemuan Angin Antar Tropis (*Inter Tropical Convergence Zone*/ ITCZ) 2
5. Suhu Permukaan Laut di Wilayah Perairan Indonesia 2
B. Keragaman Iklim Indonesia 3
1. Satu Periode Musim 3
2. Zona Musim 3
3. Penentuan Awal musim 4
4. Istilah dan Pengertian dalam Informasi Prediksi Musim 5
II. RINGKASAN 7
A. Kondisi Dinamika Atmosfer dan Laut 7
1. Monitoring dan Prediksi Fenomena ENSO dan IOD 7
2. Monitoring dan Prediksi Sirkulasi Monsun Asia - Australia dan ITCZ 7
3. Monitoring dan Prediksi Suhu Permukaan Laut Indonesia 8
B. Prediksi Musim Kemarau 2026 Pada 8 Zona Musim (ZOM) di D.I Yogyakarta 8
III. ANALISIS MUSIM HUJAN 2025/2026 10
PADA ZONA MUSIM (ZOM) DI D.I YOGYAKARTA 10
A. Analisis Awal Musim Hujan 2025/2026. 10
B. Analisis Perbandingan Awal Musim Hujan 2025/2026Terhadap Rata-ratanya Pada Zona Musim di D.I Yogyakarta 11
IV. PREDIKSI MUSIM KEMARAU 2026 PADA ZONA MUSIM (ZOM) DI D.I YOGYAKARTA 12
A. Prediksi Awal Musim Kemarau 2026 12
B. Prediksi Perbandingan Awal Musim kemarau 2026 Terhadap Rata-ratanya 13
D. Prediksi Puncak Pada Musim Kemarau 2026 14
E. Prediksi Durasi Musim Pada Musim kemarau 2026 15
F. Prediksi Akhir Musim Kemarau 2026 15
G. Prediksi Curah Hujan Musim Kemarau 2026 15

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Analisis Musim Hujan Tahun 2025/2026 pada Zona Musim di D.I Yogyakarta 17

Lampiran 2. Tabel Prediksi Musim Kemarau Tahun 2026 pada Zona Musim di D.I Yogyakarta 18

Lampiran 3. Peta Analisis Awal Musim Hujan Tahun 2025/2026 pada Zona Musim di D.I Yogyakarta 19

Lampiran 4. Peta Perbandingan Analisis Awal Musim Hujan Tahun 2025/2026 Terhadap Rata-ratanya pada Zona Musim di D.I Yogyakarta 19

Lampiran 5. Peta Prediksi Awal pada Musim kemarau 2026 pada Zona Musim di D.I Yogyakarta 20

Lampiran 6. Peta Perbandingan Prediksi Awal Musim kemarau 2026 Terhadap Rata-ratanya pada Zona Musim di D.I Yogyakarta 20

Lampiran 7. Peta Prediksi Sifat Hujan Musim kemarau 2026 pada Zona Musim di D.I Yogyakarta 21

Lampiran 8. Peta Prediksi Puncak Musim kemarau 2026 pada Zona Musim di D.I Yogyakarta 21

Lampiran 9. Peta Prediksi Durasi Musim kemarau 2026 pada Zona Musim di D.I Yogyakarta 22

Lampiran10. Peta Prediksi Curah Hujan Musim kemarau 2026 pada pada Zona Musim di D.I Yogyakarta 22

Lampiran 11. Peta Prediksi Akhir Musim kemarau 2026 pada Zona Musim di D.I Yogyakarta 23

Lampiran12. Peta Normal Curah Hujan Musim Kemarau Periode 1991 – 2020 pada Zona Musim di D.I Yogyakarta 23

I. PENDAHULUAN

A. Posisi Geografis Indonesia

Posisi Geografis Indonesia yang strategis, terletak di **daerah tropis**, **di antara Benua Asia dan Benua Australia, di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, dilalui garis khatulistiwa, terdiri dari pulau dan kepulauan yang membujur dari barat ke timur, serta dikelilingi oleh luasnya lautan** menyebabkan wilayah Indonesia memiliki tingkat keragaman cuaca dan iklim yang tinggi. Keragaman cuaca dan iklim di Indonesia juga dipengaruhi oleh aktivitas fenomena global seperti ***El Niño Southern Oscillation (ENSO)*** dan ***Indian Ocean Dipole (IOD)*****,** fenomena regional seperti **Sirkulasi Monsun Asia-Australia, Daerah Pertemuan Angin Antar Tropis** atau ***Inter Tropical Convergence Zone (ITCZ)*** dan kondisi **suhu permukaan laut** sekitar wilayah Indonesia.

1. El Niño Southern Oscillation (ENSO)

ENSO merupakan fenomena global dari sistem interaksi lautan - atmosfer yang ditandai dengan anomali suhu permukaan laut di wilayah Pasifik Tengah Ekuator. Jika anomali suhu permukaan laut di daerah tersebut **positif** (lebih panas dari rata-ratanya) maka disebut ***El Niño***, namun jika anomali suhu permukaan laut **negatif** (lebih dingin dari rata - ratanya) disebut ***La Niña***. Pengaruh *El Niño* terhadap curah hujan di Indonesia ditentukan oleh beberapa faktor, salah satu diantaranya kondisi suhu perairan wilayah Indonesia. *El Niño* berpengaruh terhadap pengurangan curah hujan secara signifikan jika diikuti dengan mendinginnya kondisi suhu perairan Indonesia (anomali negatif). Namun bila kondisi suhu perairan lebih hangat (anomali positif), *El Niño* tidak signifikan mempengaruhi curah hujan di Indonesia. Sedangkan *La Niña* secara umum menyebabkan curah hujan di Indonesia meningkat apabila disertai dengan menghangatnya suhu permukaan laut di perairan Indonesia. Pengaruh *El Niño* dan *La Niña* juga tergantung musim. Mengingat luasnya wilayah Indonesia, dampak *El Niño*/*La Niña* tidak merata atau seragam di seluruh wilayah.

2. *Indian Ocean Dipole (IOD*)

IOD merupakan fenomena interaksi lautan - atmosfer di Samudera Hindia yang di monitor melalui perhitungan perbedaan nilai antara anomali suhu muka laut

perairan pantai timur Afrika (*West Tropical Indian Ocean, WTIO*) dengan perairan di sebelah barat Sumatera (*South East Tropical Indian Ocean, SETIO*). Perbedaan nilai anomali suhu muka laut di kedua wilayah tersebut dinamakan *Dipole Mode Index (DMI)*. Kejadian IOD **positif**, umumnya berdampak pada berkurangnya curah hujan di Indonesia terutama di bagian barat**.** Sedangkan nilai IOD **negatif***,* berdampak terhadap peningkatan curah hujan di Indonesia bagian barat.

3. Sirkulasi Monsun Asia-Australia

Sirkulasi angin di Indonesia ditentukan oleh pola perbedaan tekanan udara di daratan Australia dan Asia. Pola tekanan udara ini mengikuti pola peredaran matahari dalam setahun. Akibatnya, sirkulasi angin di Indonesia berubah arah secara musiman, atau biasa disebut angin monsun. Sirkulasi angin monsun ini mengalami perubahan arah kurang lebih setiap setengah tahun sekali.

Pola angin baratan terjadi karena adanya tekanan tinggi di Asia dan umumnya berkaitan dengan berlangsungnya musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Pola angin timuran terjadi karena adanya tekanan tinggi di Australia dan biasanya berkaitan dengan berlangsungnya musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia.

4. Daerah Pertemuan Angin Antar Tropis *(Inter Tropical Convergence Zone*/ ITCZ)

ITCZ merupakan daerah tekanan rendah yang memanjang dari barat ke timur dengan posisi berubah mengikuti pergerakan semu matahari ke arah utara dan selatan garis khatulistiwa. Daerah tekanan rendah ini menjadi pertemuan massa udara dari belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Wilayah Indonesia yang dilewati ITCZ pada umumnya berpotensi terjadi pertumbuhan awan - awan hujan.

5. **Suhu Permukaan Laut di Wilayah Perairan Indonesia**

Kondisi suhu permukaan laut di wilayah perairan Indonesia dapat digunakan sebagai salah satu indikator banyak sedikitnya kandungan uap air di atmosfer dan erat kaitannya dengan proses pembentukan awan di atas wilayah Indonesia. Jika suhu permukaan laut dingin maka potensi kandungan uap air di atmosfer relatif sedikit. Sebaliknya, panasnya suhu permukaan laut berpotensi meningkatkan kandungan uap air di atmosfer wilayah Indonesia.

B. Keragaman Iklim Indonesia

Kondisi topografi wilayah Indonesia yang terdiri dari daerah pegunungan, lembah dan pantai merupakan **faktor lokal** yang dapat mempengaruhi **beragamnya** kondisi iklim di Indonesia. Berdasarkan ruang (wilayah) dan waktu, keragaman kondisi iklim ini menyebabkan wilayah Indonesia terbagi menjadi beberapa tipe zona musim. Informasi iklim berupa musim hujan dan musim kemarau disampaikan berbasis zona musim, dimana untuk saat ini menggunakan hasil analisis data normal periode 1991-2020. Informasi prediksi musim secara umum memiliki empat informasi penting meliputi **awal musim, perbandingan terhadap normal, sifat hujan pada musim tersebut,** dan **puncak musim**.

1. Satu Periode Musim

Satu periode musim kemarau adalah periode yang ditemukan dalam pola hujan tahunan, dimana terdapat **minimal tiga** dasarian berturut-turut dengan curah hujan kurang dari 50 mm per dasarian atau total ketiganya kurang dari 150 mm (syarat curah hujan dasarian pertama harus kurang dari 50 mm per dasarian). **Satu periode musim hujan** adalah periode yang ditemukan dalam pola hujan tahunan, dimana terdapat **minimal tiga** dasarian berturut-turut dengan curah hujan lebih atau sama dengan 50 mm per dasarian atau total ketiganya lebih atau sama dengan 150 mm (syarat curah hujan dasarian pertama harus lebih besar atau sama dengan 50 mm per dasarian).

2. Zona Musim

Berdasarkan normal curah hujan periode 1991-2020, wilayah Indonesia memiliki **699 ZOM** yang secara umum terbagi menjadi **3 tipe zona musim (ZOM).** Secara terinci pembagian tipe zona musimnya sebagai berikut :

1) **Tipe ZOM Monsunal**, adalah ZOM yang memiliki pola hujan tahunan yang memiliki satu periode hujan tertinggi dan satu periode hujan terendah. hujan tertinggi terjadi pada periode berlangsungnya Monsun Asia, biasanya terjadi di sekitar awal atau akhir tahun. ZOM dengan tipe monsunal dibedakan menjadi dua sub tipe, yaitu:

a. **Tipe ZOM Monsunal-1**, berpola monsunal dan hanya mempunyai satu musim, yaitu Musim Kemarau Sepanjang Tahun (HST).
b. **Tipe ZOM Monsunal-2**, berpola monsunal dan mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan Musim Kemarau.

2) **Tipe ZOM Ekuatorial,** adalah ZOM yang memiliki pola hujan tahunan dengan dua puncak hujan, tipe ini terdiri dari beberapa sub tipe**:**
   a. **Tipe ZOM Ekuatorial-1**, berpola ekuatorial dan hanya mempunyai satu musim, yaitu Musim Kemarau Sepanjang Tahun (HST).
   b. **Tipe ZOM Ekuatorial-2**, berpola ekuatorial, dan mempunyai dua musim yaitu Musim Kemarau dan musim kemarau.
   c. **Tipe ZOM Ekuatorial-4**, berpola ekuatorial, dan mempunyai empat musim yaitu dua periode Musim Kemarau dan dua periode musim kemarau.

3) **Tipe ZOM Lokal**, adalah ZOM yang memiliki pola hujan tahunan berbeda dengan tipe monsun dan juga berbeda dengan tipe ekuatorial. ZOM ini umumnya memiliki satu periode hujan tertinggi dan satu periode hujan rendah, namun hujan tertingginya tidak terjadi pada periode Monsun Asia. Tipe ini terdiri dari:
   a) **Tipe ZOM Lokal-1**, berpola lokal dan hanya mempunyai satu musim, yaitu periode Musim Kemarau Sepanjang Tahun (HST).
   b) **Tipe ZOM Lokal-2**, berpola lokal, dan mempunyai dua musim yaitu satu periode Musim Kemarau dan satu periode musim kemarau.
   c) **Tipe ZOM Lokal-4**, berpola lokal, dan mempunyai empat musim yaitu dua periode Musim Kemarau dan dua periode musim kemarau.
   d) **Tipe ZOM Lokal-5**, berpola lokal dan hanya mempunyai satu musim, yaitu periode Kemarau Sepanjang Tahun (KST).

3. Penentuan Awal musim

Penentuan awal musim, baik musim hujan maupun musim kemarau didasarkan pada jumlah curah hujan yang dihitung per dasarian dengan ketentuan sebagai berikut :

Awal Musim Hujan ditetapkan berdasar jumlah curah hujan dalam satu dasarian (10 hari) kurang dari 50 milimeter dan diikuti oleh 2 (dua) dasarian berikutnya. Permulaan Musim Kemarau, bisa terjadi lebih awal (maju), sama, atau lebih lambat (mundur) dari normalnya (curah hujan1991 - 2020).

Awal Musim Kemarau ditetapkan berdasar jumlah curah hujan dalam satu dasarian (10 hari) sama atau lebih dari 50 milimeter dan diikuti oleh 2 (dua) dasarian berikutnya. Permulaan Musim Kemarau, bisa terjadi lebih awal (maju), sama, atau lebih lambat (mundur) dari normalnya (curah hujan 1991 - 2020).

Dasarian adalah rentang waktu selama 10 (sepuluh) hari. Dalam satu bulan dibagi menjadi 3 (tiga) dasarian, yaitu :

a. Dasarian I : tanggal 1 sampai dengan 10.
b. Dasarian II : tanggal 11 sampai dengan 20.
c. Dasarian III : tanggal 21 sampai dengan akhir bulan.

4. Istilah dan Pengertian dalam Informasi Prediksi Musim

Selain informasi awal musim, dalam buku ini juga disampaikan informasi sifat hujan, perbandingan terhadap normal dan puncak musim selama periode musim berlangsung. Istilah tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Sifat hujan merupakan perbandingan antara jumlah curah hujan selama rentang waktu yang ditetapkan (satu periode Musim Kemarau atau satu periode musim kemarau) terhadap jumlah curah hujan normal pada rentang yang sama. Sifat hujan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :

a. **Atas Normal (AN)** : jika nilai curah hujan lebih dari 115% terhadap normal.
b. **Normal (N)** : jika nilai curah hujan antara 85% - 115% terhadap normal.
c. **Bawah Normal (BN)** : jika nilai curah hujan kurang dari 85% terhadap normal.

Puncak Musim Hujan merupakan periode dimana terdapat jumlah curah hujan tertinggi dalam periode akumulasi tiga dasarian berturut – turut. Jika tiga dasarian tersebut berada pada bulan yang berbeda, bulan yang dinyatakan sebagai puncak Musim Hujan adalah dimana dua dasarian tersebut berada.

Puncak Musim Kemarau merupakan periode dimana terdapat jumlah curah hujan terendah dalam periode akumulasi tiga dasarian berturut-turut. Jika tiga dasarian tersebut berada pada bulan yang berbeda, bulan yang dinyatakan sebagai puncak musim kemarau adalah dimana 2 (dua) dasarian tersebut berada. Jika terdapat minimal 3 (tiga) dasarian bernilai 0 mm, maka bulan yang dinyatakan sebagai puncak musim kemarau diambil di tengah periode tersebut.

HST, Hujan Sepanjang Tahun merupakan periode musim hujan sepanjang tahun.
KST, Kemarau Sepanjang Tahun merupakan periode musim kemarau sepanjang tahun.

II. RINGKASAN

A. Kondisi Dinamika Atmosfer dan Laut

Dinamika atmosfer dan laut dimonitor dan diprakirakan berdasarkan aktivitas fenomena iklim, meliputi: *El Niño Southern Oscillation*, *Indian Ocean Dipole*, sirkulasi Monsun Asia - Australia, *Inter Tropical Convergence Zone*, dan suhu permukaan laut Indonesia. Monitoring dan prediksi kondisi dinamika atmosfer dan laut dimaksud yang akan terjadi pada musim kemarau 2026, adalah sebagai berikut:

1. Monitoring dan Prediksi Fenomena *ENSO* dan *IOD*

a. *El Niño Southern Oscillation (ENSO)*

Berdasarkan hasil pemantauan suhu muka laut, indeks ENSO (*El Niño Southern Oscillation*) pada Februari 2026 menunjukkan nilai sebesar -0,28 yang mengindikasikan bahwa ENSO dalam fase Netral, setelah sebelumnya berada pada fase La Niña Lemah sejak Oktober 2025.

b. Indian Ocean Dipole (IOD)

Sementara itu, anomali suhu permukaan laut di Samudera Hindia menunjukkan bahwa IOD (Indian Ocean Dipole) berada pada fase Netral dengan nilai Indeks Dipole Mode (DMI) sebesar +0,4.

Prediksi menunjukan bahwa ENSO dan IOD akan berada pada fase Netral pada periode Maret hingga Juni 2026, sementara itu suhu muka laut di perairan Indonesia secara umum diprediksi tetap menunjukkan kondisi normal hingga hangat dengan kisaran nilai -0,5°C hingga +2,0°C.

2. Monitoring dan Prediksi Sirkulasi Monsun Asia - Australia dan *ITCZ*

a. Sirkulasi Monsun Asia – Australia

Angin Timuran (Monsun Australia) mulai memasuki wilayah Indonesia bagian selatan pada bulan Maret 2026, kemudian diprediksi akan mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia mulai Juni 2026.

b. Daerah Pertemuan Angin Antar Tropis *(Inter Tropical ConvergenceZone/ITCZ)*

Sirkulasi angin pada lapisan 850mb pada Februari 2026 menunjukkan wilayah Indonesia masih didominasi oleh Angin Baratan (Monsun Asia) dengan posisi *Inter Tropical Convergence Zone* (ITCZ) berada di sekitar selatan ekuator dan diprediksi secara gradual akan bergerak ke arah utara mengikuti pergerakan

tahunannya. Suhu permukaan laut sekitar wilayah Indonesia pada Februari 2026 umumnya dalam kondisi Normal hingga Hangat dengan nilai anomali suhu permukaan laut antara -0,5°C hingga 2,0°C.

3. **Monitoring dan Prediksi Suhu Permukaan Laut Indonesia**

Kondisi anomali suhu muka laut Indonesia pada Februari 2026 secara umum dalam kondisi netral hingga hangat sebesar yakni berkisar antara -0.5 °C hingga +2.0°C. Untuk bulan Maret – April 2026, kondisi anomali suhu muka laut diprediksi netral hingga hangat (-0.5°C hingga +2.0°C).

B. Prediksi Musim Kemarau 2026 Pada 8 Zona Musim (ZOM) di D.I Yogyakarta

- **Prediksi Awal Musim Kemarau 2026**
  - Dasarian III April 2026 : 5 ZOM (62.5 % dari 8 ZOM)
  - Dasarian I Mei 2026 : 3 ZOM (35.5 % dari 8 ZOM)
- **Perbandingan Prediksi Awal Musim Kemarau 2026 Terhadap Rata - Ratanya (Periode1991-2020)**
  - Maju 1 dasarian dari rata-ratanya : 2 ZOM (25 % dari 8 ZOM)
  - Sama dari rata-ratanya : 5 ZOM (62.5% dari 8 ZOM)
  - Maju 1 dasarian dari rata-ratanya : 1 ZOM (12.5 % dari 8 ZOM)
- **Prediksi Sifat Hujan Musim Kemarau 2026**
  - Normal (N) : 1 ZOM (12.5 % dari 8 ZOM)
  - Bawah Normal (BN) : 7 ZOM (87.5 % dari 8 ZOM)
- **Prediksi Puncak Musim Kemarau 2026**
  - Bulan Agustus 2026 : 8 ZOM (100 % dari 8 ZOM)
- **Prediksi Durasi Musim Kemarau 2026**
  - 16 – 18 Dasarian : 1 ZOM (12.5 % dari 8 ZOM)
  - 19 – 21 Dasarian : 7 ZOM (87.5 % dari 8 ZOM)
- **Prediksi Jumlah Curah Hujan Musim Kemarau 2026**
  - 250 – 300 mm : 2 ZOM (25 % dari 8 ZOM)
  - 301 – 350 mm : 3 ZOM (35.5 % dari 8 ZOM)
  - 351 - 400 mm : 3 ZOM (35.5 % dari 8 ZOM)
- **Prediksi Akhir Musim Kemarau 2026**
  - Dasarian II Oktober 2026 : 1 ZOM (12.5 % dari 8 ZOM)
  - Dasarian I November 2026 : 7 ZOM (87.5 % dari 8 ZOM)

Prediksi Musim Kemarau 2026 di wilayah D.I Yogyakarta secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Awal musim kemarau 2026 D.I Yogyakarta di 8 Zona Musim (ZOM) diprediksi terjadi pada **dasarian III April 2026** sebanyak **5 ZOM (62.5 %)** dan **dasarian I Mei 2026** sebanyak **3 ZOM (35.5%)**.
- Jika dibandingkan terhadap normalnya selama 30 tahun (1991-2020), perbandingan awal musim kemarau 2026 D.I Yogyakarta dari 8 Zona Musim (ZOM) di D.I Yogyakarta, **2 ZOM (87.5 %)** diprediksi **maju 1 dasarian** dari rata-ratanya, **5 ZOM (62.5%) sama** dengan rata-ratanya dan **1 ZOM (12.5%) mundur 1 dasarian** dari rata-ratanya .
- Sifat Musim Kemarau selama musim kemarau 2026 D.I Yogyakarta, dari 8 Zona Musim (ZOM) di D.I Yogyakarta diprediksi **1 ZOM (12.5%)** dalam kategori **Normal (N)** dan **7 ZOM (87.5%)** dalam kategori **Normal (N)** .
- Puncak Musim Kemarau selama musim kemarau 2026 D.I Yogyakarta, dari 8 Zona Musim (ZOM) di D.I Yogyakarta diprediksi **8 ZOM (100**%) terjadi pada bulan **Agustus 2026**.
- Durasi Musim Kemarau selama musim kemarau 2026 D.I Yogyakarta, dari 8 Zona Musim (ZOM) di D.I Yogyakarta **1 ZOM (12.5%)** diprediksi selama **16 - 18 dasarian, dan 7 ZOM (87.5%)** diprediksi selama **19 - 21 dasarian**.
- Jumlah curah hujan pada musim kemarau 2026 D.I Yogyakarta, dari 8 Zona Musim (ZOM) di D.I yogyakarta **2 ZOM (25 %)** diprediksi memiliki curah hujan antara **250 – 300 mm**, **3 ZOM (35.5 %)** antara **301 - 350 mm, 3 ZOM (35.5 %) lebih dari 351 - 400 mm.**
- Akhir musim kemarau 2026 di D.I Yogyakarta, dari 8 Zona Musim (ZOM) di D.I Yogyakarta **1 ZOM (12.5 %)** diprediksi berakhir pada **dasarian II Oktober 2026**, dan **7 ZOM (87.5%)** pada **dasarian II November 2026.**

III. ANALISIS MUSIM HUJAN 2025/2026
PADA ZONA MUSIM (ZOM) DI D.I YOGYAKARTA

A. Analisis Awal Musim Hujan 2025/2026.

AWAL MUSIM HUJAN	URAIAN
Dasarian II Oktober	Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Samigaluh dan Kalibawang. Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Prambanan. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Gedangsari, Ngawen, Semin, Ponjong. Sebagian meliputi Kapanewon Karangmojo dan Patuk.
Dasarian III Oktober	Seluruh kapanewon di Kabupaten Kulon Progo kecuali Kapanewon Samigaluh dan Kalibawang. Seluruh kapanewon di Kabupaten Sleman kecuali Kapanewon Prambanan. Seluruh kemantren di Kota Yogyakarta. Seluruh kapanewon di Kabupaten Bantul. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Purwosari, Panggang, Saptosari, Paliyan, Tanjungsari, Tepus, Rongkop, Girisubo, Semanu, Wonosari, dan Playen. Sebagian meliputi Kapanewon Karangmojo dan Patuk.

B. Analisis Perbandingan Awal Musim Hujan 2025/2026Terhadap Rata-ratanya Pada Zona Musim di D.I Yogyakarta

PERBANDINGAN AWAL MUSIM HUJAN	URAIAN
Maju (lebih cepat) I Dasarian	Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Samigaluh dan Kalibawang.
Sama	Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Girimulyo, Kokap, Temon, Wates, Panjatan, Galur, Lendah, Sentolo, Pengasih, dan nanggulan. Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Turi, Pakem, Cangkringan, Sleman, Prambanan, dan Moyudan. Sebagian meliputi Kapanewon Minggir, Tempel, Ngaglik, dan Ngemplak. Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Sedayu, Pandak, Bantul, Jetis, Imogiri, Pundong, Kretek, Sanden, Srandakan, dan Bambanglipuro. Sebagian meliputi Kapanewon Pajangan, Pleret, dan Dlingo. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Purwosari, Panggang, Gedangsari, Nglipar, Ngawen, dan Semin. Sebagian meliputi Kapanewon Patuk, Karangmojo, dan Ponjong.
Mundur (lebih lambat) I Dasarian	Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Seyegan, Mlati, Godean, Gamping, Depok, Kalasan, dan Berbah. Sebagian meliputi Kapanewon Minggir dan Tempel.

IV. PREDIKSI MUSIM KEMARAU 2026
PADA ZONA MUSIM (ZOM) DI D.I YOGYAKARTA

A. Prediksi Awal Musim Kemarau 2026

AWAL MUSIM KEMARAU	URAIAN
Dasarian III April	Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Girimulyo, Nanggulan, Kokap, Pengasih, Sentolo, Lendah, Galur, Panjatan, Wates, dan Temon. Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Prambanan. Sebagian Kapanewon Minggir dan Moyudan. Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Pandak, Srandakan, Sanden, Kretek, Pundong, Bambanglipuro, Imogiri, Jetis, Bantul. Sebagian Kapanewon Sedayu, Pajangan, Pleret dan Dlingo. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Purwosari, Panggang, Saptosari, Tanjungsari, Tepus, Girisubo, Rongkop, Semanu, Wonosari, Paliyan, Karangmojo, Ponjong, Semin, Nglipar, Ngawen, dan Gedangsari. Sebagian Kapanewon Patuk dan Playen.
Dasarian I Mei	Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Samigaluh, dan Kalibawang. Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Turi, Cangkringan, Pakem, Tempel, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Seyegan, Godean, Gamping, Mlati, Depok, Berbah, Kalasan. Sebagian Kapanewon Minggir, dan Moyudan. Seluruh kemantren di wilaya Kota Yogyakarta. Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Kasihan, Sewon, Piyungan, dan Banguntapan Sebagian Kapanewon Sedayu, Pajangan, Pleret, dan Dlingo. Kabupaten Gunungkidul meliputi sebagian Kapanewon Patuk dan Playen.

B. Prediksi Perbandingan Awal Musim kemarau 2026 Terhadap Rata-ratanya

PERBANDINGAN AWAL MUSIM KEMARAU	URAIAN
Maju (lebih cepat) 1 Dasarian	Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Samigaluh, dan Kalibawang. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Paliyan, Wonosari, Semanu, Saptosari, Tanjungsari, Tepus, Rongkop, dan Girisubo. Sebagian Kapanewon Playen, Karangmojo, dan Ponjong.
Sama	Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Girimulyo, Nanggulan, Kokap, Pengasih, Sentolo, Temon, Wates, Panjatan, Galur, dan Lendah. Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Turi, Pakem, Cangkringan, dan Prambanan. Sebagian Kapanewon Tempel, Sleman, Ngaglik, Minggir, dan Moyudan. Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Pandak, Bantul, Jetis, Imogiri, Bambanglipuro, Srandakan, Sanden, Kretek, dan Pundong. Sebagian Kapanewon Sedayu, Pajangan, Pleret, dan Dlingo. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Gedangsari, Nglipar, Ngawen, Semin. Sebagian Kapanewon Patuk, Karangmojo, Ponjong, dan Wonosari.
Mundur (lebih lambat) 1 Dasarian	Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Seyegan, Mlati, Godean, Ngemplak, Kalasan, Gamping, Depok, Berbah. Sebagian meliputi Kapanewon Minggir, Tempel, dan Ngemplak. Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Kasihan, Sewon, Banguntapan, dan Piyungan. Sebagian meliputi Kapanewon Pajangan, Pleret, dan Dlingo. Kabupaten gunungkidul meliputi Kapanewon Playen dan Patuk.

C. Prediksi Sifat Hujan Pada Musim Kemarau 2026

SIFAT MUSIM KEMARAU	URAIAN
Normal (N)	Seluruh kapanewon di Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Turi, Pakem, Cangkringan, dan Sleman. Sebagian meliputi Kapanewon Tempel, Ngaglik, dan Ngemplak. Seluruh kemantren di Kota Yogyakarta. Seluruh kapanewon di Kabupaten Bantul. Seluruh kapanewon di Kabupaten Gunungkidul.
Bawah Normal (BN)	Seluruh kapanewon Kulon Progo. Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Seyegan, Mlati, Godean, Gamping, Depok, Berbah, Prambanan, dan Kalasan. Sebagian meliputi Kapanewon Tempel, Ngaglik, dan Ngemplak. Seluruh kemantren di Kota Yogyakarta. Seluruh kapanewon di Kabupaten Bantul. Seluruh kapanewon di Kabupaten Gunungkidul.

D. Prediksi Puncak Pada Musim Kemarau 2026

PUNCAK MUSIM KEMARAU	URAIAN
Agustus 2026	Seluruh kapanewon di Kabupaten Kulon Progo. Seluruh kapanewon di Kabupaten Sleman. Seluruh kemantren di Kota Yogyakarta. Seluruh kapanewon di Kabupaten Bantul. Seluruh kapanewon di Kabupaten Gunungkidul.

E. Prediksi Durasi Musim Pada Musim kemarau 2026

PANJANG MUSIM KEMARAU	URAIAN
16 - 18 Dasarian	Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Samigaluh dan Kalibawang.
19 - 21 Dasarian	Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Girimulyo, Nanggulan. Sentolo, Pengasih, Kokap, Temon, Wates, Panjatan, Lendah, dan Galur. Seluruh Kapanewon di Kabupaten Sleman. Seluruh Kemantren di Kota Yogyakarta. Seluruh Kapanewon di Kabupaten Bantul. Seluruh Kapanewon di Kabupaten Gunungkidul.

F. Prediksi Akhir Musim Kemarau 2026

AKHIR MUSIM KEMARAU	URAIAN
Dasarian II Oktober	Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Samigaluh dan Kalibawang.
Dasarian II November	Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Girimulyo, Nanggulan. Sentolo, Pengasih, Kokap, Temon, Wates, Panjatan, Lendah, dan Galur. Seluruh Kapanewon di Kabupaten Sleman. Seluruh Kemantren di Kota Yogyakarta. Seluruh Kapanewon di Kabupaten Bantul. Seluruh Kapanewon di Kabupaten Gungkidul.

G. Prediksi Curah Hujan Musim Kemarau 2026

CURAH HUJAN	URAIAN
250 - 300	Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Girimulyo,

milimeter	Nanggulan, Kokap, Pengasih, Sentolo, Temon, Wates, Panjatan, Galur, dan Lendah. Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Turi, Pakem, Cangkringan, Prambanan. Sebagian Kapanewon Tempel, Sleman, Ngaglik, Minggir, dan Moyudan. Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Pandak, Bantul, Jetis, Imogiri, Bambanglipuro, Srandakan, Sanden, Kretek, dan Pundong. Sebagian Kapanewon Sedayu, Pajangan, Pleret, dan Dlingo. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Gedangsari, Nglipar, Ngawen, dan Semin. Sebagian Kapanewon Patuk, Karangmojo, Ponjong, dan Wonosari.
301 - 350 milimeter	Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Samigaluh dan Kalibawang. Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Pandak, Bantul, Jetis, Imogiri, Bambanglipuro, Srandakan, Sanden, Kretek, dan Pundong. Sebagian Kapanewon Sedayu, Pajangan, Pleret, Dlingo. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Gedangsari, Nglipar, Ngawen, dan Semin. Sebagian Kapanewon Patuk, Karangmojo, Ponjong, dan Wonosari.
351 - 400 milimeter	Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Girimulyo, Nanggulan. Sentolo, Pengasih, Kokap, Temon, Wates, Panjatan, Lendah, dan Galur. Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Turi, Pakem, Cangkringan, dan Sleman. Sebagian meliputi Kapanewon Tempel, Ngaglik, dan Ngemplak. Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Paliyan, Wonosari, Semanu, Saptosari, Tanjungsari, Tepus, Rongkop, dan Girisubo. Sebagian Kapanewon Playen, Karangmojo, dan Ponjong.

LAMPIRAN 1. TABEL ANALISIS MUSIM HUJAN TAHUN 2025/2026
ZONA MUSIM DI D.I YOGYAKARTA

No. ZOM DIY	Wilayah/ Kabupaten	Wilayah/ Kapanewon	NORMAL AWAL MUSIM PERIODE MUSIM HUJAN	PREDIKSI AWAL MUSIM HUJAN 2025/2026	PERBANDINGAN AWAL MUSIM HUJAN 2026 TERHADAP RATA-RATANYA	NORMAL CURAH HUJAN PERIODE MUSIM HUJAN (mm)
268	Kulon Progo bagian utara	Kalibawang, Samigaluh.	OKT II	OKT II	0	2001 - 2500
269	Sleman bagian utara dan tengah	Turi, Pakem, Cangkringan, Sleman, Ngaglik, sebagian Tempel.	OKT III	OKT III	0	1501 - 2000
270	Kulon Progo bagian timur, Sleman bagian barat daya, Bantul bagian barat laut	Nanggulan, Sentolo, Minggir, Moyudan, Sedayu, sebagian kecil Pajangan.	NOV I	OKT III	-1	1001 - 1500
271	Sleman bagian barat, selatan dan timur, Kota Yogyakarta, Bantul bagian utara dan timur laut, Gunungkidul bagian barat laut	Seyegan, Mlati, Godean, Gamping, Depok, Berbah, Kalasan, Ngemplak, Piyungan, Kota Yogyakarta, Sewon, Banguntapan, sebagian Pajangan, Pleret, Dlingo, sebagian Playen, sebagian Patuk.	NOV I	OKT III	-1	1501 - 2000
272	Gunungkidul bagian utara, dan timur laut, Sleman bagian timur laut	Prambanan, Gedangsari, Ngawen, Nglipar, Semin, Ponjong, sebagian Patuk, sebagian Karangmojo.	NOV I	OKT II	-2	1501 - 2000
273	Kulon Progo bagian barat dan selatan	Girimulyo, Kokap, Pengasih, Temon, Wates, Panjatan, Galur, sebagian Lendah, sebagian Sentolo.	OKT III	OKT III	0	1501 - 2000
274	Bantul bagian tengah, barat, timur, selatan, Kulon Progo bagian tenggara, Gunungkidul bagian barat daya	Bantul, Jetis, Imogiri, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Srandakan, Sanden, Kretek, sebagian Dlingo, sebagian Pleret, sebagian Lendah, Purwosari, Panggang, sebagian kecil Playen.	NOV I	OKT III	-1	1501 - 2000
275	Gunungkidul bagian tengah, timur, selatan, dan barat	Sebagian Playen, Wonosari, Semanu, Rongkop, Girisubo, Tepus, Tanjungsari, Saptosari, Paliyan, sebagian Karangmojo, sebagian kecil Ponjong.	OKT III	OKT III	0	2001 - 2500

Keterangan :

a. I,II,III : Menunjukkan dasarian pada bulan yang bersangkutan
b. (-) : Permulaan Musim Kemarau maju terhadap rata-ratanya
c. (0) : Permulaan Musim Kemarau sama dengan rata-ratanya
(+) : Permulaan Musim Kemarau mundur terhadap rata-ratanya

LAMPIRAN 2. TABEL PREDIKSI MUSIM KEMARAU TAHUN 2026

ZONA MUSIM DI D.I YOGYAKARTA


No. ZOM DIY	Wilayah/ Kabupaten	Wilayah/ Kapanewon	NORMAL AWAL MUSIM PERIODE MUSIM KEMARAU	PREDIKSI AWAL MUSIM KEMARAU 2026	PERBANDINGAN AWAL MUSIM KEMARAU 2026 TERHADAP RATA-RATANYA	PREDIKSI AKHIR MUSIM KEMARAU 2026	NORMAL CURAH HUJAN PERIODE MUSIM KEMARAU (mm)	PREDIKSI CURAH HUJAN PERIODE MUSIM KEMARAU 2026	PREDIKSI SIFAT HUJAN PERIODE MUSIM KEMARAU 2026	PREDIKSI PUNCAK MUSIM KEMARAU PERIODE MUSIM KEMARAU 2026	PREDIKSI PANJANG MUSIM PERIODE MUSIM KEMARAU 2026 (DASARIAN)
268	Kulon Progo bagian utara	Kalibawang, Samigaluh.	MEI II	MEI I	-1	OKT II	201 - 300	301 - 350	BN	AGT 2026	17
269	Sleman bagian utara dan tengah	Turi, Pakem, Cangkringan, Sleman, Ngaglik, sebagian Tempel.	APR III	MEI I	0	NOV I	201 - 300	351 - 350	BN	AGT 2026	19
270	Kulon Progo bagian timur, Sleman bagian barat daya, Bantul bagian barat laut	Nanggulan, Sentolo, Minggir, Moyudan, Sedayu, sebagian kecil Pajangan.	APR III	APR III	0	NOV I	301 - 400	250 - 300	BN	AGT 2026	20
271	Sleman bagian barat, selatan dan timur, Kota Yogyakarta, Bantul bagian utara dan timur laut, Gunungkidul bagian barat laut	Seyegan, Mlati, Godean, Gamping, Depok, Berbah, Kalasan, Ngemplak, Piyungan, Kota Yogyakarta, Sewon, Banguntapan, sebagian Pajangan, Pleret, Dlingo, sebagian Playen, sebagian Patuk.	APR III	MEI I	+1	NOV I	301 - 400	250 - 300	BN	AGT 2026	19
272	Gunungkidul bagian utara, dan timur laut, Sleman bagian timur laut	Prambanan, Gedangsari, Ngawen, Nglipar, Semin, Ponjong, sebagian Patuk, sebagian Karangmojo.	APR III	APR III	0	NOV I	301 - 400	301 - 350	BN	AGT 2026	20
273	Kulon Progo bagian barat dan selatan	Girimulyo, Kokap, Pengasih, Temon, Wates, Panjatan, Galur, sebagian Lendah, sebagian Sentolo.	APR III	APR III	0	NOV I	301 - 400	351 - 400	BN	AGT 2026	20
274	Bantul bagian tengah, barat, timur, selatan, Kulon Progo bagian tenggara, Gunungkidul bagian barat daya	Bantul, Jetis, Imogiri, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Srandakan, Sanden, Kretek, sebagian Dlingo, sebagian Pleret, sebagian Lendah, Purwosari, Panggang, sebagian kecil Playen	APR III	APR III	0	NOV I	301 - 400	301 - 350	BN	AGT 2026	20
275	Gunungkidul bagian tengah, timur, selatan, dan barat	Sebagian Playen, Wonosari, Semanu, Rongkop, Girisubo, Tepus, Tanjungsari, Saptosari, Paliyan, sebagian Karangmojo, sebagian kecil Ponjong	MEI I	APR III	-1	NOV I	301 - 400	351 - 400	BN	AGT 2026	20

Keterangan :

d. I, II, III : Menunjukkan dasarian pada bulan yang bersangkutan
e. (-) : Permulaan musim kemarau maju terhadap rata-ratanya
f. (0) : Permulaan musim kemarau sama dengan rata-ratanya
(+) : Permulaan musim kemarau mundur terhadap rata-ratanya


LAMPIRAN 3

PETA ANALISIS AWAL MUSIM HUJAN TAHUN 2025/2026
ZONA MUSIM DI D.I YOGYAKARTA



LAMPIRAN 4


PETA ANALISIS PERBANDINGAN AWAL MUSIM HUJAN TAHUN 2025/2026 TERHADAP NORMALNYA (1991-2020) ZONA MUSIM DI D.I YOGYAKARTA



LAMPIRAN 5

PETA PREDIKSI AWAL MUSIM KEMARAU TAHUN 2026


ZONA MUSIM DI D.I YOGYAKARTA



LAMPIRAN 6

PETA PERBANDINGAN PREDIKSI AWAL MUSIM KEMARAU TAHUN 2026


TERHADAP NORMALNYA (1991 – 2020) ZONA MUSIM DI D.I YOGYAKARTA



LAMPIRAN 7

PETA PREDIKSI SIFAT HUJAN PADA MUSIM KEMARAU TAHUN 2026


ZONA MUSIM DI D.I YOGYAKARTA



LAMPIRAN 8

PETA PREDIKSI PUNCAK MUSIM KEMARAU TAHUN 2026


ZONA MUSIM DI D.I YOGYAKARTA



LAMPIRAN 9


PETA PREDIKSI DURASI MUSIM KEMARAU TAHUN 2026

ZONA MUSIM DI D.I YOGYAKARTA



LAMPIRAN 10


PETA PREDIKSI CURAH HUJAN MUSIM KEMARAU TAHUN 2026
ZONA MUSIM DI D.I YOGYAKARTA



LAMPIRAN 11

PETA PREDIKSI AKHIR MUSIM KEMARAU TAHUN 2026


ZONA MUSIM DI D.I YOGYAKARTA



LAMPIRAN 12

PETA NORMAL AWAL MUSIM KEMARAU PERIODE TAHUN 1991 - 2020

ZONA MUSIM DI D.I YOGYAKARTA





BMKG

BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
STASIUN KLIMATOLOGI D.I YOGYAKARTA