



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



FICHA TÉCNICA

AMINO PLUS

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA COMERCIALIZADORA: BIOTACC AGRO S.A.C.
FOLIARES Y FERTILIZANTES ORGANICOS

FORMULACIÓN: AMINOÁCIDOS SOLUBLES

CONCENTRACIÓN: 40%

CLASE DE USO: BIOESTIMULANTE

COMPOSICIÓN:

Aminoácidos libres.....	40 %
Algas marinas.....	15 %
Fósforo.....	10 %
Potasio	10 %
Ácidos poli carboxílicos.....	10 %
Magnesio	8 %
Zinc	7%

CARACTERÍSTICAS

- Es bioestimulante y anti estresante vegetal.
- Aumenta el número de brotes y raíces.
- Favorece el cuajado y el crecimiento de los frutos.
- Desintoxica a las plantas de la constante aplicación de plaguicidas.

MOMENTO DE APLICACIÓN:

Se aconseja su utilización en todos los momentos en que el cultivo necesite un estímulo nutritivo y fisiológico, tales como:

- Inicio de la vegetación, en cuanto alcance suficiente masa foliar.
- Prefloración y caída de pétalos.
- Desarrollo de órganos vegetales a recolectar.
- se recomienda su aplicación cuando el cultivo se encuentra sometido a condiciones desfavorables (sequía, frío, salinidad, viento, asfixia radicular, etc.) y en tratamientos recuperadores después de los períodos críticos (trasplante, daños por heladas, granizo, viento, etc.)



BIOTACC AGRO S.A.C



FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS

cultivo	Dosis l/cil	Momento de aplicación
Arroz	0.5 -1	1° Punto de algodón 2° Punto de floración
Hortalizas (ají, pimiento, tomate, alcachofa, zapallo, sandia, melón)	0.5 -1	1° A los 7 días de trasplante 2° Al crecimiento de la planta. 3° 15 días después de la segunda aplicación.
Café	0.5 -1	1° inicio de brotación de la planta. 2 a 3 aplicaciones después de la primera aplicación. En la floración
Ajo y cebolla	0.5 -1	1° Aplicación a los 10cm de altura 2° y 3° aplicación a los 30 días después de la antigua aplicación.
Maíz	0.5 -1	1° En plantas de 4-8 hojas 2° 30 días después de la primera aplicación.
Banano y cacao	0.5 -1	2-3 aplicaciones distribuidas entre el trasplante y floración
Leguminosas (habas, frijol, arveja Holantao)	0.5 -1	1° 15 días después de la siembra 2 a 3 aplicaciones antes de la floración. 10 días después de la segunda aplicación.
Cítricos (limón, tangelo, naranja mandarina) Frutales (mango, vid, palto)	0.5 -1	1° antes de la floración. 2° con frutos de 2-3cm de diámetro. 3° y 4° aplicación después de 15 a 20 días.

RECOMENDACIONES DE USO

Consérvese en lugar o almacén frescos y en su envase original bien cerrado para evitar la oxidación del producto con el medio ambiente.

Mantener alejado de las personas, (especialmente de los niños), animales y de productos alimenticios y medicinales.

Lavar las manos y cara con abundante agua y jabón, después de cada aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los agroquímicos, reguladores de crecimiento y fertilizantes foliares de uso común. En caso de duda se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de aplicar a gran escala.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

Ligeramente Peligroso