



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



FICHA TÉCNICA

CALCIO-BORO-ZINC

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa Comercializadora: BIOTACC AGRO S.A.C.

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGANICOS

IDENTIDAD

Concentración: 18%

Formulación: Concentrado soluble

Clase de Uso: Corrector Nutricional

CARACTERÍSTICAS:

- Evita la caída de flores y frutos, estimula la producción y actividad de auxinas naturales que favorece el desarrollo de brotes, hojas y frutos.
- Activa el crecimiento vegetal y el boro la activa la producción.
- Nos asegura un buen proceso de polinización, fecundación, cuajado de flores y frutos.
- Evita la caída de prematura de estos órganos importantes en las plantas.

COMPOSICIÓN:

Calcio (CaO)	18%
Boro	10%
Zinc	10%
Algas Marinas	15 %
Nitrógeno	10%
Magnesio (MgO)	10%
Ácidos Fúlvicos	10%
Ácidos Carboxílicos	7 %
Aminoácidos	10%

CONDICIONES DE APLICACIÓN

FULL CALCIO debe ser usado en mezcla con todos los fungicidas, insecticidas y herbicidas; para mejorar una uniformidad en los cultivos.



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



MOMENTO DE APLICACIÓN:

CULTIVO	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Leguminosas (habas, frijol, arveja, holantao)	1 – 2	1 a 2 aplicaciones durante el llenado de vainas.
Cítricos (limón, naranja, mandarina, tangelo) Frutales (mango, vid, palto)	1 – 2	De 2 a 3 aplicaciones con intervalos de 15 a 20 días, desde que el fruto tenga la mitad de su tamaño comercial.
Arroz	1 – 2	Desde el embuchamiento, hasta la etapa de llenado de grano.
Hortalizas (ají, paprika, pimiento, piquillo, tomate, alcachofa, zapallo, sandía, melón)	1 – 2	Hacer de 2 a 3 aplicaciones durante el desarrollo del fruto.
café	1 – 2	De 2 a 3 aplicaciones luego del cuajado de los frutos, con intervalos entre 10 a 20 días.
Ajo y cebolla	1 – 2	Durante el bulbo repetir de 2 a 3 aplicaciones con intervalos de 10 días entre ellas.
Banano y cacao	1 - 2	De 2 a 3 aplicaciones luego del cuajado de los frutos, con intervalos entre 10 y 20 días.

PROPIEDADES FISIOQUÍMICAS

•**EXPLOSIVIDAD:** No Explosivo, no inflamable, no corrosivo

•**Estabilidad en almacenamiento:** Es estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento por 5 años.

RECOMENDACIONES DE USO

se recomienda aplicar tanto en pulverizaciones foliares a través del sistema del riego tecnificado. Es compatible con la mayoría de los productos sanitarios, nutrientes y Bioestimulante

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los agroquímicos, reguladores de crecimiento y fertilizantes foliares de uso común. En caso de duda se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de aplicar a gran escala.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA

Ligeramente tóxico.