



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



FICHA TECNICA

COPEO

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA FORMULADORA Y COMERCIALIZADORA: Biotacc Agro S.A.C

DENOMINACIÓN: INSECTICIDA, FUNGICIDA Y BACTERICIDA

CONCENTRACIÓN: SOLUCION LIQUIDA A BASE DE EXTRACTOS VEGETALES

FORMULACIÓN: CONCENTRADO SOLUBLE FOLIAR

CARACTERÍSTICAS:

- Bioinsumo de origen orgánico con acción insecticida, fungicida y bactericida.
- Diseñado para el manejo integral de plagas y enfermedades.
- Contribuye a corregir la clorosis férrica.
- Favorece el desarrollo saludable de las plantas.
- Obtenido mediante fermentación anaeróbica de materia orgánica enriquecida con extractos vegetales.
- Producto eficaz y de alta calidad para uso agrícola.

COMPOSICIÓN:

Componente	Porcentaje
Extracto de <i>Capsicum chinense</i>	25.0 %
Extracto de <i>Allium sativum</i>	10.0 %
Agentes estabilizantes y de conservación	5.0 %
Diluyente	60.0 %

RECOMENDACIONES DE USO

- No almacene ni transporte junto con alimentos y animales.
- Consérvese en lugar o almacén frescos y en su envase original bien cerrado para evitar la oxidación del producto con el medio ambiente.
- Mantener alejado de las personas, (especialmente de los niños), animales y de productos alimenticios y medicinales.
- Lavarse las manos y cara con abundante agua y jabón, después de cada aplicación.



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



MODO DE APLICACIÓN:

CULTIVO	DOSIS/HECTÁREA	MODO DE APLICACIÓN
CACAO	1.0 a 1.5 Lt	Realizar dos a tres aplicaciones durante el desarrollo del cultivo.
ARROZ	1.0 a 2.0 Lt	A los 15 a 25 días después del trasplante, y en punto de algodón.
CÍTRICOS	1.0 a 1.5 Lt	1. Aplicar en prefloración.2. Aplicar a la caída de los pétalos.3. Aplicar tres semanas después de la segunda aplicación.
MAÍZ	1.0 a 2.0 Lt	Aplicar entre los 30 a 45 cm de altura. Aplicar a la emisión de la panícula (pre floración).
HORTALIZAS	1.0 a 1.5 Lt	Aplicar cada 15 días durante el crecimiento y desarrollo del cultivo.
LEGUMINOSAS	1.0 a 1.5 Lt	Aplicar a la emisión del cotiledón de la plántula y repetir cada 20 días.
BANANO	1.0 a 2.0 Lt	Realizar dos a tres aplicaciones durante el desarrollo del cultivo.
PALMA ACEITERA	1.5 a 2.0 Lt	Aplicar durante todo el ciclo vegetativo y productivo.
PALTO	1.0 a 2.0 Lt	Aplicar de acuerdo con los estados del cultivo.
QUINUA	1.5 a 2.0 Lt	Aplicar durante la floración y fructificación del cultivo.
CAFÉ	1.5 a 2.0 Lt	Hacer dos a tres aplicaciones durante las etapas del cultivo.

ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO: Es estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento por 5 años.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los agroquímicos, reguladores de crecimiento y fertilizantes foliares de uso común.

FITOTOXICIDAD

No es Fito tóxico.