



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



FICHA TECNICA

BIOSILIX

DATOS DE LA EMPRESA:

EMPRESA FORMULADORA: Biotacc Agro S.A.C.

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGANICOS

FORMULACIÓN: CONCENTRADO SOLUBLE

FORMA SE USO: FOLIAR A BASE DE ÁCIDO SILICICO

CLASE DE USO: BIOESTIMULANTE

1. CARACTERÍSTICAS:

- Aumenta la “Resistencia mecánica” de las hojas, tallos y frutos a factores adversos a la producción como heladas, estrés, plagas y enfermedades.
- Previene y corrige las deficiencias de elementos nutricionales en los cultivos.
- Mayor asimilación de Calcio y Manganeseo.
- Alivia el estrés hídrico y salino; por deficiencia de Fósforo y Hierro.
- Mejorar la absorción de macro y micronutrientes por las plantas; acumulando carbohidratos en cultivos como arroz, caña, palma aceitera, pastos, tomate, algunas hortalizas, etc.
- Mayor resistencia a la degradación y lixiviación del suelo.

2. COMPOSICIÓN

Oxido de silicio (SiO ₂)	60 %
Potasio (K ₂ O)	5.0%
Aminoácidos	10 %
Algas marinas	10 %
Ácido carboxílico	10 %
Microelementos	5.0 %

3. MODO DE APLICACIÓN:

Se puede utilizar solo o en mezclas con otros fertilizantes comúnmente utilizados en los cultivos, para el acondicionamiento y enriquecimiento de los suelos. Aporta la mayoría de los elementos esenciales para el desarrollo óptimo de los cultivos. Se recomienda aplicar el producto en forma foliar mojando las plántulas desde la raíz hasta la copa del árbol y/o plántula.



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



CULTIVO	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Arroz	0.5 a 1.0 Lt/ha	Aplicar desde inicio de desarrollo vegetativo, repetir a los 20 días.
Maíz	0.5 a 1.0 Lt/ha	Aplicar desde inicio de desarrollo vegetativo, repetir a los 20 días.
Frutales en general (Manzano, Peral, Nogal, Cítricos, Arándano, Frutilla, Palto, Ciruelo, Almendro)	0.5 a 1.0 Lt/ha	Aplicar cada 20 días durante el período de desarrollo del vegetativo; Aplicar 3 veces cada 10 a 15 días en el tercio final del desarrollo del fruto.
Palma aceitera	1.0 a 2.0 Lt/ha	Aplicar desde inicio de desarrollo vegetativo y productivo de la planta.
Hortalizas	0.5 a 1.0 Lt/ha	Aplicar cada 15 días durante el desarrollo vegetativo.
Banano y cacao	0.5 a 1.0 Lt/ha	Hacer de 2 a 3 aplicaciones durante el desarrollo del fruto
Café	0.5 a 1.0 Lt/ha	Hacer de 2 a 3 aplicaciones durante el desarrollo del fruto.

4. PROPIEDADES FISIOQUIMICAS

• **EXPLOSIVIDAD:** No Explosivo, no inflamable, no corrosivo

• **Estabilidad en almacenamiento:** Es estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento por 5 años.

5. COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los agroquímicos, reguladores de crecimiento y fertilizantes foliares de uso común. En caso de duda se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de aplicar a gran escala.

6. FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico.

7. CATEGORIA TOXICOLÓGICA

Ligeramente tóxico