



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



FICHA TECNICA

BIOZINC

DATOS DE LA EMPRESA:

EMPRESA FORMULADORA Y COMERCIALIZADORA: Biotacc Agro S.A.C

DENOMINACIÓN: CORRECTOR NUTRICIONAL

CONCENTRACIÓN: SOLUCION LIQUIDA

FORMULACIÓN: NUTRIENTE FOLIAR

CARACTERÍSTICAS:

Es un fertilizante foliar nutricional líquido soluble, corrector de zinc y acomplejado con ácidos carboxílicos.

Previene y corrige la deficiencia de dicho elemento y es rápidamente absorbido por las hojas.

Tiene sobresaliente adherencia y redistribución luego de la lluvia.

Puede ser aplicado con cualquier equipo de aspersión, así sea mochila, pulverizador o atomizadora.

Puede aplicarse en combinación con pesticidas en general, mejorando la calidad de los caldos de aspersión en caso de que se usen aguas duras, debido a que contiene sustancias tampón.

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS:

Aspecto: Líquido

Solubilidad: > 97% soluble

Densidad: 1.1—1.25 g/cm³

Color: Marrón Oscuro

Olor: Afrutado

Ph:6

COMPOSICIÓN:

COMPONENTES	P/V
Zinc (ZnO)	30%
Nitrógeno (N)	3%
Aminoácidos	10%
Ácido Fúlvico	3.5%
Ácido Carboxílico	3.0%
Carbono Orgánico	15 %
Azufre (S)	0.5 %
Aditivos	35%

CAS FALA CRU CAMINO A FERREÑAFE POR LA FABRICA AZUCARERA S/N FERREÑAFE – LAMBAYEQUE
CAS SIMBILA CRU POR EL REC CAMPESTRE AQUAPARK S/N – FUNDO MUNDACA-CATACOS-PIURA
TELÉFONO: + 5 1 954013027



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



MODO DE APLICACIÓN:

CULTIVO	DOSIS/ CILINDRO	MODO DE APLICACIÓN
ARROZ	0.5 A 1.0	A los 15 a 25 días después del trasplante, y en punto de algodón.
MAIZ	0.5 A 1.0	1.- Aplicar a los 30cm a 45 cm de altura 2.- Aplicar a la emisión de la panícula (prefloración)
CITRICOS	0.5 A 1.0	1.- Aplicar en prefloración 2.- aplicar a la caída de los pétalos 3.- Aplicar tres semanas después de la segunda aplicación. 4.- Aplicar cuatro semanas as después de la tercera aplicación
HORTALIZAS	0.5 A 1.0	Aplicar cada 15 días durante el crecimiento y desarrollo del cultivo.
LEGUMINOSAS repetir cada	0.5 A 1.0	Aplicar a la emisión del cotiledón de la plántula y 20 días
BANANO	0.5 A 1.0	Realizar dos a tres aplicaciones durante el desarrollo del cultivo.
CACAO	0.5 A 1.0	Realizar dos a tres aplicaciones durante el desarrollo del cultivo
PALTO	0.5 A 1.0	Aplicar de acuerdo con los estadios del cultivo
QUINUA	0.5 A 1.0	Aplicar durante la floración y fructificación del cultivo.

CAS FALA CRU CAMINO A FERREÑAFE POR LA FABRICA AZUCARERA S/N FERREÑAFE – LAMBAYEQUE
CAS SIMBILA CRU POR EL REC CAMPESTRE AQUAPARK S/N – FUNDO MUNDACA-CATACOS-PIURA
TELEFONO: + 5 1 954013027



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



QUINUA	0.5 A 1.0	Aplicar durante la floración y fructificación del cultivo.
CAFÉ	0.5 A 1.0	Hacer dos a tres aplicaciones durante las etapas del cultivo.

ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO:

Es estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento por 5 años.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas y fungicidas de uso agrícolas.

FITOTOXICIDAD:

No es Fito tóxico.

CAS FALA CRU CAMINO A FERREÑAFE POR LA FABRICA AZUCARERA S/N FERREÑAFE – LAMBAYEQUE
CAS SIMBILA CRU POR EL REC CAMPESTRE AQUAPARK S/N – FUNDO MUNDACA-CATACOS-PIURA
TELEFONO: + 5 1 954013027