



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



FICHA TÉCNICA

CITOQ TACC

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA COMERCIALIZADORA: Biotacc Agro S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS

FORMULACIÓN: CONCENTRADO SOLUBLE

CLASE DE USO: BIO ESTIMULANTE

CARACTERÍSTICAS

- Es un fertilizante foliar que promueve la división celular en todo tejido nuevo (hojas y frutos) con la finalidad de incrementar el tamaño de las hojas y el calibre de los frutos.
- Es un regulador de crecimiento vegetal a base de Citoquininas naturales; aminoácidos, Fósforo y Potasio.
- Facilita la translocación de los fotosintatos producido en las hojas favoreciendo el llenado de los frutos dando una mayor uniformidad de calibre.
- Aumenta la resistencia a condiciones de estrés.
- Retarda el envejecimiento de los tejidos vegetales aumentando la vida productiva de los cultivos.
- Mejora la absorción y el uso del agua y de los nutrientes.
- Mantiene controlado los niveles de Etileno previniendo la caída de flores y frutos.
- Incrementa la producción de pigmentos de color (antocianinas) en los frutos, causando una coloración más temprana de los frutos a cosechar.

COMPOSICIÓN:

Citoquininas (2,200 ppm)	2.20 %
Auxina	0.04 %
Giberelina	0.02 %
Aminoácidos libres	15.0 %
Algas marinas	15 %
Ácido carboxílico	10 %
Fósforo (P205)	10%
Potasio (K20)	10 %
Inertes	37.74 %



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



MODO DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar tanto en pulverizaciones foliares como a través del sistema de riego tecnificado, es compatible con la mayoría de los productos sanitarios, nutrientes foliares y Bioestimulante.

cultivo	Dosis l/cil	Momento de aplicación
Arroz	0.3 a 0.5	A los 45 días del trasplante. Repetir 15 días después de la primera aplicación.
Maíz	0.3 a 0.5	Aplicar cuando la planta tenga de 30 a 45 cm de alto. Aplicar en la prefloración.
Cítricos	0.3 a 0.5	Aplicar en prefloración. En la caída de pétalos. 3 semanas después de la 2ª aplicación. Cuatro semanas después de la 3ª aplicación.
Ajíes	0.3 a 0.5	1ra. Al inicio de brotamiento de las ramas laterales. 2da. Al cuajado de frutos del segundo piso. 3ra. Al cuajado de frutos del tercer piso.
Hortalizas	0.3 a 0.5	Aplicar cada 15 días durante el desarrollo vegetativo.
Leguminosas (frijol, soya. Etc.)	0.3 a 0.5	A los 30 días después de la siembra. Repetir 10 días después.
Banano y cacao	0.3 a 0.5	Hacer de 2 a 3 aplicaciones durante el desarrollo del fruto
Café	0.3 a 0.5	Hacer de 2 a 3 aplicaciones durante el desarrollo del fruto.

Estabilidad en almacenamiento: Es estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento por 5 años.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los agroquímicos, reguladores de crecimiento y fertilizantes foliares de uso común. En caso de duda se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de aplicar a gran escala.

FITOTOXICIDAD

No es Fito tóxico.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA

Ligeramente tóxico