



# BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



## FICHA TÉCNICA

### FOSFORO 45%

#### DATOS DE LA EMPRESA

Empresa Comercializadora: BIOTACC AGRO S.A.C.

#### FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGANICOS

#### IDENTIDAD

Concentración: 45%

Formulación: Concentrado soluble

#### CARACTERÍSTICAS:

- Aporta y absorben rápidamente los aminoácidos, con su balance 10-45-10 (p/v) y la función específica del fósforo.
- Establece su floración y fructificación.
- Aumenta notoriamente los rendimientos y calidad de la cosecha.
- Incrementa los grados en frutales, disminuye los azúcares reductores en tuberosas y proporciona una madurez homogénea en frutas y cereales.

#### BENEFICIOS:

- Los nutrientes que aporta se transportan y absorben rápidamente por el efecto transfer de los aminoácidos, con su balance 10-45-10 (p/v) y la función específica del fósforo, suple requerimientos en las etapas de máxima exigencia energética de los cultivos, como establecimiento, floración y fructificación.
- La aplicación en estas etapas aumenta notoriamente los rendimientos y calidad de la cosecha, Incrementa los grados brix en frutales, disminuye los azúcares reductores en tuberosas y proporciona una madurez homogénea en frutas y cereales

#### COMPOSICIÓN:

|           |      |                            |      |
|-----------|------|----------------------------|------|
| NITROGENO | 5 %  | ALGAS MARINAS              | 10 % |
| FÓSFORO   | 45 % | AMINOÁCIDOS                | 10 % |
| POTASIO   | 5 %  | ÁCIDOS<br>POLICARBOXILICOS | 10 % |
| MAGNESIO  | 5 %  | SILICIO                    | 10 % |



# BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



## MOMENTO DE APLICACIÓN:

| CULTIVO        | DOSIS | EPOCA DE APLICACIÓN                                                                            |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARROZ          | 1 -2  | 15 días después del trasplante, en pleno macollamiento y en punto de algodón                   |
| MAÍZ           | 1 -2  | En los primeros estadios y después de la fertilización.                                        |
| LEGUMINOSAS    | 1 -2  | En los primeros estadios y antes de la floración                                               |
| CAÑA DE AZÚCAR | 1 -2  | Caña soca: después de la primera fertilización<br>Caña Planta: en los primeros estadios        |
| CAFÉ           | 1-2   | 1a., 2a. y 3a. Al trasplantar y cada 10-15 días Reiniciar cuando convenga adelantar el cultivo |
| BANANO Y CACAO | 1 -2  | 1a., 2a. y 3a. A los 10 días del trasplante y cada 15 días                                     |

•**Estabilidad en almacenamiento:** Es estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento por 5 años.

## RECOMENDACIONES DE USO

- No almacene ni transporte junto con alimentos y animales.
- Consérvese en lugar o almacén frescos y en su envase original bien cerrado para evitar la oxidación del producto con el medio ambiente.
- Mantener alejado de las personas, (especialmente de los niños), animales y de productos alimenticios y medicinales.
- Lavarse las manos y cara con abundante agua y jabón, después de cada aplicación

## COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los agroquímicos, reguladores de crecimiento y fertilizantes foliares de uso común. En caso de duda se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de aplicar a gran escala.

## FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico.

## CATEGORIA TOXICOLÓGICA

Ligeramente tóxico