



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



FICHA TÉCNICA

SPIGAL

DATOS DE LA EMPRESA:

EMPRESA COMERCIALIZADORA: Biotacc Agro S.A.C

FOLIARES Y FERTILIZANTES ORGÁNICOS

INGREDIENTE ACTIVO: FOLCISTEINA AL 2.5%

FORMULACIÓN: CONCENTRADO SOLUBLE

CLASE DE USO: BIO ESTIMULANTE

CARACTERÍSTICAS:

- Mejoran el metabolismo de las plantas.
- Estimulan la actividad fisiológica y reservas bioquímicas de las plantas.
- Incrementa la producción al producir grupos tiólicos, que aumentan la actividad metabólica y enzimática de las plantas, favoreciendo el desarrollo vegetativo y produciendo una mayor cosecha.
- Aumenta el nivel de prolina en el vegetal, lo que proporciona a su vez un aumento de la actividad metabólica.
- Favorece la formación del tubo polínico, la fecundación, el desarrollo y la multiplicación de la célula vegetal.

COMPOSICIÓN:

- Aminoácidos100 g/Lt
- Folcisteina2.5 g/Lt
- Vitamina B1...0.5 g/Lt
- Ácido fólico...2.0 g/Lt
- Algas Marinas..... 15.0 %
- Ácidos polis carboxílicos.....10.0 %
- Giberelinas...0.02 %

PROPIEDADES FISIOQUÍMICAS

- EXPLOSIVIDAD: No explosivo, no inflamable, no corrosivo
- Estabilidad en almacenamiento: Es estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento por 2 años.

MODO DE APLICACIÓN:

Este producto se aplica disuelto en agua por vía foliar o al suelo, los usos de este dependerán de las indicaciones de la etiqueta y el cultivo a aplicar. Se puede aplicar en mezcla con agroquímicos, evitando aquellos de reacción muy alcalina o ácida.

CULTIVOS	MOMENTOS DE APLICACIÓN	DOSIS /CL
ARROZ	INICIO DE MACOLLAMIENTO Y PUNTO DE ALGODÓN.	300 – 500 ml
Algodón	Al inicio de la siembra En plena floración	300-500ml
Cereales: trigo, avena, maíz, sorgo	Al crecimiento y desarrollo Al inicio de la floración	300-500ml
Flores y Ornamentales	Aplicar a los 3 días después del trasplante o al inicio del desarrollo vegetativo. Aplicar cada 15 días para mejorar el crecimiento y formación de flores.	300-500ml
Hortalizas: ajó, alcachofa, apio, berenjena, beterraga, brócoli, cebolla, col, coliflor, espinaca, lechuga, nabo, pepino, poro, rábano, rocoto, ají, tomate, zapallo, paprika, pimentón.	De 3 a 4 aplicaciones: Aplicar una semana después del trasplante. En pleno crecimiento de cultivo. Antes de la floración. Aplicación durante el llenado del fruto hasta la cosecha	300-500 ml
Leguminosas: arveja, frijol, garbanzo, habas, holantao, palla, vainita	De 3 a 5 aplicaciones cada 20 días a partir de que la planta tenga 4 o 6 hojas	300-500ml
Tubérculos y raíces: camote, oca, olluco, papa, yuca, y otros	Cuando las hojas tengan 4 o 6 hojas. Al inicio de la floración. En plena floración.	300-500 ml
Frutales siempre verdes: arándano, cacao, café, chirimoya, fresa, granadilla, guanábana, mango, maracucha, naranja, olivo, palto, papayo, pepino dulce, tangelo, plátano, toronja, etc.	De 3 a 5 aplicaciones: Aplicar una semana después del trasplante. En pleno crecimiento del cultivo. Antes de la floración. Aplicación durante el llenado de frutos hasta la cosecha.	1% 01 cc por uno de agua utilizada
Frutales caducifolios: Cereza, ciruelo, granado, higo, manzano, melocotón, pecana, peral, vid, etc.	Aplicar una semana después del trasplante. En pleno crecimiento del cultivo. Antes de la floración. 4 y 5. Aplicación durante el llenado de frutos hasta la cosecha	1 % 0 1 cc por litro de agua utilizada.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los agroquímicos, reguladores de crecimiento y fertilizantes foliares de uso común. En caso de duda se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de aplicar a gran escala.