



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



FICHA TECNICA

BIOCUB

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA FORMULADORA Y COMERCIALIZADORA: Biotacc Agro S.A.C

FOLIARES Y FERTILIZANTES

DENOMINACIÓN: FUNGICIDAD BACTERICIDAD

CONCENTRACIÓN: SULFATO DE COBRE PENTA HIDRATADO AL 25 %

FORMULACIÓN: CONCENTRADO SOLUBLE

CARACTERÍSTICAS:

- Es un inductor de defensas Fúngico - Bacteriano con acción Bio Estimulante.
- Incrementa el contenido de compuestos fenólicos y fitoalexinas en todos los cultivos que sirven de defensas naturales de la planta contra agentes patógenos y no genera resistencia.
- Es un producto sistémico, gracias a la presencia de los Ácidos Poli carboxílicos en la formulación que permiten una mayor y rápida absorción, así como una eficiente translocación y aprovechamiento por el cultivo.

COMPOSICIÓN:

Cobre (Cu)	
Sulfato de Cobre Pentahidratado.....	25 %
Extracto de Algas Marinas.....	4.0 %
Ácidos Orgánicos.....	12%
Ácidos Policarboxílicos.....	10%
Densidad.....	1.20 g/mL
Ph.....	2.0 a 3.0

RECOMENDACIONES DE USO

- No almacene ni transporte junto con alimentos y animales.
- Consérvese en lugar o almacén frescos y en su envase original bien cerrado para evitar la oxidación del producto con el medio ambiente.
- Mantener alejado de las personas, (especialmente de los niños), animales y de productos alimenticios y medicinales.
- Lavarse las manos y cara con abundante agua y jabón, después de cada aplicación.



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



MODO DE APLICACIÓN:

CULTIVO	DOSIS (L/200L)	MODO DE APLICACIÓN
Arroz	0.5 – 1.0	Iniciar las aplicaciones en almácigo y en macollamiento, repetir lo necesario cada 15 días.
Cítricos y Frutales	0.5 – 1.0	Aplicar al brotamiento de nuevos brotes y repetir la aplicación con intervalos de 15 días.
Cebolla	0.5 – 1.0	Aplicar a la formación de bulbo, repetir la aplicación cada 15 días.
Ajíes, Tomate, pimiento.	0.5 – 1.0	Aplicar al crecimiento y desarrollo con intervalos de 15 a 30 días.
Banano	0.5 – 1.0	Aplicar cuando se presentan los primeros síntomas de patógenos y repetir con intervalos de 15 días.
Cacao	0.5 – 1.0	Aplicar cuando se presentan los primeros síntomas de patógenos y repetir con intervalos de 15 días.
Algodón, Páprika, Piquillo, Papa, Tomate, Espárrago, Caña de azúcar, Café	0.5 – 1.0	Aplicar desde los 30 días después del trasplante y repetir cada 10 días 4 veces por semana
Maíz, Fresa, Fríjol, Holantao, Melón, Zapallo, Sandía, Alcachofa	0.5 – 1.0	Aplicar cuando se presentan los primeros síntomas de patógenos y repetir con intervalos de 15 días.

ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO: Es estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento por 2 años.

COMPATIBILIDAD

Es compatible por su Ph ácido, con la mayoría de los agroquímicos, reguladores de crecimiento y fertilizantes foliares de uso común. En caso de duda se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de aplicar a gran escala.

FITOTOXICIDAD

No es Fito tóxico.