



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



FICHA TÉCNICA

BIOFOSFITO K

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa Comercializadora: BIOTACC AGRO S.A.C.

FOLIARES Y FERTILIZANTES

IDENTIDAD

Concentración: 40%

Formulación: Concentrado soluble

CARACTERÍSTICAS:

- Ejerce una acción de protección y resistencia, contra agentes externos como, hongos, bacterias y plagas, por el hecho de hacer, aumentar las sustancias de defensas naturales de la planta llamada FITOALEXINAS.
- Ayuda al crecimiento, desarrollo, prefloración, llenado de frutos.
- Contiene al Anión Fosfito $(PO_3)^{-2}$, más el potasio como nutricional.
- Actúa de forma sistémica, transportándose por las haces vasculares, llegando a las raíces, brotes, yemas y frutos. Ejerce una acción de protección y resistencia, contra agentes externos como, hongos, bacterias y plagas.

COMPOSICIÓN:

Composición	%
Fósforo(P2O5)	40 %
Potasio (K2O)	20%
Aminoácidos	10 %
Ácidos fúlvicos	10 %
Ácido carboxílico	10 %
Carbono orgánico	10 %

MODO DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar tanto en pulverizaciones foliares como a través del sistema de riego tecnificado. Es compatible con la mayoría de los productos sanitarios, nutrientes foliares y Bioestimulante.



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



Cultivo	Dosis l/cil	Momento de aplicación
Arroz	1 – 2	Aplicar durante el crecimiento del fruto. Repetir cada 15 a 20 días.
Maíz	1 – 2	Aplicar desde inicio de desarrollo vegetativo, repetir a los 20 días.
Frutales en general (Manzano, Peral, Nogal, Cítricos, Arándano, Frutilla, Palto, Ciruelo, Almendra)	1 – 2	Aplicar cada 20 días durante el período de desarrollo del vegetativo; Aplicar 3 veces cada 10 a 15 días en el tercio final del desarrollo del fruto.
Papa; camote, yuca	1 – 2	Aplicar durante crecimiento vegetativo, hasta inicio de maduración de tubérculos.
Banano, café y cacao	1 – 2	Aplicar durante crecimiento de fruto. Repetir cada 15 días.
Tomate, ajíes en general	1 - 2	Aplicar durante el crecimiento del cultivo y repetir cada 7 a 10 días según su necesidad.

• **Estabilidad en almacenamiento:** Es estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento por 2 años.

RECOMENDACIONES DE USO

- No almacene ni transporte junto con alimentos y animales.
- Consérvese en lugar o almacén frescos y en su envase original bien cerrado para evitar la oxidación del producto con el medio ambiente.
- Mantener alejado de las personas, (especialmente de los niños), animales y de productos alimenticios y medicinales.
- Lavarse las manos y cara con abundante agua y jabón, después de cada aplicación

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los agroquímicos, reguladores de crecimiento y fertilizantes foliares de uso común. En caso de duda se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de aplicar a gran escala.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA

Ligeramente tóxico