



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



FICHA TÉCNICA

FULL PANTER

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa Comercializadora: BIOTACC AGRO S.A.C

FOLIARES Y FERTILIZANTES

IDENTIDAD

Concentración: 70%

Formulación: Concentrado soluble

CARACTERÍSTICAS:

Interviene en la formación de aminoácidos, vitaminas y enzimas muy importante para el metabolismo de las células vegetales.

Es eficaz contra hongos que causan enfermedades como la oidiosis, royas, cercosporas, etc.

COMPOSICIÓN:

- azufre(SO₃) 70%
- Ácidos Carboxílicos 10%
- nitrógeno 10%
- Fósforo 7%
- Ph 5.5%
- Cobre 3%

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Iniciar las aplicaciones al primer signo de infestación del hongo ó del ácaro para prevenir y controlar el ataque en el campo de cultivo.
- No aplicar en época de floración.
- No aplicar con temperaturas mayores a 30°C La frecuencia de aplicaciones puede variar en función a las condiciones climáticas y de la presencia de la enfermedad en el campo, pero una frecuencia adecuada puede ser entre 7 y 10 días entre aplicaciones.



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



CULTIVO	DOSIS		MOMENTO DE LA APLICACIÓN
	L/200L	L/ha	
Esparrago	1 -2 Lt	1.5-2.0	Al inicio del brotamiento, aplicar sólo o en mezcla con pesticidas.
Páprika, pimiento, ají, tomate	1 -2 Lt	1.5-2.0	Desde el desarrollo vegetativo hasta el inicio de floración.
Papa	1 -2 Lt	1.5-2.0	Desde el desarrollo vegetativo hasta inicio de floración.
Fresa	1 -2 Lt	1.5-2.0	Después de tres semanas del trasplante.
Alcachofa	1 -2 Lt	1.5-2.0	Desde los 30 días del trasplante.
Zapallo, melón, sandía	1 -2 Lt	1.5-2.0	Desde el inicio del desarrollo vegetativo, hasta el inicio de maduración del fruto.
vid	1 -2 Lt	1.5-2.0	Iniciar la aplicación desde el brotamiento hasta el inicio del envero.
Frejol, arveja, vainita	1 -2 Lt	1.5-2.0	Durante el desarrollo vegetativo hasta el llenado del grano.
Durazno, manzano, cítricos, palto	1 -2 Lt	1.5-2.0	Desde el brotamientyo hasta el desarrollo del fruto.
mango	1 -2 Lt	1.5-2.0	Desde el inicio del desarrollo vegetativo hasta el cuajado de frutos.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con fungicidas, insecticidas, acaricidas, de uso común en los cultivos, sim embargo, no se recomienda su mezcla con los nutrientes de aplicación foliar y aceites de uso agrícola. Tampoco es recomendable mezclar con productos de fuerte reacción alcalina.

Estabilidad en almacenamiento: Es estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento por 2 años.

RECOMENDACIONES DE USO

- ✓ Usar preferentemente en estados tempranos de los cultivos para corregir deficiencias.
- ✓ Tomar medidas de protección durante su uso y manejo.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA

Ligeramente tóxico

CAS FALA CRU CAMINO A FERREÑAFE POR LA FABRICA AZUCARERA S/N FERREÑAFE – LAMBAYEQUE
TELEFONO: 954013027- 074308987
CAS SIMBILA CRU POR EL RECREO CAMPESTRE AQUAPARK S/N – FUNDO MUNDACA CATACOS PIURA