



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



FICHA TÉCNICA

RUTACC MAX

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA FORMULADORA Y COMERCIALIZADORA: Biotacc Agro S.A.C

FOLIARES Y FERTILIZANTES

CONCENTRACIÓN: AUXINAS, CITOQUININAS, GIBERALINAS.

FORMULACIÓN: CONCENTRADO SOLUBLE

CARACTERÍSTICAS:

- Estimula su crecimiento, proporcionando a las plantas con mayor capacidad de abastecimiento a los nutrientes necesarios.
- Da como resultado un cultivo más vigoroso.
- Genera un buen desarrollo radicular, así mismo fomenta la producción de citoquininas naturales en la planta, lo que garantiza mayor producción.
- Es un complejo líquido promotor del desarrollo radicular a base de fitohormonas, aminoácidos y ácidos orgánicos, además de un alto contenido de fósforo cuya función es inducir la formación y multiplicación de raíces y estimular su crecimiento, proporcionando a las plantas una mayor capacidad de abastecerse a los nutrientes necesarios, dando como resultado un cultivo más vigoroso.
- Actúa directamente al entrar al contacto con la raíz, estimulando así la emisión de nuevos brotes en la zona radicular.

COMPOSICIÓN:

- Auxinas.....2,000 Ppm
- Citoquina.....600 Ppm
- Giberalinas.....500 Ppm
- Aminoácidos.....10.00%
- Algas Marinas..... 10.00 %
- Fósforo (P).....15.00%
- Elementos Relacionado...74.34%

RECOMENDACIONES DE USO

- No almacene ni transporte junto con alimentos y animales.
- Consérvese en lugar o almacén frescos y en su envase original bien cerrado para evitar la oxidación del producto con el medio ambiente.
- Mantener alejado de las personas, (especialmente de los niños), animales y de productos alimenticios y medicinales.

CAS FALA CRU CAMINO A FERREÑAFE POR LA FABRICA AZUCARERA S/N FERREÑAFE – LAMBAYEQUE

TELÉFONO: 954013027- 074308987

CAS SIMBILA CRU POR EL RECREO CAMPESTRE AQUAPARK S/N – FUNDO MUNDACA CATACOS PIURA



BIOTACC AGRO S.A.C

FERTILIZANTES Y FOLIARES ORGÁNICOS



- Lavarse las manos y cara con abundante agua y jabón, después de cada aplicación.

CULTIVO	DOSIS l/CIL	MOMENTO DE APLICACIÓN
Frutales: Cítricos, mango, aguacate, manzano, durazno, papayo, nogal, vid, plátano	0.5– 1.0	Aplicar al suelo en la línea de la copa del árbol, o bien en media luna para el caso del plátano, repetir cada 15 días.
Gramíneas: Arroz, maíz, trigo, cebada, sorgo. Leguminosas: Frijol, soya, garbanzo, haba, etc.	0.5– 1.0	Aplicar en el inicio del cultivo en el primer riego de auxilio o iniciado el temporal directamente sobre su suelo mojado. Repetir a los 21 días
Hortalizas: Tomates, ajíes, chiles, cebollas, pepinos, sandías, melones, calabacitas.	0.5– 1.0	Dirigir la aplicación a la base de la planta a los 5 - 8 días después del trasplante, repetir a los 15 días, puede continuarse hasta inicio y floración semanal o quincenal.
Caña de azúcar	0.5– 1.0	Aplicar al momento de la siembra asperjando directamente la semilla antes de tapar y/o después del primer riego al momento inmediato en que pueda accederse, dirigiendo el chorro a la base de la planta sin usar Boquillas.
papa	0.5– 1.0	Aplicar al momento de la siembra asperjando directamente la semilla antes de tapar y repetir cada semana hasta completar 4 aplicaciones. Deben ser durante los 30 días iniciales para generar la mayor cantidad de tubérculos y tener el tiempo para llenarlos perfectamente.

MODO DE APLICACIÓN:

ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO: Es estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento por 2 años.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los agroquímicos, reguladores de crecimiento y fertilizantes foliares de uso común. En caso de duda se recomienda realizar una prueba de compatibilidad antes de aplicar a gran escala.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico.

CATEGORIA TOXICOLÓGICA

Ligeramente tóxico.