



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(ШКОЛА)

Департамент математического и компьютерного моделирования

ОТЧЁТ

к лабораторной работе №3 по дисциплине

«Дифференциальные уравнения»

Направление подготовки

01.03.02 «Прикладная математика и информатика»

Выполнил студент гр.

Б9121-01.03.02сп(1)

Держапольский Ю.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

« 10 » мая 2023 г.

г. Владивосток

2023

Содержание

1	Введение	3
2	Задание 1	4
2.1	Постановка задачи	4
2.2	Решение	4
3	Задание 2	6
3.1	Постановка задачи	6
3.2	Решение	6
4	Задание 3	10
4.1	Постановка задачи	10
4.2	Решение	10
5	Заключение	11

1. Введение

В этой лабораторной работе мы будем решать дифференциальные уравнения, неразрешённые относительно производной, находить значение функции и строить её график с помощью производной, а также решать дифференциальные уравнения высших порядков, верстая решения в \LaTeX .

2. Задание 1

2.1. Постановка задачи

Для следующих дифференциальных уравнений указать вид, дать характеристику и найти общее решение с помощью программ компьютерной математики:

1. $(r - r') \ln r = r' (\varphi - \ln r')$;

2. $\tan \frac{r}{r'} = \ln r$;

3. $r = \frac{3}{2} \varphi r' + e^{r'}$;

4. $\dot{x}^2 - 2x\dot{x} = x^2 \cdot (e^{2t} - 1)$;

5. $\ln \theta = \ln r' + r'^2 - 1$;

2.2. Решение

1. $(r - r') \ln r = r' (\varphi - \ln r')$;

Вид уравнения: $F(\varphi, r, r') = 0$;

Характеристика уравнения: Полное неразрешенное относительно производной;

Общее решение: $r^C = Ce^\varphi$.

2. $\tan \frac{r}{r'} = \ln r$;

Вид уравнения: $F(r, r') = 0$;

Характеристика уравнения: Неразрешенное относительно производной, не содержащее аргумента;

Общее решение: $re^{\operatorname{arctg}(\ln r)} = Ce^\varphi \sqrt{\ln^2 r + 1}$.

$$3. \quad r = \frac{3}{2}\varphi r' + e^{r'};$$

Вид уравнения: $F(\varphi, r, r') = 0$;

Характеристика уравнения: Уравнение Лагранжа;

$$\text{Общее решение: } \begin{cases} r = \frac{3C - (4p^2 - 12p + 12) e^p}{2p^2}, \\ \varphi = \frac{C - (2p^2 - 4p + 4) e^p}{p^3}. \end{cases}$$

$$4. \quad \dot{x}^2 - 2x\dot{x} = x^2 \cdot (e^{2t} - 1);$$

Вид уравнения: $F(t, x, \dot{x}) = 0$;

Характеристика уравнения: Полное неразрешенное относительно производной;

Общее решение: $\ln x = t \pm e^t + C$.

$$5. \quad \ln \theta = \ln r' + r'^2 - 1;$$

Вид уравнения: $F(\theta, r') = 0$;

Характеристика уравнения: Неразрешенное относительно производной, не содержащее функции;

$$\text{Общее решение: } \begin{cases} \theta = p e^{p^2-1}, \\ r = \left(p^2 - \frac{1}{2}\right) e^{p^2-1} + C. \end{cases}$$

3. Задание 2

3.1. Постановка задачи

Разрешить следующие уравнения относительно производной и, используя метод Эйлера, найти значение функции в точке. Нарисовать график искомой функции. Реализацию решения проводить на языке «C++»:

1. $\sec^2(1 - y - x) = y'^2 - \tan xy + 2; \quad y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1, \quad y\left(\frac{\pi}{3}\right) = ?;$

2. $e^{x-y} = \cos(y' \sin x - \tan^2(\sec xy) - \tan y); \quad y\left(\frac{\pi}{3}\right) = \ln 7, \quad y(1) = ?.$

3.2. Решение

1. $\sec^2(1 - y - x) = y'^2 - \tan xy + 2; \quad y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1, \quad y\left(\frac{\pi}{3}\right) = ?;$

Разрешённое уравнение: $y' = \pm \sqrt{\sec^2(1 - y - x) + \tan xy - 2};$

Значение функции: $\begin{cases} 1.85955 \dots, \\ 0.737429 \dots \end{cases}$




Рис. 1: График решений уравнения (1)

Листинг 1: Код программы

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <vector>

double f(double x, double y) {
    return sqrt(std::pow(std::cos(1 - y - x), -2) + std::tan(x * y) - 2);
}

int main() {
    double x_0 = M_PI / 4,
           x_n = M_PI / 3,
           y_prev = 1;
    int n = 10000;
    double h = (x_n - x_0) / n;

    std::vector<double> x;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        x.push_back(x_0 + i * h);
    }

    std::vector<double> y1{y_prev};
    std::vector<double> y2{y_prev};

    for (int i = 0; i < n - 1; ++i) {
        y1.push_back(y1[i] + h * f(x[i], y1[i]));
        y2.push_back(y2[i] - h * f(x[i], y2[i]));
    }

    std::cout << y1.back() << ' ' << y2.back();
}
```

2. $e^{x-y} = \cos(y' \sin x - \tan^2(\sec xy) - \tan y); \quad y\left(\frac{\pi}{3}\right) = \ln 7, \quad y(1) = ?;$

Разрешённое уравнение: $y' = \frac{\arccos(e^{x-y}) + \tan^2(\sec xy) + \tan y}{\sin x};$

Значение функции: 1.97059...




Рис. 2: График решений уравнения (2)

Листинг 2: Код программы

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <vector>

double f(double x, double y) {
    return (std::acos(std::exp(x - y))
        + std::pow(std::tan(1 / std::cos(x * y)), 2)
        + std::tan(y)) / std::sin(x);
}

int main() {
    double x_0 = M_PI / 3,
           x_n = 1,
           y_prev = std::log(7);
    int n = 10000;
    double h = (x_n - x_0) / n;

    std::vector<double> x;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        x.push_back(x_0 + i * h);
    }

    std::vector<double> y{y_prev};

    for (int i = 0; i < n - 1; ++i) {
        y.push_back(y[i] + h * f(x[i], y[i]));
    }

    std::cout << y.back();
}
```

4. Задание 3

4.1. Постановка задачи

Для следующих дифференциальных уравнений определить тип, дать характеристику и найти общее решение с помощью программ компьютерной математики:

1. $y'' \cdot \cos y = y'^2 \cdot \cot y;$

2. $u^2 + 4tu\dot{u} + t^2\dot{u}^2 + t^2u\ddot{u} = 2tu(u + t\dot{u}) \cdot \tan t; [z = \tan t];$

3. $\frac{\ddot{x}}{\dot{x}^2 + 1} = \dot{x}.$

4.2. Решение

1. $y'' \cdot \cos y = y'^2 \cdot \cot y;$

Тип уравнения: Уравнение, допускающее понижение порядка;

Характеристика уравнения: Не содержащее переменную;

Общее решение: $y = C_2 - \ln(x + C_1).$

2. $u^2 + 4tu\dot{u} + t^2\dot{u}^2 + t^2u\ddot{u} = 2tu(u + t\dot{u}) \cdot \tan t; [z = \tan t];$

Тип уравнения: Однородное уравнение;

Характеристика уравнения: Однородное по степеням u ;

Общее решение: $t^2u^2 \cos t = C_2 \cos(C_1 + t).$

3. $\frac{\ddot{x}}{\dot{x}^2 + 1} = \dot{x};$

Тип уравнения: Уравнение, допускающее понижение порядка;

Характеристика уравнения: Не содержащее переменную и функцию;

Общее решение: $\sin(x + C_1) = C_2 e^t.$

5. Заключение

В этой лабораторной работе мы решили дифференциальные уравнения, неразрешённые относительно производной, нашли значения функций и построили её график с помощью производной, а также решили дифференциальные уравнения высших порядков, верстая решения в \LaTeX .