

p.41

M 上の測地線 $C: t \rightarrow \gamma(t) \in M$ の接ベクトルを T とすると (3.3.2)

$$T^a \nabla_a T^b = \alpha T^b \quad (1)$$

α は C 上で定義された関数 $\alpha(t)$

C の接ベクトルの定義は、 M 上の任意関数 f に対し

$$T(f) = \frac{d}{dt} f(\gamma(t)).$$

曲線 C の媒介変数を $t = \phi(s)$ と変換し、対応する接ベクトルを \tilde{T} とすると

$$\tilde{T}(f) = \frac{d}{ds} f(\gamma(t(s))) = \frac{dt}{ds} T(f) = \frac{1}{\beta} T(f), \quad \beta(t) = \left(\frac{dt}{ds} \right)^{-1} = \frac{1}{\phi'(s)}$$

(1) に $T = \beta \tilde{T}$ を代入すると

$$\begin{aligned} \tilde{T}^a \nabla_a (\beta \tilde{T}^b) &= \alpha \tilde{T}^b \\ \text{l.h.s} &= (\tilde{T}^a \nabla_a \beta) \tilde{T}^b + \beta \tilde{T}^a \nabla_a \tilde{T}^b \\ &= \tilde{T}(\beta) \tilde{T}^b + \beta \tilde{T}^a \nabla_a \tilde{T}^b \\ \therefore \tilde{T}^a \nabla_a \tilde{T}^b &= \frac{1}{\beta} (\alpha - \tilde{T}(\beta)) \tilde{T}^b \end{aligned}$$

ここで

$$\alpha - \tilde{T}(\beta) = \alpha(t) - \frac{d}{ds} (\phi'(s))^{-1} = \alpha(\phi(s)) + \frac{\phi''(s)}{\phi'(s)^2}$$

したがって $\phi(s)$ を次の微分方程式

$$\phi''(s) + \alpha(\phi(s)) \phi'(s)^2 = 0$$

の解に選べば

$$\tilde{T}^a \nabla_a \tilde{T}^b = 0$$

とできる。即ち適当な媒介変数表示を選べば測地線方程式を

$$T^a \nabla_a T^b = 0$$

として構わない。この形を保つ媒介変数のとり方の自由度は ($\phi''(s) = 0$ より)

$$t = a s + b, \quad a, b \text{ 定数}$$

に制限される。