

単位球面から平面への立体射影

単位球面 S から平面 H への立体射影は次式で与えられる。

$$\vec{n} = (x, y, z) \in S, (|\vec{n}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 1) \implies (\xi, \eta) = \left(\frac{x}{1-z}, \frac{y}{1-z} \right)$$

球面上の微小円の像

球面 S 上の微小円の平面 H 上での像を考えよう。

平面 H 上であって \vec{n} と垂直な単位ベクトルを \vec{t} 、 \vec{n} と Z 軸を含む平面上であって、 \vec{n} に垂直な単位ベクトルを \vec{s} とすると

$$\begin{aligned} \vec{t} &= \frac{\vec{i}_z \times \vec{n}}{|\vec{i}_z \times \vec{n}|} = \left(\frac{-y}{w}, \frac{x}{w}, 0 \right), \quad w = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{1 - z^2} \\ \vec{s} &= \frac{\vec{t} \times \vec{n}}{|\vec{t} \times \vec{n}|} = \left(\frac{xz}{w}, \frac{yz}{w}, \frac{-x^2 - y^2}{w} \right) = \left(\frac{xz}{w}, \frac{yz}{w}, -w \right), \quad (|\vec{t} \times \vec{n}| = 1 \text{ に注意}) \end{aligned}$$

\vec{n} を中心とする微小円は、 ε を微小量として

$$\vec{n} + \varepsilon(\vec{s} \cos \phi + \vec{t} \sin \phi) = \vec{n} + \varepsilon/w \begin{pmatrix} zx \cos \phi - y \sin \phi \\ zy \cos \phi + x \sin \phi \\ -w^2 \cos \phi \end{pmatrix}, \quad 0 \leq \phi < 2\pi$$

と表せる。立体射影による像は

$$\vec{n} + \Delta \vec{n} \implies (\xi + \Delta \xi, \eta + \Delta \eta)$$

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \Delta \xi \\ \Delta \eta \end{pmatrix} &\Rightarrow \frac{1}{1-z} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} + \frac{\Delta z}{(1-z)^2} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &= \frac{\varepsilon}{1-z} \left\{ \frac{1}{w} \begin{pmatrix} zx \cos \phi - y \sin \phi \\ zy \cos \phi + x \sin \phi \end{pmatrix} + \frac{-w \cos \phi}{1-z} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\} \\ &= \frac{\varepsilon}{(1-z)w} \begin{pmatrix} -x \cos \phi - y \sin \phi \\ -y \cos \phi + x \sin \phi \end{pmatrix}, \quad \frac{z(1-z) - w^2}{w(1-z)} = -1/w \text{ に注意} \\ &= \frac{\varepsilon}{1-z} \{ -\vec{e}_1 \cos \phi + \vec{e}_2 \sin \phi \}, \quad \vec{e}_1 = \frac{1}{w} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_2 = \frac{1}{w} \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_1 \perp \vec{e}_2, \quad |\vec{e}_1| = |\vec{e}_2| = 1 \end{aligned}$$

これより、球面上 S の半径 ε の微小円は、半径 $\varepsilon/(1-z)$ の微小円に写されることが分かる。


微小円が微小円に写されることから、球面上の一般の円も円に写されることが類推される。次にこれを直接示すことにしよう。

球面上の円の像

単位球面上の円の表現を考えよう。一般に、動径ベクトル \vec{r} を単位ベクトル \vec{n} 方向に右ネジ回りに角度 ϕ だけ回転させた結果 \vec{r}_ϕ は次式で与えられる。

$$\begin{aligned} \vec{r} &\Rightarrow \vec{r}_\phi \\ &= (\vec{r} \cdot \vec{n})\vec{n} + \{ \vec{r} - (\vec{r} \cdot \vec{n})\vec{n} \} \cos \phi + (\vec{n} \times \vec{r}) \sin \phi \end{aligned} \quad (1)$$

\vec{r} として単位ベクトルを選べば、その終点は球面上の円を描く。 \vec{r}, \vec{n} を ZX 平面上に選んでも一般性を失わないので、



$$\vec{n} = \begin{pmatrix} \sin \theta \\ 0 \\ \cos \theta \end{pmatrix}, \quad \vec{r} = \begin{pmatrix} \sin(\theta + \alpha) \\ 0 \\ \cos(\theta + \alpha) \end{pmatrix}$$

と選ぶことにする。

$$\begin{aligned}
\vec{r} \cdot \vec{n} &= \cos \alpha \\
\vec{n} \times \vec{r} &= (0, \cos \theta \sin(\theta + \alpha) - \sin \theta \cos(\theta + \alpha), 0)^t \\
&= (0, \sin \alpha, 0)^t \\
\vec{r} - (\vec{r} \cdot \vec{n})\vec{n} &= \begin{pmatrix} \sin(\theta + \alpha) \\ 0 \\ \cos(\theta + \alpha) \end{pmatrix} - \cos \alpha \begin{pmatrix} \sin \theta \\ 0 \\ \cos \theta \end{pmatrix} = \sin \alpha \begin{pmatrix} \cos \theta \\ 0 \\ -\sin \theta \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

に注意すると、(1)式に従って

$$\begin{aligned}
\vec{r}_\phi &= \cos \alpha \begin{pmatrix} \sin \theta \\ 0 \\ \cos \theta \end{pmatrix} + \cos \phi \sin \alpha \begin{pmatrix} \cos \theta \\ 0 \\ -\sin \theta \end{pmatrix} + \sin \phi \begin{pmatrix} 0 \\ \sin \alpha \\ 0 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \cos \alpha \sin \theta + \cos \phi \sin \alpha \cos \theta \\ \sin \phi \sin \alpha \\ \cos \alpha \cos \theta - \cos \phi \sin \alpha \sin \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_1 c_2 + c_1 s_2 \cos \phi \\ s_2 \sin \phi \\ c_1 c_2 - s_1 s_2 \cos \phi \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

θ, α は固定して考えているので、

$$\begin{cases} \cos \theta = c_1 \\ \sin \theta = s_1 \end{cases}, \quad \begin{cases} \cos \alpha = c_2 \\ \sin \alpha = s_2 \end{cases}, \quad \begin{cases} \cos(\theta + \alpha) = c_+ \\ \sin(\theta + \alpha) = s_+ \end{cases}, \quad \begin{cases} \cos(\theta - \alpha) = c_- \\ \sin(\theta - \alpha) = s_- \end{cases}.$$

は定数である。立体射影により \vec{r}_ϕ は

$$\begin{aligned}
\vec{r}_\phi &\Rightarrow (\xi_\phi, \eta_\phi) \\
&= \frac{1}{1 - c_1 c_2 + s_1 s_2 \cos \phi} (s_1 c_2 + c_1 s_2 \cos \phi, s_2 \sin \phi)
\end{aligned}$$

と写される。 (ξ_ϕ, η_ϕ) が円のパラメータ表示を与えていることを示そう。

$\phi = 0, \pi$ での ξ の値は

$$\xi_0 = \frac{s_1 c_2 + c_1 s_2}{1 - c_1 c_2 + s_1 s_2} = \frac{s_+}{1 - c_+}, \quad \xi_\pi = \frac{s_1 c_2 - c_1 s_2}{1 - c_1 c_2 - s_1 s_2} = \frac{s_-}{1 - c_-}.$$

となり、さらに

$$\begin{aligned}
a &\stackrel{\text{def}}{=} \frac{\xi_0 + \xi_\pi}{2} = \frac{s_+ + s_- - s_+ c_- - c_+ s_-}{(1 - c_+)(1 - c_-)} \\
&= \frac{2 s_1}{c_2 - c_1} \\
\rho &\stackrel{\text{def}}{=} \frac{\xi_\pi - \xi_0}{2} = \frac{s_- - s_+ + s_+ c_- - c_+ s_-}{(1 - c_+)(1 - c_-)} \\
&= \frac{2 s_2}{c_2 - c_1}
\end{aligned}$$

と計算できる。分子、分母の計算は以下の通り。

$$\begin{aligned}
s_- - s_+ + s_+ c_- - c_+ s_- &= -2c_1 s_2 + \sin(2\alpha) = -2c_1 s_2 + 2s_2 c_2 \\
&= 2s_2 (c_2 - c_1) \\
s_+ + s_- - s_+ c_- - c_+ s_- &= 2s_1 c_2 - \sin(2\theta) = 2s_1 c_2 - 2s_1 c_1 \\
&= 2s_1 (c_2 - c_1) \\
(1 - c_+)(1 - c_-) &= 1 - c_+ - c_- + c_+ c_- \\
&= 1 - 2c_1 c_2 + (c_1^2 c_2^2 - s_1^2 s_2^2) \\
&= 1 - 2c_1 c_2 + c_1^2 c_2^2 - (1 - c_1^2)(1 - c_2^2) \\
&= c_1^2 + c_2^2 - 2c_1 c_2 \\
&= (c_1 - c_2)^2
\end{aligned}$$

さて、以上より

$$(\xi_\phi - a)^2 + \eta_\phi^2 = \rho^2$$

を示せばよい。

gnuplotのコード “sp1.plot”

```
set parametric
set size square
d2r=pi/180.0
c1=cos(30.0*d2r)
s1=sin(30.0*d2r)
den(a,t,n)=1-c1*cos(n*a)+s1*sin(n*a)*cos(t)
xn(a,t,n)=s1*cos(n*a)+c1*sin(n*a)*cos(t)
yn(a,t,n)=sin(n*a)*sin(t)
w=5.0*d2r
x1(t)=xn(w,t,1)/den(w,t,1)
y1(t)=yn(w,t,1)/den(w,t,1)
x2(t)=xn(w,t,2)/den(w,t,2)
y2(t)=yn(w,t,2)/den(w,t,2)
x3(t)=xn(w,t,3)/den(w,t,3)
y3(t)=yn(w,t,3)/den(w,t,3)
set xrange [2.0:8.0]
set yrange [-3.0:3.0]
plot [0:2*pi] x1(t), y1(t), x2(t), y2(t), x3(t), y3(t)
```

This is a TeXmacs interface for GnuPlot.

GnuPlot] `load "/home/dhoshu/study/phys/memo/gravity/tm/sp1.plot"`

