

ΣΙΤΗΣΗ ΒΡΕΦΟΥΣ

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής η εισαγωγή στερεών τροφών σε βρέφος θα πρέπει να ξεκινάει γύρω στους 6 μήνες ζωής. Μέχρι την ηλικία αυτή, οι ανάγκες του οργανισμού μπορεί να εξυπηρετηθούν από το μητρικό γάλα ή τη φόρμουλα, με την εξαίρεση της βιταμίνης D και ίσως του σιδήρου.

Αντίστοιχα, η ομοφωνία από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Θρέψης προτείνει πως η συμπληρωματική σίτιση (για παράδειγμα στερεές τροφές και άλλα υγρά εκτός γάλατος) πρέπει να γίνεται σίγουρα μετά την 17η και πριν την 26η εβδομάδα ζωής. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου πάνω από το 90% των απαιτήσεων σε σίδηρο ενός βρέφους καλό είναι να δίνεται μέσα από στερεές τροφές που να παρέχουν επαρκή βιοδιαθέσιμο σίδηρο.

Το γάλα αγελάδος είναι φτωχή πηγή σιδήρου και για το λόγο αυτό ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται πριν τους 12 μήνες (μικρές ποσότητες μπορεί να εμπλουτίσουν γεύματα). Σχετικά με την γλουτένη, είναι συνετό να αποφεύγετε τόσο η πρώιμη (προ των 4 μηνών) όσο και η καθυστερημένη (μετά των 7 μηνών) εισαγωγή της, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος κοιλιοκάκης, σακχαρώδη διαβήτη τύπου I και αλλεργίας στα σιτηρά.

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας συστήνει την εισαγωγή των πιθανών αλλεργιογόνων τροφών μετά τον 4ο μήνα ακόμα και στα παιδιά με ιστορικό ατοπικών παθήσεων, καθώς δεν υπάρχουν προς το παρόν δεδομένα που να υποδεικνύουν πως η καθυστερημένη εισαγωγή τροφών όπως το αυγό ή το ψάρι, μειώνει την πιθανότητα αλλεργίας. Επιπλέον η καθυστερημένη έναρξη των στερεών τροφών δεν φαίνεται να προστατεύει το παιδί από την εμφάνιση ατοπικής δερματίτιδας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αρχικά πρέπει να συνηθίσει το παιδί στην ιδέα της σίτισης με στερεές τροφές. Η καθιστή θέση, το κουτάλι, καθώς και η υφή των τροφών απαιτεί χρόνο, προκειμένου να εξοικειωθεί. Για το λόγο αυτό καλό είναι οι αλλαγές να περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες. Το γεύμα θα πρέπει να γίνεται σε μια σχετικά σταθερή ώρα και αρχικά από το ίδιο άτομο. Το περιβάλλον πρέπει να είναι ευχάριστο και άνετο.

Επομένως το άτομο που θα αναλάβει τη σίτιση πρέπει να έχει χρόνο, καλή διάθεση και υπομονή. Αν υπάρχει πίεση, άγχος και βιασύνη η διαδικασία θα είναι δυσάρεστη τόσο για το γονιό όσο και για το παιδί. Η διάρκεια επίσης του γεύματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 λεπτά, αυτό το διάστημα όμως το παιδί θα πρέπει να ασχολείται αποκλειστικά με το φαγητό. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα βρέφη στην ηλικία αυτή παίρνουν το μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας και των θρεπτικών συστατικών από το γάλα.

Δίνοντας στο παιδί μια ποικιλία τροφών, μαζί με μητρικό γάλα ή φόρμουλα, από τον 6ο μήνα θα εγκαταστήσετε μια συνήθεια υγιεινής σίτισης σε βάθος χρόνου. Σταδιακά θα μπορέσετε να αυξήσετε την ποσότητα και την ποικιλία των τροφών που χρησιμοποιείται έως ότου το παιδί τρώει το ίδιο φαγητό με την υπόλοιπη οικογένεια, σε μικρότερες ποσότητες φυσικά. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά το δυνατόν φρέσκα υλικά εποχής, από διάφορες κατηγορίες τροφών, με την προσθήκη ελαιόλαδου (ωμό) και χωρίς την χρήση μπαχαρικών, βοτάνων ή μυρωδικών.

Αν όμως η εισαγωγή γίνει πρώιμα (πριν τον 4ο μήνα) θα μπορούσε να βλάψει το βρέφος, καθώς δεν έχει ακόμα τη δυνατότητα να λάβει την απαραίτητη ποσότητα θερμίδων και θρεπτικών συστατικών (ελλιπής συνεργασία ή και μειωμένη ικανότητα ασφαλούς κατάποσης στερεών τροφών). Επιπλέον τα βρέφη έχουν ένα αντανάκλαστικό (εξώθησης) με το οποίο σηκώνουν τη γλώσσα και σπρώχνουν το αντικείμενο που τοποθετείται ανάμεσα στα χείλη τους. Συνήθως το αντανάκλαστικό εξαφανίζεται τον 4ο-5ο μήνα ζωής. Όσο υπάρχει, η διαδικασία της σίτισης γίνεται πολύ δύσκολη.

Επιπλέον μεταξύ 4 και 6 μηνών τα βρέφη διπλασιάζουν το βάρος τους. Όταν πλησιάζουν τα 6 κιλά πιθανόν να χρειαστούν εμπλουτισμό της διαίτας τους με στερεές τροφές προκειμένου να αναπτυχθούν περαιτέρω. Η καθυστέρηση της εισαγωγής στερεών (μετά τον 6ο μήνα) μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη ανάπτυξη καθώς μπορεί το παιδί να μην λαμβάνει τις απαραίτητες θερμίδες από το μητρικό γάλα ή το τροποποιημένο γάλα αγελάδος, ενώ είναι πιθανό να αυξήσει την πιθανότητα άρνησης μάσησης.

Προκειμένου το βρέφος να ξεκινήσει τις στερεές τροφές θα πρέπει να εμφανίζει αντίστοιχη ψυχοκινητική εξέλιξη. Απαραίτητες ενδείξεις είναι :

- να μπορούν να μείνουν σε καθιστή θέση και να κρατούν σταθερό το κεφαλάκι τους
- Τα μάτια, τα χέρια τους και το στόμα τους θα πρέπει να συνεργάζονται ώστε να μπορούν να δουν την τροφή, να την πάρουν και να τη βάλουν στο στόμα μόνα τους
- Να μπορούν να καταπιούν το φαγητό και όχι να το φτύνουν

Αξίζει να σημειωθεί πως καθώς τα βρέφη μεγαλώνουν είναι ικανά (αρχικά από τον 6ο μήνα περίπου, με μεγαλύτερη επιτυχία όμως από τον 8ο) να μετακινούν το φαγητό, να το μασούν και να το καταπίνουν. Μέχρι να κλείσουν τον πρώτο χρόνο η βελτιωμένη κινητικότητα τους επιτρέπει να κρατήσουν τροφή μεταξύ δύο δακτύλων.

Σταδιακά θα καταστούν ικανά να επεξεργαστούν και διάφορες υφές στερεών τροφών. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε πως σημάδια όπως το μάσημα της γροθιάς, η νυχτερινή αφύπνιση, και η αύξηση της συχνότητας των γευμάτων δεν αποτελούν απαραίτητα ένδειξη ωρίμανσης για την εισαγωγή των στερεών.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

Το μωρό χρειάζεται μια μικρή ποσότητα τροφής πριν από το γάλα του. Μην ανησυχείτε λοιπόν για το πόσο θα φάει. Το σημαντικό είναι να συνηθίσουν σε νέες γεύσεις και υφές καθώς και να μάθουν να μετακινούν τις στερεές τροφές στο στόμα τους και πως να τις καταπίνουν. Εξακολουθούν να παίρνουν το μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας αλλά και τα θρεπτικά συστατικά από το γάλα. ΔΕΝ προσθέτουμε ζάχαρη, αλάτι και μυρωδικά στο φαγητό τους. Η νεφρική τους λειτουργία μπορεί να επηρεαστεί από την κατανάλωση αλατος ενώ η ζάχαρη μπορεί να προκαλέσει τερηδόνα.

ΠΩΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ

- Η όλη διαδικασία γίνεται πιο εύκολα αποδεκτή σε κάποια μωρά ενώ κάποια άλλα θα δυσκολευτούν περισσότερο. Συνεχίστε να προσπαθείτε και φροντίστε να ενθαρρύνετε και να επιβραβεύετε το παιδί σας.
- Να προσφέρετε αρκετό χρόνο (όχι όμως υπερβολικό) στην διαδικασία ειδικά στην αρχή. Ένα γεύμα με στερεές τροφές δεν θα πρέπει να υπερβαίνει κατά πολύ το αντίστοιχο γεύμα με γάλα. Συνήθως μετά τα 20 λεπτά το παιδί κουράζεται και οι αντιδράσεις του γίνονται πιο έντονες.
- Ακολουθήστε το ρυθμό του παιδιού και ενθαρρύνετε το να σας δίνει σημάδια πως πεινάει και άλλο ή πως χόρτασε. Στην τελευταία περίπτωση σταματήστε το γεύμα. Τέτοια σημάδια συνήθως είναι το ερμητικά κλειστό στόμα και η αποστροφή της κεφαλής. ΔΕΝ πιέζουμε το παιδί. Αν δεν δείχνει ενδιαφέρον ξαναπροσπαθήστε την επόμενη φορά.
- Να έχετε υπομονή και να δίνετε συνέχεια μια ποικιλία τροφών ακόμα και κάποιες που φαίνεται πως δεν τους αρέσουν. Μπορεί να χρειαστεί 10 ή και περισσότερες φορές προτού το βρέφος συνηθίσει νέες τροφές, γεύσεις ή υφές. Κάποιες ημέρες η σίτιση θα είναι καλύτερη και κάποιες όχι ενώ θα υπάρξουν και περιπτώσεις που θα απορρίπτει τα πάντα. Αυτές οι αντιδράσεις είναι απόλυτα φυσιολογικές και δεν χρειάζεται ανησυχία.
- Να δίνετε στο παιδί σας τη δυνατότητα να εξερευνά το φαγητό, ακουμπώντας το, πιάνοντάς το, πιέζοντάς το, ακόμα και πετώντας το. Όταν δείξουν τέτοιο ενδιαφέρον επιτρέψτε τους να χρησιμοποιήσουν τα δάχτυλά τους. Ακόμα και αν επιθυμούν να κρατήσουν το κουτάλι μπορείτε να τους δώσετε ένα δεύτερο προκειμένου να προσπαθήσουν να φάνε μόνα τους.
- Κατά τη διάρκεια του γεύματος προσπαθήστε να απομακρύνετε πράγματα που μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή του όπως τηλεόραση και κινητό τηλέφωνο.
- Δείξτε του πως πρέπει να τρώει. Τα βρέφη έχουν την τάση να αντιγράφουν τους γονείς του και τα άλλα παιδάκια. Για το λόγο αυτό είναι πιο πιθανό να τρώνε καλύτερα σε παιδικούς σταθμούς ή παιδικές γιορτές. Προσπαθήστε να οργανώσετε οικογενειακά γεύματα όσο πιο συχνά μπορείτε.
- Ο χρόνος που θα διαθέσετε για το γεύμα του παιδιού σας πρέπει να είναι αποκλειστικά για αυτό. Αν ταυτόχρονα κάνετε και άλλα πράγματα ή αν υπάρχει χρονική πίεση είναι δεδομένο πως το παιδί θα έχει άσχημη αντίδραση.
- Προσπαθήστε ειδικά στην αρχή να μην κάνετε πολλές αλλαγές. Εφαρμόστε μια ρουτίνα με περίπου σταθερή ώρα γεύματος, στην ίδια θέση και αν είναι δυνατόν να προσφέρει το φαγητό το ίδιο άτομο.
- Μπορείτε να έχετε το παιδί σας να παρακολουθεί την διαδικασία ετοιμασίας του γεύματος, αρκεί να βρίσκετε ΠΑΝΤΑ σε ασφαλές σημείο (ιδανικά στο καρεκλάκι σίτισης).

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΑΣΗΣΗΣ

Από τη στιγμή που ξεκινήσουν οι στερεές τροφές σταδιακά θα πρέπει να προσπαθήσετε να περάσει το βρέφος από τα πολτοποιημένα γεύματα σε άλλα με λιγότερο πολτοποιημένες τροφές ή και με μικρά κομμάτια εφόσον μπορούν να τα διαχειριστούν. Αυτό θα τα βοηθήσει να μάθουν να μασούν, να μετακινούν την τροφή στο στόμα και να καταπίνουν. Υπάρχουν και κάποια βρέφη που προτιμούν

τα λιγότερο αλεσμένα γεύματα σχεδόν από την αρχή, ενώ κάποια άλλα μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να συνθηθίσουν. Επιμείνετε στην προσφορά κομματιών λιγότερο κρεμώδους τροφής ΠΑΝΤΑ υπό την παρουσία σας σε διάφορες στιγμές της ημέρας (εκτός γευμάτων).

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

Κατά την εισαγωγή των στερεών τροφών είναι σημαντικό να προσέχετε ιδιαίτερα ώστε να μην κινδυνεύσει το βρέφος.

- Πλένετε ΠΑΝΤΑ τα χέρια σας πριν την προετοιμασία και κρατήστε τις επιφάνειες καθαρές
- Ελαττώστε τη θερμοκρασία του ζεστού φαγητού και δοκιμάστε το πριν το δώσετε στο μωρό.
- Πλένετε και ξεφλουδίζετε τα φρούτα και τα ωμά λαχανικά.
- Αποφύγετε σκληρές και σφαιρικές τροφές όπως οι ξηροί καρποί
- Αφαιρέστε τα κουκούτσια από τα φρούτα και τα οστά από το κρέας και το ψάρι.
- Αν χρειαστεί να δώσετε ένα τρόφιμο σε σφαιρική μορφή όπως το σταφύλι ή τα τοματίνια πρέπει να το κόψετε σε μικρά κομμάτια.
- Ιδιαίτερη προσοχή στον καθαρισμό και την παρασκευή αυγών και πουλερικών ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος λοίμωξης από σαλμονέλα
- Χρησιμοποιήστε ΠΑΝΤΑ φρέσκα φρούτα και λαχανικά της κάθε εποχής.
- Αν χρησιμοποιείτε έτοιμα γεύματα θα πρέπει να τα αποθηκεύετε στις κατάλληλες συνθήκες από τη στιγμή που τα ανοίξετε, και να τα πετάτε μετά από 2-3 24ωρα αν δεν έχουν καταναλωθεί. Επιπλέον θα πρέπει να δίνετε την τροφή από άλλο σκεύος και όχι από το αρχικό δοχείο προκειμένου να μην επιμολύνετε την υπόλοιπη ποσότητα. Δεν επιστρέφουμε τυχόν περίσσειμα στο δοχείο.
- Αρκετά λαχανικά όπως το καρότο, τα φασόλια και το σπανάκι μπορεί να περιέχουν υψηλές ποσότητες χημικών ουσιών (νιτρώδη) που μπορεί να μειώσουν την ποσότητα του οξυγόνου στο αίμα, προκαλώντας μεθαιμοσφαιριναιμία.

ΠΑΝΤΑ να βρίσκεστε δίπλα στο βρέφος για να το βοηθήσετε σε περίπτωση πνιγμού.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

-Μία ψηλή καρέκλα σίτισης. Το βρέφος πρέπει να κάθεται με ασφάλεια με όρθια την πλάτη και μικρή κλίση προς τα πίσω ώστε να μπορεί να καταπιεί. Θα πρέπει να είναι πάντα ασφαλισμένο με τη ζώνη του καθίσματος αλλά ακόμα και έτσι πρέπει να υπάρχει επιβλέπων.

-Μια αρκετά άνετη επιφάνεια, ώστε να τοποθετηθεί το γεύμα αλλά να επιτρέπει στο παιδί να κινεί ελεύθερα τα χέρια του ώστε να ακουμπάει αν θέλει το φαγητό.

-Σαλιάρες ή/και αδιάβροχα. (Θα γίνει χαμός!!!)

-Ελαφρά και μαλακά κουτάλια σίτισης. Δεν χρειάζονται αποστείρωση αλλά καλό πλύσιμο.

-Βαθύ, μικρού μεγέθους πλαστικό πιάτο. Καλό θα είναι η χωρητικότητά του να είναι περίπου 250-300 ml.

-Εκπαιδευτικό ποτηράκι. Το νερό είναι πολύ σημαντικό και από την ηλικία των 6 μηνών πρέπει να προσφέρετε σε μικρές γουλιές κατά τη διάρκεια του γεύματος και ελεύθερα μετά το τέλος του. Προτιμούμε αυτά χωρίς βαλβίδα (εκπαιδευτικά) ώστε το παιδί να μάθει να πίνει μικροποσότητες και να μην επηρεάζονται τα δόντια του.

-Πρόχειρα ρούχα και υφάσματα κάτω από το καρεκλάκι για λόγους καθαριότητας.

-Θερμοανθεκτικά δοχεία για να ζεστάνουμε ή να ψύξουμε το γεύμα με ασφάλεια.

-Δοχεία με κλείσιμο ασφαλείας και κενό

Five keys to safer food

Keep clean

- ✓ Wash your hands before handling food and often during food preparation
- ✓ Wash your hands after going to the toilet
- ✓ Wash and sanitize all surfaces and equipment used for food preparation
- ✓ Protect kitchen areas and food from insects, pests and other animals

Why?

While most microorganisms do not cause disease, dangerous microorganisms are widely found in soil, water, animals and people. These microorganisms are carried on hands, wiping cloths and utensils, especially cutting boards and the slightest contact can transfer them to food and cause foodborne diseases.

Separate raw and cooked

- ✓ Separate raw meat, poultry and seafood from other foods
- ✓ Use separate equipment and utensils such as knives and cutting boards for handling raw foods
- ✓ Store food in containers to avoid contact between raw and prepared foods

Why?

Raw food, especially meat, poultry and seafood, and their juices, can contain dangerous microorganisms which may be transferred onto other foods during food preparation and storage.

Cook thoroughly

- ✓ Cook food thoroughly, especially meat, poultry, eggs and seafood
- ✓ Bring foods like soups and stews to boiling to make sure that they have reached 70°C. For meat and poultry, make sure that juices are clear, not pink. Ideally, use a thermometer
- ✓ Reheat cooked food thoroughly

Why?

Proper cooking kills almost all dangerous microorganisms. Studies have shown that cooking food to a temperature of 70°C can help ensure it is safe for consumption. Foods that require special attention include minced meats, rolled roasts, large joints of meat and whole poultry.

Keep food at safe temperatures

- ✓ Do not leave cooked food at room temperature for more than 2 hours
- ✓ Refrigerate promptly all cooked and perishable food (preferably below 5°C)
- ✓ Keep cooked food piping hot (more than 60°C) prior to serving
- ✓ Do not store food too long even in the refrigerator
- ✓ Do not thaw frozen food at room temperature

Why?

Microorganisms can multiply very quickly if food is stored at room temperature. By holding at temperatures below 5°C or above 60°C, the growth of microorganisms is slowed down or stopped. Some dangerous microorganisms still grow below 5°C.

Use safe water and raw materials

- ✓ Use safe water or treat it to make it safe
- ✓ Select fresh and wholesome foods
- ✓ Choose foods processed for safety, such as pasteurized milk
- ✓ Wash fruits and vegetables, especially if eaten raw
- ✓ Do not use food beyond its expiry date

Why?

Raw materials, including water and ice, may be contaminated with dangerous microorganisms and chemicals. Toxic chemicals may be formed in damaged and mouldy foods. Care in selection of raw materials and simple measures such as washing and peeling may reduce the risk.

Knowledge = Prevention

Food Safety
World Health Organization

- αέρος ώστε να διατηρείτε με ασφάλεια το φαγητό.
- Φωτογραφική μηχανή ή κάμερα για να αποθηκεύσετε αυτές τις μαγικές στιγμές!

ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΙΤΗΣΗΣ

Finger foods

Μόλις το βρέφος ξεκινήσει τις στερεές τροφές, ενθαρρύνετέ το να συμμετέχει την ώρα του φαγητού και να διασκεδάζει ακουμπώντας, κρατώντας και εξερευνώντας το φαγητό. Αφήστε το να δοκιμάσει με τα δάχτυλά του ό,τι θέλει. Η διαδικασία αυτή αναπτύσσει τη λεπτή κινητικότητα και τη συνεργασία ανάμεσα στον οφθαλμό και το χέρι. Επιπλέον το βρέφος δείχνει την ποσότητα που θέλει να φάει και εξοικειώνεται με διάφορες υφές τροφής. Σταδιακά θα αποκτήσει άνεση να σιτίζεται μόνο του.

Η τροφή θα πρέπει να είναι κομμένη σε κομμάτια αρκετά μεγάλα ώστε να τα πιάσει το βρέφος στη γροθιά του και να προεξέχουν ελαφρώς (περίπου όσο το μήκος δακτύλου του ενήλικα). Αρχικά θα πρέπει να προσφέρονται τροφές που θρυμματίζονται εύκολα στο στόμα. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι σκληρές τροφές όπως τα ωμά καρότα και το μήλο ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πνιγμονής.

Παραδείγματα finger foods:

- Μαλακά μαγειρεμένα λαχανικά, όπως καρότο, μπρόκολο, κουνουπίδι, κολοκύθα
- Φρούτα (μαλακά ή μαγειρεμένα ΧΩΡΙΣ επιπλέον ζάχαρη), όπως αχλάδι, ροδάκινο, μπανάνα, πεπόνι, αβοκάντο και μήλο.
- Μαγειρεμένες αμυλούχες τροφές όπως, πατάτα, γλυκοπατάτα, ζυμαρικά, ρύζι και noodles, είδη ψωμιού (αραβική, chapatti)
- Όσπρια όπως φασόλια, φακές και ρεβύθια (falafel)
- Ψάρι (χωρίς αγκάθια)
- Καλά βρασμένα αβγά
- Κρέας χωρίς οστά
- 'Μπαστούνακια' από παστεριωμένα και πλήρη σε λιπαρά σκληρά τυριά (με όσο το δυνατόν λιγότερο αλάτι)

Baby-led weaning

Διαδικασία κατά την οποία το βρέφος σιτίζεται από την αρχή μόνο του με finger foods αντί να τρώει πολτοποιημένες τροφές από κουτάλι. Μπορεί να εφαρμοστεί αποκλειστικά ή σε συνδυασμό με τη σίτιση με κουτάλι. Ο κάθε γονιός επιλέγει αυτό που του ταιριάζει καλύτερα προσδοκώντας το βρέφος να δοκιμάσει και να τρώει μια ποικιλία τροφών σε επαρκείς ποσότητες ώστε να λαμβάνει όλα τα συστατικά που χρειάζεται.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΤΡΟΦΩΝ

Αρχικά στόχος μας είναι η σταδιακή εισαγωγή τροφών ώστε να μην πιέσουμε το παιδί και εμφανίσει αρνητική αντίδραση.

Στην ηλικία αυτή τα βρέφη κάνουν συνήθως 5 γεύματα ημερησίως:

Πρωινό: Γάλα

Δεκατιανό: Γάλα (φρούτα)

Μεσημεριανό: Γάλα (λαχανικά με πρωτεΐνη)

Απογευματινό: Γάλα (δημητριακά)

Βραδινό: Γάλα

Σαν πρωινό και βραδινό γεύμα δίνουμε γάλα, μητρικό ή εμπλουτισμένο (formula). Το γάλα αγελάδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μαγείρεμα ή την ετοιμασία του γεύματος από την ηλικία των 6 μηνών, αλλά ΔΕΝ πρέπει να δίνεται σαν ρόφημα πριν το έτος λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας σε σίδηρο. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα με πλήρη λιπαρά μπορούν να δοθούν από 6 μηνών. Τέτοια είναι τα παστεριωμένα τυριά, το γιαούρτι και το νωπό τυρί (fromage frais). Προτιμούμε πάντα προϊόντα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη και με όσο το δυνατόν λιγότερο αλάτι.

Σαν απογευματινό γεύμα εισάγουμε τα δημητριακά. Στην κατηγορία αυτή ανήκει το ρύζι (παρουσιάζει την μικρότερη αλλεργιογονικότητα), το σιτάρι, η βρώμη, το καλαμπόκι, το σιμιγδάλι κ.α. Το γεύμα μπορεί να αποτελείτε από έτοιμες κρέμες ή μπορεί να γίνει με κάποιο αντίστοιχο προϊόν (τραχανάς, αστεράκι) σε αυτή την περίπτωση όμως είναι αδύνατο να καλύψει τις ανάγκες του παιδιού και επιπλέον εγείρονται και ερωτήματα ποιότητας. Ξεκινούμε πάντα με μικροποσότητες τις πρώτες ημέρες και ανάλογα με την ανταπόκριση του βρέφους ανεβαίνουμε σταδιακά μέχρι μια

πλήρη μερίδα 200-250 ml. Χρησιμοποιούμε ρυζάλευρο αρχικά για 5-7 ημέρες ώστε να εγκαταστήσουμε μια ρουτίνα και έπειτα δοκιμάζουμε κάποιο άλλο υλικό. Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιούμε MONO ENA NEO υλικό για 2 γεύματα τουλάχιστον, ώστε σε περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης να μπορούμε να ενοχοποιήσουμε την υπεύθυνη τροφή.

Το επόμενο γεύμα που αλλάζουμε είναι το δεκατιανό. Επιλέγουμε ένα φρέσκο φρούτο εποχής, χωρίς φλούδα και σπόρους το οποίο εισάγουμε αφού πρώτα το πολτοποιήσουμε. Μπορούμε να τροποποιήσουμε την υφή με τη χρήση νερού ή κρέμας. Προσθέτουμε ανά 2 ημέρες ένα καινούργιο φρούτο στη διατροφή του βρέφους. Είναι προτιμότερο να μην βάζουμε στη φρουτόκρεμες πολλά διαφορετικά φρούτα αλλά συνδυασμούς 2-3 με MONO ENA NEO. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τροπικά φρούτα εισαγωγής, μερικά από αυτά μάλιστα (αβοκάντο) έχουν ιδιαίτερη διατροφική αξία. Προσπαθούμε να κάνουμε διαφορετικούς συνδυασμούς και ελέγχουμε τις αντιδράσεις του βρέφους σε υφές και γεύσεις. Σταδιακά αυξάνουμε την ποσότητα μέχρι τα πλήρη μερίδα 200-250ml.

Το τελευταίο γεύμα που αλλάζουμε είναι το μεσημεριανό. Αρχικά δοκιμάζουμε το καρότο στη φρουτοσαλάτα (καθαρισμένο και βρασμένο) και μετά το 2ήμερο δοκιμής δίνουμε σαν γεύμα καρότο και πατάτα (βρασμένα, χωρίς φλούδα και πολτοποιημένα) με μια κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο (μη μαγειρεμένο). 2 ημέρες μετά προσθέτουμε το κολοκύθι και 2 ημέρες μετά το κοτόπουλο. Στο γεύμα αυτό ΔΕΝ προσθέτουμε αλάτι ή άλλα μπαχαρικά ενώ δεν χρησιμοποιούμε και μυρωδικά. Μπορούμε όμως να προσθέσουμε λίγες σταγόνες λεμόνι. Από το σημείο αυτό και έπειτα μπορούμε ελεύθερα να χρησιμοποιήσουμε όποιο είδος κρέατος θέλουμε, μαζί με πατάτα και 2 λαχανικά εποχής (κάθε νέο λαχανικό ανά 2 ημέρες). Σταδιακά ανεβάζουμε την ποσότητα μέχρι τα 200-250ml.

- Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίδρασης META από γεύμα καλούμε ΑΜΕΣΑ τον παιδίατρο.
- Σε περίπτωση ατομικού ή οικογενειακού ιστορικού αλλεργίας τροποποιούμε ανάλογα το πρόγραμμά μας.
- Προσπαθούμε να προσφέρουμε στο βρέφος υλικά που χρησιμοποιούμε στη διατροφή μας ώστε να μπορέσει να περάσει με μεγαλύτερη ευκολία στο φαγητό του σπιτιού.
- Αν για όποιο λόγο το βρέφος δεν θέλει να φάει δίνουμε γάλα.
- Συνοδεύουμε τα γεύματα με νερό
- Ημερήσια ποσότητα γάλακτος περίπου 500-600ml.
- Στην ηλικία αυτή μπορούμε να δώσουμε και γαλακτοκομικά όπως τυρί και γιαούρτι. Πρέπει να είναι πλήρη λιπαρών και το επιθυμητό θα ήταν να μην έχουν επιπλέον ζάχαρη ή αλάτι.
- Δεν περιοριζόμαστε μόνο σε γλυκιές ή μαλακές τροφές. Δίνουμε ευρεία λίστα τροφών ώστε να μην κατευθύνουμε τη σίτιση.
- Προσπαθήστε να περιλαμβάνεται τροφές που περιέχουν σίδηρο, όπως το κρέας, το ψάρι, τα ενισχυμένα δημητριακά, λαχανικά όπως το σπανάκι, φασόλια και φακές, σε ΚΑΘΕ γεύμα.
- Απαγορεύεται το μέλι και ιδιαίτερα το άγριο πριν το 18ο μήνα.

Σταδιακά θα προστεθούν στη δίαιτα του βρέφους και τροφές όπως τα όσπρια, το αβγό, το ψάρι και τα θαλασσινά μετά από τις οδηγίες του παιδιάτρου.

Ειδικά για το αυγό τα παιδιά αρχικά πρέπει να το δοκιμάσουν πολύ καλά βρασμένο καθώς το αβγό έχει την ιδιότητα να χάνει μέρος της αλλεργιογονικότητάς του με τη θερμότητα (λόγω του ότι αλλάζει η δομή των πρωτεϊνών που προκαλούν αλλεργία) και στη συνέχεια ψημένο σε μείγματα όπως κέικ, τσουρέκι, μπιφτέκι κ.α. Αν δεν παρουσιαστεί κάποια αντίδραση μπορεί να δοκιμαστεί και σε λιγότερο βρασμένο μορφή όπως η ομελέτα ή και ωμό όπως στις αυγοκομμένες σούπες. Στα παιδιά που υπάρχει ιστορικό ατοπίας θα πρέπει αρχικά να δοκιμαστεί πρώτα μόνο ο κρόκος και αν γίνει ανεκτός και το ασπράδι.

Για το ψάρι δίνουμε αρχικά λευκό φιλέτο (μπακαλιάρο, γλώσσα) και στη συνέχεια κόκκινο φιλέτο (σολωμός, τόνος). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνετε στην αφαίρεση αγκαθιών ειδικά αν προσφέρετε μη πολτοποιημένο.

Καθώς το βρέφος κλείνει το πρώτο του έτος θα πρέπει να λαμβάνει σε καθημερινή βάση τουλάχιστον:

- 6 μερίδες αμυλούχων γευμάτων (πατάτες, ψωμί και ρύζι)
- Περίπου 3 μερίδες φρούτων και λαχανικών
- 350-500 ml γάλατος ή 2-3 μερίδες γαλακτοκομικών (πλήρες γάλα αγελάδος)
- 2 μερίδες πρωτεϊνής ζωικής προέλευσης (κρέας, αυγό, ψάρι) ή 3 μερίδες φυτικής προέλευσης (φασόλια, ρεβύθια, φακές)

Επιπλέον τουλάχιστον 2 snacks μεταξύ των γευμάτων όπως κριτσίνια, γιαούρτι, νιφάδες ή μπάρες δημητριακών, «μπαστούνακια τυριών ή λαχανικών».

ΤΡΟΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ	ΗΜΕΡΗΣΙ ΕΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΑ 1-3	ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΑ 4-6	ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΑ 7-10
ΦΡΟΥΤΑ	2-3	1/4 του φλυτζανιού φρούτο κατεψυγμένο, μαγειρεμένο ή κονσέρβα 1/2 φρέσκο φρούτο	1/4 του φλυτζανιού φρούτο κατεψυγμένο, μαγειρεμένο ή κονσέρβα 1/2 φρέσκο φρούτο	1/3 του φλυτζανιού φρούτο κατεψυγμένο, μαγειρεμένο ή κονσέρβα 1 φρέσκο φρούτο
ΛΑΧΑΝΙΚΑ	2-3	1/4 του φλυτζανιού μαγειρεμένα	1/4 του φλυτζανιού μαγειρεμένα 1/2 του φλυτζανιού σαλάτα	1/2 του φλυτζανιού μαγειρεμένα 1 φλυτζάνι σαλάτα
ΣΙΤΗΡΑ	6-11	1/2 φέτα ψωμιού 1/4 του φλυτζανιού μαγειρεμένα δημητριακά, ρύζι ή μακαρόνια 1/2 του φλυτζανιού ξηρά δημητριακά 2-3 crackers	1/2 φέτα ψωμιού 1/3 του φλυτζανιού μαγειρεμένα δημητριακά, ρύζι ή μακαρόνια 1/2 του φλυτζανιού ξηρά δημητριακά 3-4 crackers	1 φέτα ψωμιού 1/2 του φλυτζανιού μαγειρεμένα δημητριακά, ρύζι ή μακαρόνια 3/4-1 φλυτζάνι ξηρά δημητριακά 4-5 crackers
ΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ	2.	30 γραμμάρια κρέας, ψάρι, κοτόπουλου ή τόφου 1/4 του φλυτζανιού μαγειρεμένα φασόλια 1/2 αυγό	30 γραμμάρια κρέας, ψάρι, κοτόπουλου ή τόφου 1/3 του φλυτζανιού μαγειρεμένα φασόλια 1 αυγό	60-90 γραμμάρια κρέας, ψάρι, κοτόπουλου ή τόφου 1/2 του φλυτζανιού μαγειρεμένα
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ	2-3	1/2 του φλυτζανιού γάλα 15 gr τυρί 1/3 του φλυτζανιού γιαούρτι	1/2 του φλυτζανιού γάλα 30 gr τυρί 1/2 του φλυτζανιού γιαούρτι	1 φλυτζάνι γάλα 30 gr τυρί 3/4-1 φλιτζάνι γιαούρτι

ΤΥΠΟΙ ΤΡΟΦΩΝ

Φρούτα και Λαχανικά

Περιέχουν πολλές βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία και ίνες. Είναι καλό να εισαχθούν πολλά και διαφορετικού τύπου σε μικρή ηλικία, είτε φρέσκα (το προτιμότερο), είτε κατεψυγμένα, είτε ακόμα και σε κονσέρβα ή αποξηραμένα, ώστε το μωρό να μπορεί να απολαμβάνει νέες υφές και γεύσεις. Να επιδιώκετε να υπάρχουν σε σχεδόν κάθε γεύμα.

Αποξηραμένα φρούτα, όπως οι σταφίδες, θα πρέπει να δίνονται με τα γεύματα και όχι σαν σνακ καθώς η ζάχαρη που περιέχουν μπορεί να προκαλέσει φθορά στα δόντια.

Διαφορετικά φρούτα και λαχανικά περιέχουν διαφορετικές βιταμίνες και μέταλλα, οπότε όσο μεγαλύτερη ποικιλία υπάρχει, τόσο το καλύτερο.

Μην ανησυχείτε αν αρχικά τους αρέσει μόνο ένα ή δύο φρούτα. Να τους προσφέρετε μικρές ποσότητες από λιγότερο αγαπημένα φρούτα και λαχανικά ώστε να μάθουν στις διαφορετικές γεύσεις.

Ορισμένα παιδιά προτιμούν τα ωμά αντί για τα μαγειρεμένα λαχανικά.

Ψωμί, Ρύζι, Πατάτες, Ζυμαρικά και άλλα τρόφιμα με άμυλο

Τροφές που περιέχουν άμυλο όπως ψωμί, δημητριακά για το πρωινό, πατάτες και γλυκοπατάτες, ρύζι, κους κους, τραχανάς, πλιγούρι, ζυμαρικά αλλά και γενικά ζύμες (αραβικές πίτες, τηγανίτες, πιροσκή, chapatti) παρέχουν ενέργεια, θρεπτικά συστατικά και ίνες.

Μπορείτε να δίνετε προϊόντα ολικής αλέσεως αλλά όχι μόνο τέτοια και ειδικά σε ηλικίες κάτω των 2 ετών. Έχουν πάρα πολλές ίνες και μπορεί το παιδί να μην προλάβει να απορροφήσει τα θρεπτικά συστατικά. Μετά τα 2 σταδιακά μπορείτε να εισάγετε περισσότερες τέτοιες τροφές.

Γάλα και Γαλακτοκομικά προϊόντα

Μητρικός θηλασμός για τους πρώτους 4-6 μήνες αλλά και μετέπειτα, εμπλουτίζοντας τη διατροφή με στερεές τροφές. Τροποποιημένο γάλα αγελάδος σαν Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ εναλλακτική για τους πρώτους 12 μήνες. Πλήρες γάλα αγελάδος μετά τον πρώτο χρόνο. Αποτελούν την κύρια πηγή πρόσληψης ασβεστίου που είναι απαραίτητο για την υγεία των οστών. Επιπλέον περιέχουν βιταμίνη Α που βοηθάει στην άμυνα απέναντι σε λοιμώξεις και χρειάζεται για την υγεία του δέρματος και των ματιών.

Απαιτούνται περίπου 350-500ml γάλατος ημερησίως ή 2 μερίδες γαλακτοκομικών όπως τυρί, γιούργια ή fromage frais.

Ημιαποβουτυρωμένο γάλα μετά τα 2 έτη και μόνο αν το παιδί μεγαλώνει καλά και έχει πλούσιο διαιτολόγιο.

Αποβουτυρωμένο ή 1% γάλα ΟΧΙ πριν τα 5 έτη λόγω της μικρής ποσότητας λιπαρών που περιέχει. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί στο μαγείρεμα από 1 έτους.

Από την ίδια ηλικία μπορείτε να δίνετε εναλλακτικά είδη του γάλατος με την προϋπόθεση πως δεν έχουν γλυκαντικά και είναι εμπλουτισμένα με ασβέστιο. Τέτοια είναι το γάλα σόγιας, καρύδας και αμυγδάλου. Ιδιαίτερη προσοχή στο γάλα σόγιας λόγω των φυτοοιστρογόνων που περιέχει.

Βρέφη και παιδιά κάτω των 5 ετών ΔΕΝ πρέπει να καταναλώνουν ροφήματα ρυζιού λόγω των υψηλών επιπέδων αρσενικού που περιέχεται σε αυτά.

Τυρί

Μπορεί να αποτελέσει τμήμα μιας υγιούς δίαιτας σε βρέφη και παιδιά, καθώς παρέχει ασβέστιο, πρωτεΐνες και βιταμίνες όπως η Α.

Τα βρέφη μπορεί να τρώνε παστεριωμένα τυριά πλήρη λιπαρών από την ηλικία των 6 μηνών (είτε σκληρά είτε μαλακά και κρεμώδη). Τα πλήρη λιπαρών συστήνονται τουλάχιστον μέχρι 2 ετών λόγω των αναγκών του οργανισμού σε ενέργεια και λίπος. Δεν θα πρέπει να καταναλώνουν μαλακά τυριά που ωριμάζουν με μύκητες όπως brie και camembert, ώριμα τυριά από γάλα κασίκας όπως το chèvre, και μαλακά τυριά με κυανές ραβδώσεις όπως το roquefort. Υπάρχει περίπτωση τα τυριά αυτά να είναι από μη παστεριωμένο γάλα και επομένως μπορεί να είναι επιμολυσμένο με ένα μικρόβιο που λέγεται listeria. Μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν στο μαγείρεμα.

Θα πρέπει ΠΑΝΤΑ να ελέγχετε τις ετικέτες των γαλακτοκομικών για να σιγουρευτείτε πως είναι από παστεριωμένο γάλα.

Όσπρια, Ψάρι, Αυγά, Κρέας και άλλα είδη πρωτεΐνης.

Η πρόσληψη πρωτεΐνης και σιδήρου είναι απαραίτητη για την αύξηση και την ανάπτυξη. Οι τροφές της κατηγορίας είναι εξαιρετικές πηγές αυτών των ουσιών. Οι καρποί περιέχουν επίσης πρωτεΐνες αλλά θα πρέπει να δίνονται με ιδιαίτερη προσοχή σε ακέραη μορφή κάτω των 5 ετών λόγω του κινδύνου πνιγμονής.

Συστήνεται τα αγόρια να ΜΗΝ καταναλώνουν πάνω από 4 μερίδες λιπαρών ψαριών (σολωμός, σαρδέλα, σκουμπρί) την εβδομάδα, ενώ τα κορίτσια όχι πάνω από 2 μερίδες. Αυτό οφείλεται στο ότι τα λιπαρά ψάρια μπορεί να περιέχουν μικρές ποσότητες ανεπιθύμητων ουσιών οι οποίες σταδιακά αθροίζονται στον οργανισμό. Από τη στιγμή που τηρείται η συνθήκη αυτή τα οφέλη είναι πολύ σημαντικά.

Τροφές που περιέχουν λίπος, ζάχαρη και αλάτι

Λίπος

Απαραίτητο για παιδιά κάτω των 2 ετών λόγω της παρεχόμενης ενέργειας. Υπάρχουν όμως και βιταμίνες που βρίσκονται αποκλειστικά στο λίπος όπως η Α και η D με αποτέλεσμα η περιορισμένη κατανάλωση να οδηγεί σε αβιταμίνωση. Σταδιακά μειώνεται η ποσότητα που χρειάζεται ο οργανισμός και μετά τα 5 τα παιδιά μπορεί να ακολουθούν το διαιτολόγιο της οικογένειας. Θα πρέπει όμως να προσέχετε το ποσό ειδικά των κορεσμένων λιπών που περιέχεται σε αυτό και να το περιορίζετε κατά το δυνατόν. Για να το πετύχετε μειώστε τα τηγανητά φαγητά, χρησιμοποιήστε κρέας και τυριά με ελάχιστη ποσότητα λίπους, αφαιρέστε το δέρμα από τα πουλερικά, χρησιμοποιήστε περισσότερα όσπρια και λιγότερο μαγειρικό λάδι και ιδίως πλούσιο σε μονο- και πολυακόρεστα λιπαρά όπως το ελαιόλαδο.

Ζάχαρη

Προκειμένου να προληφθούν τα οδοντιατρικά προβλήματα απαιτείται συχνό πλύσιμο των δοντιών ενώ τουλάχιστον μέχρι 3 ετών πρέπει να επισκεφθείτε οδοντίατρο. Επιπλέον όμως πρέπει να περιορίσετε την

πρόσληψη πρόσθετης ζάχαρης (σε χυμούς, κέικ, γλυκά και μαρμελάδες) στο ελάχιστο. Στη διάρκεια των γευμάτων προσφέρετε νερό ή αραιωμένο φρουτοχυμό, ενώ άνω των 5 ετών μπορείτε να προσφέρετε περίπου 150ml πλήρους χυμού μαζί με το γεύμα ώστε να μειώνετε η φθορά των δοντιών. Το ίδιο ισχύει και για τα αποξηραμένα φρούτα.

Αλάτι

Δεν υπάρχει ανάγκη να προσθέτετε επιπλέον αλάτι στο φαγητό. Θα δημιουργήσει εξάρτηση σε αλμυρές γεύσεις και θα προκαλέσει υπέρταση στο μέλλον. Ιδιαίτερη προσοχή στις ετικέτες των τροφών για πρόσθετο αλάτι.

Ελαιόλαδο

Αποτελεί πολύτιμη πηγή μονοακόρεστων λιπαρών οξέων (ολεικό οξύ) το οποίο μάλιστα είναι αρκετά ανθεκτικό στην επίδραση υψηλής θερμοκρασίας και επομένως χρήσιμο και στη μαγειρική. Οι ουσίες αυτές είναι αντιφλεγμονώδεις ενώ πιθανόν να έχουν αντικαρκινική δράση. Επιπλέον το ελαιόλαδο είναι χρήσιμο λόγω των αντιοξειδωτικών ουσιών που περιέχει και παίζουν ρόλο σε χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις. Ακόμα περιέχει σημαντικές ποσότητες βιταμινών E και K ενώ υπάρχουν αρκετές μελέτες που αποδεικνύουν πως η κατανάλωσή του ΔΕΝ συνδέεται με την παχυσαρκία.

Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε πως τα βρέφη και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που έχουν διαιτητικούς περιορισμούς (vegetarian) πρέπει να λαμβάνουν επαρκή ποσότητα (περίπου 500 mL) μητρικού γάλατος ή τροποποιημένου γάλατος αγελάδος και γαλακτοκομικά προϊόντα. Βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας ΔΕΝ πρέπει να έχουν δίαιτα vegan. Αν όμως αυτό δεν είναι εφικτό θα πρέπει οι γονείς να λάβουν σαφείς οδηγίες από διατροφολόγο και να παρακολουθούν την ανάπτυξη του παιδιού τους σε συνεργασία με τον παιδίατρό τους.

Αυτές είναι οι γενικές οδηγίες για μια από τις πιο όμορφες εμπειρίες στην ζωή ενός γονιού. Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε πως κάθε παιδί είναι διαφορετικό και προκειμένου η όλη διαδικασία να εξελιχθεί ομαλά χρειάζεται καλή διάθεση, υπομονή και συνεργασία με τον παιδίατρο.