

相似

Didneipsun

目录

1	特征值与特征向量	1
1.1	迹	1
1.2	逆矩阵	1
1.3	抽象型	2
1.4	可逆矩阵	2
1.5	实对称矩阵	2
2	相似理论	3
2.1	判断相似对角化	3
2.2	反求参数	3
2.3	反求矩阵	3
2.4	相似性	4
2.5	抽象型	4

特征值往往与前面的内容进行混合考察。

1 特征值与特征向量

1.1 迹

例题：已知 A 是 3 阶方阵，特征值为 1, 2, 3，求 $|A|$ 的元素 a_{11}, a_{22}, a_{33} 的代数余子式 A_{11}, A_{22}, A_{33} 的和 $\sum_{i=1}^3 A_{ii}$ 。

解：首先代数余子式的和 A_{11}, A_{22}, A_{33} 一般在行列式展开定理中使用，但是这里给出的不是一行或一列的代数余子式，而是主对角线上的代数余子式，这就无法使用代数余子式来表达行列式的值了。

而另一个提到代数余子式的地方就是伴随矩阵 A^* ，所求的正好是伴随矩阵的迹 $tr(A^*) = A_{11} + A_{22} + A_{33}$ 。

又根据特征值性质，特征值的和为矩阵的迹，特征值的积为矩阵行列式的值，所以 $tr(A^*) = A_{11} + A_{22} + A_{33} = \lambda_1^* + \lambda_2^* + \lambda_3^*$

$$= \sum_{i=1}^3 \frac{|A|}{\lambda_i} = \sum_{i=1}^3 \frac{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3}{\lambda_i} = \lambda_2 \lambda_3 + \lambda_1 \lambda_3 + \lambda_1 \lambda_2 = 2 + 3 + 6 = 11。$$

1.2 逆矩阵

通过相关式子将逆矩阵转换为原矩阵。同一个向量的逆矩阵的特征值是原矩阵的特征值的倒数。

例题：已知 $\vec{\alpha} = (a, 1, 1)^T$ 是矩阵 $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & a & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{bmatrix}$ 的逆矩阵的特征向量，则求 $\vec{\alpha}$ 在矩阵 A 中对应的特征值。

解：由于 $\vec{\alpha}$ 是 A^{-1} 的特征向量，所以令此时的特征值为 λ_0 ，则定义 $\lambda_0 \vec{\alpha} = A^{-1} \vec{\alpha}$ ， $\lambda_0 A \vec{\alpha} = \vec{\alpha}$ 。

$$\text{即 } \lambda_0 \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & a & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 即 } \lambda_0 \begin{bmatrix} -a & 2 & 2 \\ 2a & a & -2 \\ 2a & -2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}。$$

即根据矩阵代表的是方程组，得到 $\lambda_0(4-a) = a$ ， $\lambda_0(3a-2) = 1$ ， $\lambda_0(2a-3) = 1$ 。

又 $\lambda_0 \neq 0$ ， $3a-2 = 2a-3$ ， $a = -1$ ，则 $\lambda_0 = -\frac{1}{5}$ 。

所以矩阵 A 对应的特征值为 -5 。

1.3 抽象型

题目只会给对应的式子，来求对应的特征向量或特征值。需要记住特征值的关系式然后与给出的式子上靠拢，不会很复杂。

例题：已知 A 为三阶矩阵，且矩阵 A 各行元素之和均为 5，则求 A 必然存在的特征向量。

解：由于是抽象型，所以没有实际的数据，就不能求出固定的特征值， $\lambda\xi = A\xi$ 。

又矩阵 A 各行元素之和均为 5，所以转换为方程组：

$$\begin{cases} A_{11} + A_{12} + A_{13} = 5 \\ A_{21} + A_{22} + A_{23} = 5 \\ A_{31} + A_{32} + A_{33} = 5 \end{cases}, \text{ 转为矩阵: } \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 5 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}。$$

即 $\xi = (1, 1, 1)^T$ 。

1.4 可逆矩阵

使用可逆矩阵相似对角化的性质。若 $A \sim B$ ，则 $P^{-1}AP = B$ 。 B 为纯量阵。且 B 的迹为 A 的特征值。 P 为特征向量。

例题：已知 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{bmatrix}$ ， $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 可逆，求 A 关于特征值 $\lambda = 1$ 的特征向量。

解：根据 $P^{-1}AP = \Lambda$ ，所以 P 为特征向量， $1, 1, -1$ 为特征值。

所以 A 关于 $\lambda = 1$ 的特征向量为 α_1 或 α_2 。而某一特征值的全部特征向量构成特征向量子空间，所以 $\lambda = 1$ 的特征向量为 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$ 。

1.5 实对称矩阵

实对称矩阵的不同特征值的特征向量相互正交 ($B^T A = 0$)。

例题：已知 A 为三阶实对称矩阵，特征值为 $1, 3, -2$ ，其中 $\alpha_1 = (1, 2, -2)^T$ ， $\alpha_2 = (4, -1, a)^T$ 分别属于特征值 $\lambda = 1$ ， $\lambda = 3$ 的特征向量。求 A 属于特征值 $\lambda = -2$ 的特征向量。

解：令 A 属于特征值 $\lambda = -2$ 的特征向量为 $(x_1, x_2, x_3)^T$ 。

根据实对称矩阵的正交性质。

$\alpha_1^T \alpha_2 = 4 - 2 - 2a = 0, \alpha_2^T \alpha_3 = 4x_1 - x_2 + ax_3 = 0, \alpha_3^T \alpha_1 = x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0。$
 $a = 1, 4x_1 - x_2 + x_3 = 0, x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0,$ 解得基础解系 $(0, 1, 1)^T, \alpha_3 = (0, k, k)^T (k \neq 0)。$

2 相似理论

2.1 判断相似对角化

可以使用相似对角化的四个条件，但是最基本的使用还是 A 有 n 个无关的特征向量 ξ 。

2.2 反求参数

常用方法：

- 若 $A \sim B$, 则 $|A| = |B|, r(A) = r(B), tr(A) = tr(B), \lambda_A = \lambda_B$, 通过等式计算参数。
- 若 ξ 是 A 属于特征值 λ 的特征向量, 则有 $A\xi = \lambda\xi$, 建立若干等式或方程组来计算参数。
- 若 λ 是 A 的特征值, 则与 $|\lambda E - A| = 0$, 通过该等式计算参数。

例题：已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & y & \\ & & -1 \end{pmatrix}$, 且 $A \sim B$, 求参数。

首先可以利用迹相等, 则 $2+0+x = 2+y-1$, 行列式值相等, 则 $-2 = -2y$, 解得 $x = 0, y = 1$ 。

2.3 反求矩阵

若有可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$, 则：

- $A = P\Lambda P^{-1}。$
- $A^k = P\Lambda^k P^{-1}。$
- $f(A) = Pf(\Lambda)P^{-1}。$

例题：已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & x & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 3 & -6 & 0 \end{pmatrix}$ 相似于对角矩阵，求 A^{100} 。

解：首先 $A \sim \Lambda$ ，所以 A 能相似对角化。

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -x & -1 \\ 0 & \lambda - 3 & 0 \\ -3 & 6 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 3)^2(\lambda + 1) = 0. \quad \lambda_1 = \lambda_2 = 3,$$

$$\lambda_3 = -1.$$

所以对于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 3$ 时，需要 $s = 2$ ，从而 $r(A) = 1$ ，对应成比例。

$$\text{代入 } 3: (3E - A)x = 0, \quad \begin{pmatrix} 1 & -x & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -3 & 6 & 3 \end{pmatrix} = 0, \quad \text{所以 } \frac{-1}{3} = \frac{-x}{6}, \quad x = 2.$$

解得 $\xi_1 = (1, 0, 1)^T$, $\xi_2 = (2, 1, 0)^T$, $\xi_3 = (1, 0, -3)^T$ 。

令 $P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$ ，所以 $A = P\Lambda P^{-1}$, $A^{100} = P\Lambda^{100}P^{-1}$ 。

2.4 相似性

- 定义法：若存在可逆矩阵 P ，使得 $P^{-1}AP = B$ ，则 $A \sim B$ 。
- 性质：若 $A \sim B$ ，则 $r(A) = r(B)$, $|A| = |B|$, $tr(A) = tr(B)$, $\lambda_A = \lambda_B$ 。
- 传递性：若 $A \sim \Lambda$, $\Lambda \sim B$ ，则 $A \sim B$ 。

例题：已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & a \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ 和对角矩阵相似，求 a 。

解：由于 A 是对角矩阵，所以特征值为其迹 $\lambda = (3, 2, 3)$ 。特征值有二重根。

已知 $A \sim \Lambda$, $\lambda = 3$ 有两个线性无关的特征向量。即 $(3E - A)x = 0$ 有两个线性无关的解。即 $r(3E - A) = 1$ 。

$$3E - A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -a - 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \therefore a = -2.$$

2.5 抽象型

例题：设 A 是三阶矩阵， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是三维线性无关的列向量，且 $A\alpha_1 = \alpha_2 + \alpha_3$, $A\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_3$, $A\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$ ，求 A 相似的矩阵。

解: $A \sim \Lambda$, 则 $P^{-1}AP = \Lambda$ 。

$$A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}。$$

$$\text{记 } P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}。$$

又 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是三维线性无关的列向量, $\therefore |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| \neq 0$, 所以 P 可逆。

$\therefore AP = PB, \quad P^{-1}AP = B, \quad A \sim B$ 。

2.6 正交相似