

二次型

Didneipsun

目录

1	二次型	1
1.1	配方法	1
1.2	矩阵乘法	1
2	标准形	1
2.1	配方法	1
2.1.1	平方项	2
2.1.2	无平方项	2
2.2	初等变换法	3
2.3	正交变换法	4
3	正定二次型	4

1 二次型

即最基本的将二次型式子变为矩阵形式。

1.1 配方法

1.2 矩阵乘法

由于二次型是 X^TAX 的形式，所以最后的左右两边都存在所有的 x_i ，所以可以依次把 x_i 缺的项进行补齐 x_n 与其他所有 x_i 乘积的和的形式。

例题：将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_2x_3 + 2x_1x_3$ 化为矩阵。

$$\begin{aligned} \text{解：} f(x_1, x_2, x_3) &= 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_2x_3 + 2x_1x_3 = 2x_1^2 - 2x_1x_2 + \\ &2x_1x_3 + 2x_2^2 - 2x_2x_3 + 2x_3^2 = 2x_1^2 - x_1x_2 + x_1x_3 + 2x_2^2 - x_1x_2 - x_2x_3 + 2x_3^2 + x_1x_3 - x_2x_3 = \\ &x_1(2x_1 - x_2 + x_3) + x_2(-x_1 + 2x_2 - x_3) + x_3(x_1 - x_2 + 2x_3) \\ &= [x_1, x_2, x_3] \begin{bmatrix} 2x_1 - x_2 + x_3 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 \end{bmatrix} = [x_1, x_2, x_3] \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}。 \\ \text{即 } A &= \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}。 \end{aligned}$$

2 标准形

即将二次型式子变为平方形式，再变量更换，变成矩阵形式。

2.1 配方法

1. 如果二次型有平方项，则首先从 x_1 开始往后不断配方，让最后的式子全部以平方加和的形式，从而不会有混合项。
2. 如果二次型没有平方项，则首先令 $x_1 = y_1 + y_2$, $x_2 = y_1 - y_2$, $x_i = y_i$ 等然后带入 $f(x)$ 强行出现平方项，然后配方，成功后再用 z_i 替换。
3. 如果总的完全平方项数小于变量个数，则令多余的 x_i 为 y_i ，系数为 0。

2.1.1 平方项

即依次对存在 x_i 的式子进行整合配方。

例题：将 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - x_2^2 - 2x_2x_3 - x_3^2$ 化为标准形并求出作的可逆线性变换。

解：首先对 x_1 进行配方，因为有 x_1 因子的式子有 $x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3$ 。

所以将 x_1, x_2, x_3 全部配在一起： $(x_1 + x_2 + x_3)^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 。

所以 $f(x) = (x_1 + x_2 + x_3)^2 - 2x_2^2 - 4x_2x_3 - 2x_3^2$ ，然后继续配 x_2 。

因为还有 $-2x_2^2 - 4x_2x_3$ ，所以配成 $-2(x_2 + x_3)^2$ ，正好全部配完了。

$\therefore f(x) = (x_1 + x_2 + x_3)^2 - 2(x_2 + x_3)^2$ 。

令 $y_1 = x_1 + x_2 + x_3$ ， $y_2 = x_2 + x_3$ ，补 $y_3 = x_3$ ， $\therefore f = y_1^2 - 2y_2^2$ 。

$(y_1, y_2, y_3)^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} (x_1, x_2, x_3)^T$ ，此时是 $y = Dx$ ，但是我们要求的

是 $x = Cy$ ，所以 $C = D^{-1}$ ，所以 D^{-1} 才是作出的可逆线性变换。

所以得到的线性变换为 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

这样方法还要重新求逆，比较麻烦。实际上我们要求的是 $x = Cy$ ，即用 y 来表示 x ，从而直接将 y 来表示 x 就可以了。

首先 $y_3 = x_3$ ，所以 $x_2 = y_2 - x_3 = y_2 - y_3$ ， $x_1 = y_1 - x_2 - x_3 = y_1 - y_2 + y_3 - y_3 = y_1 - y_2$ ，综上 $x_1 = y_1 - y_2$ ， $x_2 = y_2 - y_3$ ， $x_3 = y_3$ ，也得到同样结果。

2.1.2 无平方项

例题：将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 - x_2x_3$ 化为规范形，并求所用的可逆线性变换。

解：因为二次型中没有平方项式子，而如果进行配方一定会出现平方，就会产生冲突，所以希望把 x 代换称有平方的式子。

令 $x_1 = y_1 + y_2$ ， $x_2 = y_1 - y_2$ ， $x_3 = y_3$ ，代入二次型中。

$f = y_1^2 - y_2^2 + y_1y_3 + y_2y_3 - y_1y_3 - y_2y_3 = y_1^2 - y_2^2 + 2y_2y_3 = y_1^2 - y_2^2 + 2y_2y_3$ 。

此时由没有平方项就变成了有平方项，所以就能进行配方。

$= y_1^2 - (y_2 - y_3)^2 + y_3^2$ ，继续之前的步骤，进行换元：

令 $z_1 = y_1, z_2 = y_2 - y_3, z_3 = y_3, f = z_1^2 - z_2^2 + z_3^2$ 得到标准形。

对于 x 与 y : $(x_1, x_2, x_3)^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} (y_1, y_2, y_3)^T$ 。 y 作为过渡变量。

将 y 转换为 z : $(z_1, z_2, z_3)^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} (y_1, y_2, y_3)^T$, 我们需要 $x = Cz$ 。

$$(x_1, x_2, x_3)^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} (z_1, z_2, z_3)^T, \text{ 从而得到 } C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}。$$

2.2 初等变换法

$f(x) = X^T A X$, 线性变换 $X = CY, C^T A C = \Lambda$, 又 C 可逆, $\therefore C = P_1 P_2 \cdots P_s$, $E P_1 P_2 \cdots P_s = C, \therefore (P_1 P_2 \cdots P_s)^T A P_1 P_2 \cdots P_s = \Lambda$,

1. 对 A, E 做同样的初等列变换。
2. 对 A 做相应的初等行变换。(交换 i, j 列就要交换 i, j 行)。一套行列变换后 Λ 为对称矩阵。
3. A 化成对角矩阵时, E 化成的就是 C 。

$$\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \Lambda \\ C \end{pmatrix}, \text{ 对整个列变换, 只对 } A \text{ 行变换。}$$

$$\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\therefore \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2.3 正交变换法

例题：将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ 使用正交变换法化为标准形，并求所作的正交变换。

已知将二次型通过矩阵表示：
$$= (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix} (x_1, x_2, x_3)^T。$$

这个矩阵跟第五章相似的实对称矩阵相似对角化的例题的矩阵一样。

所以直接结果： $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 10, \eta'_1 = \frac{\sqrt{5}}{5}(-2, 1, 0)^T, \eta'_2 = \frac{\sqrt{5}}{15}(2, 4, 5)^T,$
 $\eta'_3 = \frac{1}{3}(1, 2, -2)^T。$

第五步：
$$f(x) = g(y) = y^T \Lambda y = (y_1, y_2, y_3) \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 10 \end{pmatrix} (y_1, y_2, y_3)^T = y_1^2 + y_2^2 + 10y_3^2$$

3 正定二次型

3.1 具体型

1. 顺序主子式全部大于 0。
2. 特征值全部大于 0。
3. 配方化为全平方和的标准型，正惯性指数 $p = n$ （未知数个数）。

4. 矩阵乘法配方为完全平方和，内积 $D^T D$ 不等于 0。

5. 。

3.2 抽象型