

多元函数微分学

Didnelpsun

目录

1	基本概念	1
1.1	二元函数	1
1.2	复合函数	1
1.2.1	链式法则	1
1.2.2	特殊值反代	2
1.3	积分与微分	2
1.3.1	积分到微分	2
1.3.2	微分到积分	2
2	多元函数微分应用	3
2.1	空间曲线的切线与法平面	3
2.1.1	参数方程	3
2.1.2	交面式方程	3
2.2	空间曲面的切平面与法线	4
2.2.1	隐式	4
2.2.2	显式	4

1 基本概念

1.1 二元函数

函数以 $f(u, v)$ 的形式来出现, 需要分别对其求偏导。

例题: 设 $z = e^{xy} + f(x+y, xy)$, $f(u, v)$ 有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

解: 令 $x+y$ 为 u , xy 为 v , $f(u, v)$ 对 u 求导就是 f'_1 , 对 v 求导就是 f'_2 , 求 uv 依次求导就是 f''_{12} , 以此类推。

首先求一次偏导: $\frac{\partial z}{\partial x} = ye^{xy} + \frac{\partial f(u, v)}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f(u, v)}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = ye^{xy} + f'_1 + f'_2 y$ 。

接着对 y 求偏导: $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = e^{xy} + xye^{xy} + \frac{\partial f'_1}{\partial y} + \frac{\partial f'_2 y}{\partial y}$ 。
 $= e^{xy} + xye^{xy} + \frac{\partial f'_1}{\partial y} + \frac{\partial f'_2}{\partial y} y + f'_2 \frac{\partial y}{\partial y} = e^{xy} + xye^{xy} + \frac{\partial f'_1}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f'_1}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial f'_2}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f'_2}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} + f'_2$
 $= e^{xy} + xye^{xy} + f''_{11} + f''_{12}x + f''_{21}y + f''_{22}xy + f'_2$ 。

又 $f(u, v)$ 具有两阶连续偏导数, 所以 $f''_{12} = f''_{21}$ 。

即 $= e^{xy} + xye^{xy} + f''_{11} + (x+y)f''_{12} + xyf''_{22} + f'_2$ 。

1.2 复合函数

函数以复合函数形式 $f(g(x, y))$ 出现, 函数的变量是一个整体。

1.2.1 链式法则

若是给出相应的不等式可以通过链式法则求出对应的表达式。

例题: 设 $u = u(\sqrt{x^2 + y^2})$ ($r = \sqrt{x^2 + y^2} > 0$) 有二阶连续的偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \frac{1}{x} \frac{\partial u}{\partial x} + u = x^2 + y^2$, 则求 $u(\sqrt{x^2 + y^2})$ 。

解: 这个函数是复合函数 $u = u(r)$ 和 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 而成。根据复合函数求导法则:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{du}{dr} \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{du}{dr} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{du}{dr} \cdot \frac{x}{r}, \quad \frac{1}{x} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{r} \cdot \frac{du}{dr} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{du}{dr} \cdot \frac{x}{r} \right) = \frac{x}{r} \cdot \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{du}{dr} \right) + \frac{du}{dr} \cdot \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{r} \right) = \frac{x}{r} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{du}{dr} \right) \frac{\partial r}{\partial x} + \frac{du}{dr} \cdot \frac{r - x \cdot (\partial r / \partial x)}{r^2} \\ &= \frac{x^2}{r^2} \cdot \frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{du}{dr} \cdot \frac{r^2 - x^2}{r^3} \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{du}{dr} \cdot \frac{y}{r} \right) = \frac{y}{r} \cdot \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{du}{dr} \right) + \frac{du}{dr} \cdot \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{r} \right) = \frac{y}{r} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{du}{dr} \right) \frac{\partial r}{\partial y} + \frac{du}{dr} \cdot \frac{r^2 - y^2}{r^3} \\ &= \frac{y^2}{r^2} \cdot \frac{d^2 u}{dr^2} + \frac{du}{dr} \cdot \frac{r^2 - y^2}{r^3}\end{aligned}$$

代入不等式: $\frac{x^2+y^2}{r^2} \cdot \frac{du^2}{dr^2} + \frac{du}{dr} \cdot \frac{2r^2-x^2-y^2}{r^3} - \frac{1}{r} \cdot \frac{du}{dr} + u = x^2+y^2$ 。

代入 $x^2+y^2=r^2$: $\frac{d^2u}{dr^2} + u = r^2$, 为二阶线性常系数微分方程。

通解为 $u = C_1 \cos r + C_2 \sin r + r^2 - 2$ 。

即 $u(\sqrt{x^2+y^2}) = C_1 \cos \sqrt{x^2+y^2} + C_2 \sin \sqrt{x^2+y^2} + x^2+y^2 - 2$ 。

1.2.2 特殊值反代

若是给出的不等式后还给出对应的特殊值, 可以直接代入然后反代求出函数, 而不用链式法则。

例题: 设 $z = e^x + y^2 + f(x+y)$, 且当 $y=0$ 时, $z = x^3$, 则求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 。

解: 已知 $y=0$ 时, $z = e^x + f(x) = x^3$, $\therefore f(x) = x^3 - e^x$, $f(x+y) = (x+y)^3 - e^{x+y}$, $z = e^x + y^2 + (x+y)^3 - e^{x+y}$ 。

$\therefore \frac{\partial z}{\partial x} = e^x + 3(x+y)^2 - e^{x+y}$ 。

1.3 积分与微分

1.3.1 积分到微分

可能一个函数是积分的形式, 又包含多个变量, 要求其多元微分值。

$\frac{d}{dx} \int_{a(x)}^{b(x)} f(t) dt = b'(x)f[b(x)] - a'(x)f[a(x)]$ 。

例题: 设 $z = \int_0^1 |xy-t|f(t) dt$, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, 其中 $f(x)$ 为连续函数, 求 $z''_{xx} + z''_{yy}$ 。

解: 首先因为 z 是一个绝对值的形式, 所以根据积分的性质可以拆开积分区间去掉绝对值: $z = \int_0^{xy} (xy-t)f(t) dt + \int_{xy}^1 (t-xy)f(t) dt = xy \int_0^{xy} f(t) dt - \int_0^{xy} tf(t) dt + \int_{xy}^1 tf(t) dt - xy \int_{xy}^1 f(t) dt$ 。

$z'_x = y \int_0^{xy} f(t) dt + xy^2 f(xy) - xy^2 f(xy) - xy^2 f(xy) - y \int_{xy}^1 f(t) dt + xy^2 f(xy) = y \int_0^{xy} f(t) dt - y \int_{xy}^1 f(t) dt$ 。

$z''_{xx} = y^2 f(xy) + y^2 f(xy) = 2y^2 f(xy)$, 同理根据变量对称性 $z''_{yy} = 2x^2 f(xy)$, $z''_{xx} + z''_{yy} = 2(x^2 + y^2)f(xy)$ 。

1.3.2 微分到积分

注意多元函数进行积分的适合多出来的常数 C 不再是常数, 而是与积分变量相关的 $C(x)$, $C(y)$, 因为对其中一个变量积分时, 另一个变量是看作常数的。

例题： 设 $z = f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = x + y$ ，且 $f(x, 0) = x$ ， $f(0, y) = y^2$ ，求 $f(x, y)$ 。

解：

2 多元函数微分应用

2.1 空间曲线的切线与法平面

2.1.1 参数方程

设空间曲线 Γ 由参数方程 $\begin{cases} x = \phi(t) \\ y = \psi(t) \\ z = \omega(t) \end{cases}$ 给出，其中 $\phi(t), \psi(t), \omega(t)$ 均可导，

$P_0(x_0, y_0, z_0)$ 为 Ω 上的点，且当 $t = t_0$ 时， $\phi'(t_0), \psi'(t_0), \omega'(t_0)$ 均不为 0，则：

- 曲线 Γ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切向量为 $\vec{\tau} = (\phi'(t_0), \psi'(t_0), \omega'(t_0))$ 。
- 曲线 Γ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切线方程为 $\frac{x - x_0}{\phi'(t_0)} = \frac{y - y_0}{\psi'(t_0)} = \frac{z - z_0}{\omega'(t_0)}$ 。
- 曲线 Γ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的法平面（过 P_0 且与切线垂直的平面）方程为 $\phi'(t_0)(x - x_0) + \psi'(t_0)(y - y_0) + \omega'(t_0)(z - z_0) = 0$ 。

2.1.2 交面式方程

设空间曲线 Γ 由交面方程 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 给出，则：

- 曲线 Γ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切向量为

$$\vec{\tau} = \left(\begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix}_{P_0}, \begin{vmatrix} F'_z & F'_x \\ G'_z & G'_x \end{vmatrix}_{P_0}, \begin{vmatrix} F'_x & F'_y \\ G'_x & G'_y \end{vmatrix}_{P_0} \right)。$$

- 曲线 Γ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切线方程为

$$\frac{x - x_0}{\begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix}_{P_0}}, \frac{y - y_0}{\begin{vmatrix} F'_z & F'_x \\ G'_z & G'_x \end{vmatrix}_{P_0}}, \frac{z - z_0}{\begin{vmatrix} F'_x & F'_y \\ G'_x & G'_y \end{vmatrix}_{P_0}}。$$

- 曲线 Γ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的法平面方程为

$$\begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix}_{P_0} (x - x_0) + \begin{vmatrix} F'_z & F'_x \\ G'_z & G'_x \end{vmatrix}_{P_0} (y - y_0) + \begin{vmatrix} F'_x & F'_y \\ G'_x & G'_y \end{vmatrix}_{P_0} (z - z_0) = 0。$$

2.2 空间曲面的切平面与法线

2.2.1 隐式

设空间曲面 Σ 由方程 $F(x, y, z) = 0$ 给出, $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是 Σ 上的点, 则:

- 曲面 Σ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的法向量为 $\vec{n} = (F'_x(x_0, y_0, z_0), F'_y(x_0, y_0, z_0), F'_z(x_0, y_0, z_0))$ 且法线方程为 $\frac{x - x_0}{F'_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y - y_0}{F'_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{F'_z(x_0, y_0, z_0)}$ 。
- 曲面 Σ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面方程为 $F'_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F'_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F'_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0$ 。

2.2.2 显式

设空间曲面 Σ 由方程 $z = f(x, y)$ 给出, 令 $F(x, y, z) = f(x, y) - z$, 假定法向量的方向向下, 即其余 z 轴正向所成的角为钝角, 即 z 为-1, 则:

- 曲面 Σ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的法向量为 $\vec{n} = (f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0), -1)$, 且法线方程为 $\frac{x - x_0}{f'_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{f'_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{-1}$ 。
- 曲面 Σ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面方程为 $f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0$ 。

若是反之成锐角, 则将里面所有的-1 都换成 1。

若用 α, β, γ 表示曲面 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 处的法向量的方向角, 并这里假定法向量的方向是向上的, 即其余 z 轴正向所成的角 γ 为锐角, 则法向量方向余弦为 $\cos \alpha = \frac{-f'_x}{\sqrt{1 + f_x'^2 + f_y'^2}}, \cos \beta = \frac{-f'_y}{\sqrt{1 + f_x'^2 + f_y'^2}}, \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 + f_x'^2 + f_y'^2}}$, 其中 $f_x = f'_x(x_0, y_0), f_y = f'_y(x_0, y_0)$ 。

例题: 设直线 $L \begin{cases} x + y + b = 0 \\ x + ay - z - 3 = 0 \end{cases}$ 在平面 π 上, 而平面 π 与曲面 $z = x^2 + y^2$ 相切于 $(1, -2, 5)$, 求 ab 的值。

解: L 在 π 上且与曲面相切, 则 π 为 L 的切平面。设曲面方程 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z$ 。

曲面法向量为 $\vec{n} = \{F'_x, F'_y, F'_z\} = \{2x, 2y, -1\}$, 代入 $(1, -2, 5)$, 则法向量为 $\{2, -4, -1\}$ 。

又点法式: $\pi: 2(x - 1) - 4(y + 2) - (z - 5) = 0$, 即 $2x - 4y - z - 5 = 0$ 。

联立直线方程, 得到: $(5 + a)x + 4b + ab - 2 = 0$, 又 x 是任意的。

解得 $a = -5, b = -2$ 。