

# 极限

Didneipsun

## 目录

<b>1</b>	<b>极限类型</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>常用化简运算</b>	<b>1</b>
2.1	对数法则 . . . . .	1
2.2	指数法则 . . . . .	1
2.3	三角函数关系式 . . . . .	2
2.4	提取常数因子 . . . . .	3
2.5	提取公因子 . . . . .	3
2.6	幂指函数 . . . . .	4
2.7	有理化 . . . . .	4
2.8	换元法 . . . . .	5
2.9	倒代换 . . . . .	6
2.9.1	含有分式 . . . . .	6
2.9.2	$\infty - \infty$ 型 . . . . .	7
2.10	拆项 . . . . .	7
<b>3</b>	<b>基本计算方式</b>	<b>8</b>
3.1	基础四则运算 . . . . .	8
3.2	重要极限 . . . . .	8
3.3	导数定义 . . . . .	9
3.4	等价无穷小替换 . . . . .	9
3.5	夹逼准则 . . . . .	9
3.6	拉格朗日中值定理 . . . . .	9
3.7	洛必达法则 . . . . .	10

3.8	泰勒公式 . . . . .	10
<b>4</b>	<b>极限计算形式</b>	<b>11</b>
4.1	极限转换 . . . . .	11
4.1.1	整体换元 . . . . .	11
4.1.2	关系转换 . . . . .	12
4.1.3	脱帽法 . . . . .	12
4.2	求参数 . . . . .	12
4.3	极限存在性 . . . . .	13
4.4	极限唯一性 . . . . .	14
4.5	函数连续性 . . . . .	14
4.6	迭代式数列 . . . . .	15
4.6.1	数列表表达式 . . . . .	15
4.6.2	单调有界准则 . . . . .	16
4.7	变限积分极限 . . . . .	17

# 1 极限类型

七种:  $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty, \infty^0, 0^0, 1^\infty$ 。

①其中  $\frac{0}{0}$  为洛必达法则的基本型。 $\frac{\infty}{\infty}$  可以类比  $\frac{0}{0}$  的处理方式。 $0 \cdot \infty$  可以转为  $\frac{0}{\frac{1}{\infty}} = \frac{0}{0} = \frac{\infty}{\frac{1}{0}} = \frac{\infty}{\infty}$ 。设置分母有原则，简单因式才下放（简单：幂函数，e 为底的指数函数）。

② $\infty - \infty$  可以提取公因式或通分，即和差化积。

③ $\infty^0, 0^0, 1^\infty$ ，就是幂指函数。

$$u^v = e^{v \ln u} = \begin{cases} \infty^0 & \rightarrow e^{0+\infty} \\ 0^0 & \rightarrow e^{0-\infty} \\ 1^\infty & \rightarrow e^{\infty \cdot 0} \end{cases}$$

$$\therefore \lim u^v = e^{\lim v \cdot \ln u} = e^{\lim v(u-1)}$$

综上，无论什么样的四则形式，都必须最后转换为商的形式。

## 2 常用化简运算

### 2.1 对数法则

例题：求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{x^2} - 1)(\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x})}{[\ln(1-x) + \ln(1+x)] \sin \frac{x}{x+1}}$ 。

注意在积或商的时候不能把对应的部分替换为 0，如分母部分的  $[\ln(1-x) + \ln(1+x)]$  就无法使用  $\ln(1+x) \sim x$  替换为  $-x+x$ ，这样底就是 0 了，无法求得最后的极限。

这时可以尝试变形，如对数函数相加等于对数函数内部式子相乘： $\ln(1-x) + \ln(1+x) = \ln(1-x^2) \sim -x^2$ 。

### 2.2 指数法则

一般需要与洛必达法则配合使用。

例题：求  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right)^{\frac{1}{x}} (a > 0, b > 0, c > 0)$ 。

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln\left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3}\right)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(a^x + b^x + c^x) - \ln 3}{x} \end{aligned}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x \ln a + b^x \ln b + c^x \ln c}{a^x + b^x + c^x} \quad (\text{洛必达法则})$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln a + \ln b + \ln c}{1+1+1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(abc)}{3} = \sqrt[3]{abc}.$$

**例题：** 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\frac{n}{2}} - \sqrt{e} \right]$ 。

首先对于幂指数函数需要取指数，所以  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\frac{n}{2}} = e^{\frac{n}{2} \ln(1 + \frac{1}{n})}$ 。

而后面的多一个  $\sqrt{e}$  导致整个式子变为一个复杂的式子，而与  $e^x$  相关的是  $e^x - 1 \sim x$ 。

$$\text{所以 } e^{\frac{n}{2} \ln(1 + \frac{1}{n})} - \sqrt{e} = e^{\frac{1}{2}} \cdot \left( e^{\frac{n}{2} \ln(1 + \frac{1}{n}) - \frac{1}{2}} - 1 \right) = e^{\frac{1}{2}} \cdot \left[ \frac{n}{2} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{2} \right].$$

综上：

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\frac{n}{2}} - \sqrt{e} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left( e^{\frac{n}{2} \ln(1 + \frac{1}{n})} - \sqrt{e} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[ e^{\frac{1}{2}} \cdot \left( e^{\frac{n}{2} \ln(1 + \frac{1}{n}) - \frac{1}{2}} - 1 \right) \right] \\ &= \frac{e^{\frac{1}{2}}}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[ \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n} \right] \\ &= \frac{e^{\frac{1}{2}}}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2}} \\ &= \frac{e^{\frac{1}{2}}}{2} \cdot \left( -\frac{1}{2} \right) \\ &= -\frac{\sqrt{e}}{4} \end{aligned}$$

## 2.3 三角函数关系式

**例题：** 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{\cos^2 x}{x^2} \right)$ 。

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{\cos^2 x}{x^2} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \sin^2 x \cos^2 x}{\sin^2 x \cdot x^2} (\sin x \sim x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \sin^2 x \cos^2 x}{x^4} (\sin x \cos x \sim \frac{1}{2} \sin 2x) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \frac{1}{4} \sin^2 2x}{x^4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - \frac{1}{4} \cdot 2 \sin 2x \cdot \cos 2x \cdot 2}{4x^3} (\sin x \cos x \sim \frac{1}{2} \sin 2x) \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - \frac{1}{2} \sin 4x}{4x^3} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - \frac{1}{2} \cos 4x \cdot 4}{12x^2} \\
&= \frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 4x}{x^2} (1 - \cos x \sim \frac{1}{2} x^2) \\
&= \frac{4}{3}
\end{aligned}$$

## 2.4 提取常数因子

提取常数因子就是提取出能转换为常数的整个极限式子的因子。这个因子必然在自变量的趋向时会变为非 0 的常数，那么这个式子就可以作为常数提出。

## 2.5 提取公因子

当作为商的极限式子上下都具有公因子时可以提取公因子然后相除，从而让未知数集中在分子或分母上。

**例题：**求  $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 6x + 8}{x^5 - 5x + 4}$ 。

需要先提取公因子：

$$= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-2)(x-4)}{(x-1)(x-4)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x-2}{x-1} = \frac{2}{3}。$$

(当然可以使用洛必达法则得到极限为  $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{2x-6}{2x-5} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{8-6}{8-5}$ )

**注意：**提取公因子的时候应该注意开平方等情况下符号的问题。如果极限涉及倒正负两边则必须都讨论。

当趋向为负且式子中含有根号的时候最好提取负因子，从而让趋向变为正。

**例题：**求  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left[ \sqrt{4x^2 + x} \ln \left( 2 + \frac{1}{x} \right) + 2 \ln 2x \right]$ 。

题目的形式为  $\infty - \infty$ ，所以必须使用后面的倒代换转换为商的形式。

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} -x \left[ \sqrt{4 + \frac{1}{x}} \ln \left( 2 + \frac{1}{x} \right) - 2 \ln 2 \right]。$$

这里就需要注意到因为  $\sqrt{4x^2 + x}$  的限制导致这个式子必然为正数，而  $x \rightarrow -\infty$  代表自变量为负数，所以提出来的  $x$  必然是负数，而原式是正数，所以就需添加一个负号，而后面的  $2 \ln 2x$  则没有要求，所以直接变成  $-2 \ln 2$  就可以了。

将  $x$  下翻变成分母为  $\frac{1}{x}$ , 并令  $t = \frac{1}{x}$ 。

$$= \lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{t+4} \ln \left( 2 + \frac{1}{x} \right) - 2 \ln 2}{-t}。$$

幂次不高可以尝试洛必达:

$$\begin{aligned} &= \lim_{t \rightarrow 0^-} \left( \frac{1}{2} \cdot \frac{\ln(2+t)}{\sqrt{t+4}} + \frac{\sqrt{t+4}}{2+t} \right) \\ &= - \left( \frac{1}{2} \cdot \frac{\ln 2}{2} + \frac{2}{2} \right) = -\frac{\ln 2}{4} - 1。 \end{aligned}$$

## 2.6 幂指数函数

当出现  $f(x)^{g(x)}$  的类似幂函数与指数函数类型的式子, 需要使用  $u^v = e^{v \ln u}$ 。

**例题:** 求极限  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{x}}$ 。

$$\begin{aligned} &\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{x}} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{x}} \left( \ln(x + \sqrt{1+x^2})' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right) \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}} \\ &= e^0 \\ &= 1 \end{aligned}$$

## 2.7 有理化

当遇到带有根号的式子可以使用等价无穷小, 但是只针对形似  $(1+x)^a - 1 \sim ax$  的式子, 而针对  $x^a \pm x^b$  的式子则无法替换, 必须使用有理化来将单个式子变为商的形式。

$$\text{如 } \sqrt{a} \pm \sqrt{b} = \frac{a+b}{\sqrt{a} \mp \sqrt{b}}。$$

**例题:** 求极限  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x(\sqrt{x^2+100}+x)$ 。

首先定性分析:  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x \cdot (\sqrt{x^2+100}+x)$ 。

在  $x \rightarrow -\infty$  趋向时,  $x$  就趋向无穷大。

而  $\sqrt{x^2+100}$  为一次, 所以  $\sqrt{x^2+100}+x$  趋向 0。

又  $\sqrt{x^2+100}$  在  $x \rightarrow -\infty$  时本质为根号差, 所以有理化:

$$\begin{aligned} &\lim_{x \rightarrow -\infty} x(\sqrt{x^2+100}+x) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} x \frac{x^2+100-x^2}{\sqrt{x^2+100}-x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{100x}{\sqrt{x^2 + 100} - x} \\
&\xrightarrow{\text{令 } x = -t} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{-100t}{\sqrt{t^2 + 100} + t} \\
&= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{-100}{\sqrt{1 + \frac{100}{t^2}} + 1} \\
&= -50
\end{aligned}$$

**例题：** 求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 + \sin x}}{x\sqrt{1 + \sin^2 x} - x}$ 。

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 + \sin x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x\sqrt{1 + \sin^2 x} - x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sqrt{1 + \tan x} + \sqrt{1 + \sin x}} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x\sqrt{1 + \sin^2 x} + x}{x^2(1 + \sin^2 x) - x^2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sqrt{1 + \tan x} + \sqrt{1 + \sin x}} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \sin^2 x} + 1}{x \sin^2 x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x \sin^2 x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x \sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \cos x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2} = \frac{1}{2}。
\end{aligned}$$

## 2.8 换元法

换元法本身没什么技巧性，主要是更方便计算。最重要的是获取到共有的最大因子进行替换。

**例题：** 求极限  $\lim_{x \rightarrow 1^-} \ln x \ln(1 - x)$ 。

当  $x \rightarrow 1^-$  时， $\ln x$  趋向 0， $\ln(1 - x)$  趋向  $-\infty$ 。

又  $x \rightarrow 0$ ， $\ln(1 + x) \sim x$ ，所以  $x \rightarrow 1$ ， $\ln x \sim x - 1$ ：

$$\begin{aligned}
&\lim_{x \rightarrow 1^-} \ln x \ln(1 - x) \\
&= \lim_{x \rightarrow 1^-} (x - 1) \ln(1 - x) \\
&\xrightarrow{t = 1 - x} = - \lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln t \\
&= - \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln t}{\frac{1}{t}} \\
&= - \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{t}}{-\frac{1}{t^2}} \\
&= \lim_{t \rightarrow 0^+} t \\
&= 0
\end{aligned}$$

## 2.9 倒代换

### 2.9.1 含有分式

当极限式子中含有分式中一般都需要用其倒数，把分式换成整式方便计算。

**例题：**求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{100}}$

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{100}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}} \cdot 2x^{-3}}{100x^{99}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{50} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{102}} \end{aligned}$$

使用洛必达法则下更复杂，因为分子的幂次为负数，导致求导后幂次绝对值越来越大，不容易计算。

使用倒代换再洛必达降低幂次，令  $t = \frac{1}{x^2}$

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{100}} \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^{-t}}{t^{50}} \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^{50}}{e^t} \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{50t^{49}}{e^t} \\ &= \dots \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{50!}{e^t} \\ &= 0 \end{aligned}$$

**例题：**求极限  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [x^2(e^{\frac{1}{x}} - 1) - x]$ 。

该式子含有分数，所以尝试使用倒数代换：

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow +\infty} [x^2(e^{\frac{1}{x}} - 1) - x] \\ & \xrightarrow{\text{令 } x=\frac{1}{t}} \lim_{t \rightarrow 0^+} \left( \frac{e^t - 1}{t^2} - \frac{1}{t} \right) \\ & \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^t - 1 - t}{t^2} \\ & \xrightarrow{\text{泰勒展开 } e^t} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}t^2}{t^2} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$



## 2.9.2 $\infty - \infty$ 型

## 2.10 拆项

拆项需要根据式子形式进行, 所以很难找到普遍规律。

**例题:** 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(n+2)(n+3) \cdots (n+6)}{6n^6}$ 。

需要将分子和分母都拆为 6 项:

$$= \frac{1}{6} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} \times \frac{n+2}{n} \times \cdots \times \frac{n+6}{n} = \frac{1}{6} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{6}{n}\right) = \frac{1}{6}。$$

当极限式子中出现不知道项数的  $n$  时, 一般需要使用拆项, 把项重新组合。

一般的组合是根据等价无穷小。

而对于复杂的具有同一结构的式子也可以考虑拆项。

**例题:** 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{e}{x}}$ 。 ( $n \in N^+$ )

这里可以使用等价无穷小  $e^x - 1 \sim x$ 。

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{e}{x}} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e}{x} \ln \left( \frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e}{x} \left( \frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} - 1 \right)} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e}{x} \left( \frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx} - n}{n} \right)} \\ &= e^{\frac{e}{n} \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{e^x - 1}{x} + \frac{e^{2x} - 1}{x} + \cdots + \frac{e^{nx} - 1}{x} \right)} \\ &= e^{\frac{e}{n} [1 + 2 + \cdots + n]} \\ &= e^{\frac{e}{n} \cdot \frac{n(1+n)}{2}} \\ &= e^{\frac{e(1+n)}{2}} \end{aligned}$$

**例题:** 求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \sqrt{\cos 2x} \sqrt[3]{\cos 3x}}{\ln \cos x}$

可以使用  $\cos x - 1 \sim -\frac{x^2}{2}$ 。

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \sqrt{\cos 2x} \sqrt[3]{\cos 3x}}{\ln \cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x + \cos x - \cos x \sqrt{\cos 2x} \sqrt[3]{\cos 3x}}{-\frac{x^2}{2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2}}{-\frac{x^2}{2}} + \frac{\cos x (1 - \sqrt{\cos 2x} \sqrt[3]{\cos 3x})}{-\frac{x^2}{2}} \\ &= -1 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \sqrt{\cos 2x}) + \sqrt{\cos 2x} - \sqrt{\cos 2x} \sqrt[3]{\cos 3x}}{-\frac{x^2}{2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -1 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}(\cos 2x - 1) + \sqrt{\cos 2x}(1 - \sqrt[3]{\cos 3x})}{-\frac{x^2}{2}} \\
&= -1 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}\left(-\frac{4x^2}{2}\right) + \left(-\frac{1}{3}\right)^2\left(-\frac{9x^2}{2}\right)}{-\frac{x^2}{2}} \\
&= -6
\end{aligned}$$

### 3 基本计算方式

课本上极限计算可以使用的主要计算方式：

#### 3.1 基础四则运算

只有式子的极限各自存在才能使用四则运算，使用的频率较少。

#### 3.2 重要极限

重要极限有两个，但是  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$  这个很少用，因为往往用等价无穷小替代了，而  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$  则用的较多，当出现分数幂的幂指函数时，不要先去取对数，而是使用重要极限看看能不能转换。

$$\begin{aligned}
&\text{例题：求 } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3+x}{6+x}\right)^{\frac{x-1}{2}}。 \\
&= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{3}{6+x}\right)^{\frac{6+x}{-3} \cdot \frac{-3}{6+x} \cdot \frac{x-1}{2}} \\
&= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{-3}{6+x} \cdot \frac{x-1}{2}} \\
&= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-\frac{3}{2} \cdot \frac{x-1}{x+6}} \\
&= e^{-\frac{3}{2}}。
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\text{例题：求 } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+3}{2x+1}\right)^{x+1}。 \\
&= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+3}{2x+1}\right)^x \cdot \frac{2x+3}{2x+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+3}{2x+1}\right)^x \\
&= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1+\frac{3}{2x}}{1+\frac{1}{2x}}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(1+\frac{3}{2x}\right)^x}{\left(1+\frac{1}{2x}\right)^x}
\end{aligned}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left[ \left( 1 + \frac{3}{2x} \right)^{\frac{2x}{3}} \right]^{\frac{3}{2}}}{\left[ \left( 1 + \frac{1}{2x} \right)^{2x} \right]^{\frac{1}{2}}} = \frac{e^{\frac{3}{2}}}{e^{\frac{1}{2}}} = e。$$

### 3.3 导数定义

极限转换以及连续性的时候会用到，但是使用的频率也较小。

### 3.4 等价无穷小替换

当看到复杂的式子，且不论要求的极限值的趋向，而只要替换的式子是  $\Delta \rightarrow 0$  时的无穷小，就使用等价无穷小进行替换。

**注意：**替换的必然是整个求极限的乘或除的因子，一般加减法与部分的因子不能进行等价无穷小替换。

对于无法直接得出变换式子的，可以对对应参数进行凑，以达到目标的可替换的等价无穷小。

### 3.5 夹逼准则

夹逼准则可以用来证明不等式也可以用来计算极限。但是最重要的是找到能夹住目标式子的两个式子。

**例题：**求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} x \left[ \frac{10}{x} \right]$ ，其中  $[\cdot]$  为取整符号。

取整函数公式： $x - 1 < [x] \leq x$ ，所以  $\frac{10}{x} - 1 < \left[ \frac{10}{x} \right] \leq \frac{10}{x}$ 。

当  $x > 0$  时， $x \rightarrow 0^+$ ，两边都乘以 10， $10 - x < x \cdot \left[ \frac{10}{x} \right] \leq x \cdot \frac{10}{x} = 10$ ，而左边在  $x \rightarrow 0^+$  时极限也为 10，所以夹逼准则，中间  $x \cdot \left[ \frac{10}{x} \right]$  极限也为 10。

当  $x > 0$  时， $x \rightarrow 0^-$ ，同样也是夹逼准则得到极限为 10。

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} x \left[ \frac{10}{x} \right] = 10。$$

### 3.6 拉格朗日中值定理

对于形如  $f(a) - f(b)$  的极限式子就可以使用拉格朗日中值定理，这个  $f(x)$  为任意的函数。

**例题：**求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left( \arctan \frac{2}{n} - \arctan \frac{2}{n+1} \right)$ 。

因为式子不算非常复杂，其实也可以通过洛必达法则来完成，但是求导会很复杂。而  $\arctan x$  可以认定为  $f(x)$ 。

从而  $\arctan \frac{2}{n} - \arctan \frac{2}{n+1}$  为  $f\left(\frac{2}{n}\right) - f\left(\frac{2}{n+1}\right) = f'(\xi) \left( \frac{2}{n} - \frac{2}{n+1} \right)$ 。

其中  $\frac{2}{n+1} < \xi < \frac{2}{n}$ ，而当  $n \rightarrow \infty$  时， $f'(\xi) = \frac{1}{1+\xi^2} \rightarrow 1$ 。

$\therefore \arctan \frac{2}{n} - \arctan \frac{2}{n+1} \sim \frac{2}{n} - \frac{2}{n+1} = \frac{2}{n(n+1)}$ 。

$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left( \arctan \frac{2}{n} - \arctan \frac{2}{n+1} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \cdot \frac{2}{n(n+1)} = 2$ 。

### 3.7 洛必达法则

洛必达法则的本质是降低商形式的极限式子的幂次。

洛必达在处理一般的极限式子比较好用，但是一旦式子比较复杂最好不要使用洛必达法则，最好是对求导后有规律或幂次较低的式子进行上下求导。

对于幂次高的式子必然使用洛必达法则。

洛必达法则必须使用在分式都趋向 0 或  $\infty$  时，如果不是这样的趋向则不能使用。如：

**例题：**求  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - x + 1}{(x-1)^2}$ 。

如果使用洛必达法则，则会得到结果为 1，这是错误的，因为分子在  $x \rightarrow 1$  时结果为常数 1。正确的计算方式：

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x-1)^2} = \infty。$$

### 3.8 泰勒公式

泰勒公式一般会使用趋向 0 的麦克劳林公式，且一般只作为极限计算的一个小部分，用来替代一个部分。

且一般只有麦克劳林公式表上的基本初等函数才会使用倒泰勒公式，复合函数最好不要使用。

**例题：**求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - \arctan x}{\sin x - \tan x}$ 。

分析：该题目使用洛必达法则会比较麻烦且难以计算，所以先考虑是否能用泰勒展开：

$$x \rightarrow 0, \sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3), \tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3), \arcsin x = x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3), \arctan x = x - \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)。$$

$$\begin{aligned}\therefore \sin x - \tan x &= -\frac{1}{2}x^3 + o(x^3), \quad \arcsin x - \arctan x = \frac{1}{2}x^3 + o(x^3) \\ \therefore \text{原式} &= \frac{\frac{1}{2}x^3 + o(x^3)}{-\frac{1}{2}x^3 + o(x^3)} = -1.\end{aligned}$$

## 4 极限计算形式

极限相关计算形式主要分为下面六种：

1. 未定式：直接根据式子计算极限值。
2. 极限转换：根据已知的极限值计算目标极限值。
3. 求参数：已知式子的极限值，计算式子中未知的参数。
4. 极限存在性：根据式子以及极限存在性计算极限或参数。
5. 极限唯一性：式子包含参数，根据唯一性计算两侧极限并求出参数与极限值。
6. 函数连续性：根据连续性与附加条件计算极限值或参数。
7. 迭代式数列：根据数列迭代式计算极限值。
8. 变限积分：根据变限积分计算极限值。

### 4.1 极限转换

#### 4.1.1 整体换元

最常用的方式就是将目标值作为一个部分，然后对已知的式子进行替换。

**例题：**已知  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-x) + xf(x)}{x^2} = 0$ ，求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x}$ 。

令目标  $\frac{f(x) - 1}{x} = t$ ， $\therefore f(x) = tx + 1$ 。

$$\begin{aligned}& \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-x) + xf(x)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-x) + tx^2 + x}{x^2} \text{ (泰勒展开)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x - \frac{x^2}{2} + tx^2 + x}{x^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(t - \frac{1}{2}\right) x^2}{x^2} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \left(t - \frac{1}{2}\right) \\
&= 0 \\
\therefore \lim_{x \rightarrow 0} t &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x} = \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

### 4.1.2 关系转换

**例题：**如果  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x + f(x)}{x^4}$  存在，则  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{f(x)}$  为常数多少？

由  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x + f(x)}{x^4} = A$ ，而目标是  $x^3$ ，所以需要变形：

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x + f(x)}{x^4} &= A \\
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x + f(x) \cdot x}{x^4} &= A \cdot \lim_{x \rightarrow 0} x = 0
\end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = 0$$

$$\text{泰勒展开： } x - \sin x = \frac{1}{6}x^3$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = -\frac{1}{6}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{f(x)} = -6$$

### 4.1.3 脱帽法

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \Leftrightarrow f(x) = A + \alpha(x), \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0.$$

**例题：**如果  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x + f(x)}{x^4}$  存在，则  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{f(x)}$  为常数多少？

$$\text{由 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x + f(x)}{x^4} = A \text{ 脱帽： } \frac{x \sin x + f(x)}{x^4} = A + \alpha.$$

$$\text{得到： } f(x) = Ax^4 + \alpha \cdot x^4 - (x - \sin x).$$

$$\text{反代入： } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{Ax^4 + \alpha \cdot x^4 - x + \sin x}{x^3} = 0 + 0 - \frac{1}{6} = -\frac{1}{6}.$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{f(x)} = -6.$$

## 4.2 求参数

因为求参数类型的题目中式子是未知的，所以求导后也是未知的，所以一般不要使用洛必达法则，而使用泰勒展开。

一般极限式子右侧等于一个常数，或是表明高阶或低阶。具体的关系参考无穷小比阶。

在求参数的时候要注意与 0 的关系。

**例题：** 设  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - (ax + bx^2)}{x^2} = 2$ ，求常数 a, b。

根据泰勒展开式： $x \rightarrow 0, \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ ， $x - \ln(1+x) \sim \frac{1}{2}x^2 \sim 1 - \cos x$ 。

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - (ax + bx^2)}{x^2} &= 2 \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-a)x - \left(\frac{1}{2} + b\right)x^2 + o(x^2)}{x^2} = 2 \neq 0 \\ 1-a &= 0; -\left(\frac{1}{2} + b\right) = 2 \\ \therefore a &= 1; b = -\frac{5}{2}. \end{aligned}$$

### 4.3 极限存在性

一般会给出带有参数的例子，并给定一个点指明在该点极限存在，求参数。

若该点极限存在，则该点两侧的极限都相等。

**例题：** 设函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x(b \cos x - 1)}{e^x + a}, & x > 0 \\ \frac{\sin x}{\ln(1+3x)}, & x < 0 \end{cases}$  在  $x = 0$  处极限存在，

则 a, b 分别为。

解：首先根据极限在  $x = 0$  存在，且极限的唯一性。分段函数在 0 两侧的极限值必然相等。

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{\ln(1+3x)} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{3x} = \frac{1}{3} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x(b \cos x - 1)}{e^x + a}.$$

又  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x(b \cos x - 1)}{e^x + a}$  的分母的  $e^x$  当  $x \rightarrow 0^+$  时  $e^x \rightarrow 1$ ，假如  $a \neq -1$ ，则  $e^x + a \neq 0$ ，则为一个常数。

从而提取常数因子： $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x(b \cos x - 1)}{e^x + a} = \frac{1}{1+a} \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x(b \cos x - 1)$ ，这时候  $\sin x$  是趋向 0 的，而  $b \cos x - 1$  无论其中的  $b$  为何值都是趋向一个常数或 0，这时候他们的乘积必然为无穷小，从而无法等于  $\frac{1}{3}$  这个常数。

$\therefore a = -1$ ，从而让极限式子变为一个商的形式：

$$\begin{aligned} &\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x(b \cos x - 1)}{e^x + a} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x(b \cos x - 1)}{e^x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x(b \cos x - 1)}{x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0^+} b \cos x - 1 \\
&= b - 1 = \frac{1}{3} \\
\therefore a &= -1, b = \frac{4}{3}.
\end{aligned}$$

#### 4.4 极限唯一性

若极限存在则必然唯一。

**例题：** 设  $a$  为常数， $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{e^{\frac{1}{x}} - \pi}{e^{\frac{2}{x}} + 1} + a \cdot \arctan \frac{1}{x} \right)$  存在，求出极限值。

因为求  $x \rightarrow 0$ ，所以需要分两种情况讨论：

$$\begin{aligned}
&\lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \frac{e^{\frac{1}{x}} - \pi}{e^{\frac{2}{x}} + 1} + a \cdot \arctan \frac{1}{x} \right) \\
&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \frac{e^{\frac{1}{x}} - \pi}{e^{\frac{2}{x}} + 1} \right) + \lim_{x \rightarrow 0^+} \left( a \cdot \arctan \frac{1}{x} \right) \\
&= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \frac{0 \cdot \left( e^{\frac{2}{x}} \right)^2 + e^{\frac{1}{x}} - \pi}{1 \cdot \left( e^{\frac{2}{x}} \right)^2 + 1} \right) + a \cdot \frac{\pi}{2} \\
&= a \cdot \frac{\pi}{2} \\
&\lim_{x \rightarrow 0^-} \left( \frac{e^{\frac{1}{x}} - \pi}{e^{\frac{2}{x}} + 1} + a \cdot \arctan \frac{1}{x} \right) \\
&= -\pi + a \cdot \left( -\frac{\pi}{2} \right) \\
&= -\pi - \frac{\pi}{2} \cdot a
\end{aligned}$$

因为极限值具有唯一性，所以  $-\pi - \frac{\pi}{2}a = \frac{\pi}{2}a$ ，所以  $a = -1$ ，极限值为  $-\frac{\pi}{2}$ 。

#### 4.5 函数连续性

函数的连续性代表：极限值 = 函数值。

**例题：** 函数在  $f(x)$  在  $x = 1$  处连续，且  $f(1) = 1$ ，求  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left[ 2 + f \left( x^{\frac{1}{x}} \right) \right]$ 。

根据题目，所求的  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left[ 2 + f \left( x^{\frac{1}{x}} \right) \right]$  中，唯一未知的且会随着  $x \rightarrow +\infty$  而变换就是  $f \left( x^{\frac{1}{x}} \right)$ 。如果我们可以求出这个值就可以了。

而我们对于  $f(x)$  的具体的关系是未知的，只知道  $f(1) = 1$ 。那么先需要考察  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{x}}$  的整数最大值。

$$\begin{aligned}
&\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{x}} \\
&= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}}
\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
&= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x}} \\
&= e^0 \\
&= 1 \\
\therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x^{\frac{1}{x}}) &= f(1) = 1.
\end{aligned}$$

## 4.6 迭代式数列

### 4.6.1 数列表达式

最重要的是将迭代式进行变形。

**例题：**数列  $\{a_n\}$  满足  $a_0 = 0, a_1 = 1, 2a_{n+1} = a_n + a_{n-1}, n = 1, 2, \dots$ 。计算  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 。

首先看题目，给出的递推式设计到二阶递推，即存在三个数列变量，所以我们必须先求出对应的数列表达式。因为这个表达式涉及三个变量，所以尝试对其进行变型：

$$\begin{aligned}
&a_{n+1} - a_n \\
&= \frac{a_{n-1} - a_n}{2} \\
&= \left(-\frac{1}{2}\right)(a_n - a_{n-1}) \\
&= \left(-\frac{1}{2}\right)^2(a_{n-1} - a_{n-2}) \\
&= \dots \\
&= \left(-\frac{1}{2}\right)^n(a_1 - a_0) \\
&= \left(-\frac{1}{2}\right)^n
\end{aligned}$$

然后得到了  $a_{n+1} - a_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$ ，而要求极限，所以使用列项相消法的逆运算：

$$\begin{aligned}
a_n &= (a_n - a_{n-1}) + (a_{n-1} - a_{n-2}) + \dots + (a_1 - a_0) + a_0 \\
&= \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-2} + \dots + \left(-\frac{1}{2}\right)^0 \\
&= \frac{1 \cdot \left(1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^n\right)}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)} \\
&= \frac{2}{3} \left[1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^n\right]
\end{aligned}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{2}{3}$$

#### 4.6.2 单调有界准则

对于无法将关系式通过变形归纳为一般式的关系式，对于其极限就必须使用单调有界准则来求出。

单调有界的数列必有极限。需要证明单调性和有界性，然后对式子求极限就能求出目标极限。

**例题：**  $x_0 = 0$ ,  $x_n = \frac{1 + 2x_{n-1}}{1 + x_{n-1}} (n \in N^*)$ , 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 。

首先应该知道数列的趋向都是趋向正无穷。

然后对关系式进行变形： $x_n = \frac{1 + 2x_{n-1}}{1 + x_{n-1}} = 1 + \frac{x_{n-1}}{1 + x_{n-1}} = 2 - \frac{1}{1 + x_{n-1}}$ 。

首先证明单调性，令  $f(x) = 2 - \frac{1}{1 + x}$ 。

$\therefore f'(x) = \frac{1}{(x + 1)^2} > 0$ , 则  $f(x)$  单调递增。

所以不管  $x = x_{n-1}$  或其他,  $f'(x) > 0$ ,  $x_n$  都是单调递增, 则  $x_n \geq x_0 = 0$ 。

然后证明有界性,  $\because x_n \geq 0$  且单调,  $\therefore x_n = 2 - \frac{1}{1 + x_{n-1}} \in [0, 2]$ 。

从而  $x_n$  有界。

所以根据单调有界定理,  $x_n$  的极限存在。

对于关系式两边取极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2x_{n-1}}{1 + x_{n-1}} = \frac{1 + 2 \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n-1}}{1 + \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n-1}} = \frac{1 + 2 \lim_{n \rightarrow \infty} x_n}{1 + \lim_{n \rightarrow \infty} x_n}。$$

解该一元二次方程:  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$ , 又根据保号性,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n > 0$ 。

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}。$$

而许多题目只给出样子, 连通项公式都不会给出。

**例题：** 求出数列  $\sqrt{2}, \sqrt{2 + \sqrt{2}}, \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}, \dots$  的极限。

根据数列样式, 无法通过普通的通项公式来表达, 所以需要考虑使用递推式来表示:  $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$ 。

首先证明有界性:

给定一个任意的正整数  $k$ , 再根据递推式, 假定  $x_k < 2$ , 所以  $x_{k+1} = \sqrt{2 + x_k} < \sqrt{2 + 2} = 2$ 。且  $x_1 = \sqrt{2}$  满足假定, 所以  $x_k < 2$  对于任意的正整数  $k$  都成立, 所以  $x_n$  存在上界 2。

然后证明单调性, 根据其递推式:

$$x_{n+1} - x_n = \sqrt{2 + x_n} - x_n = \frac{2 + x_n - x_n^2}{\sqrt{2 + x_n} + x_n} = \frac{-(x_n - 2)(x_n + 1)}{\sqrt{2 + x_n} + x_n}。$$

又  $0 < x_n < 2$ , 从而上式子大于 0, 从而数列单调递增。

所以根据单调有界定理, 数列  $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$  一定存在极限, 令其极限值

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a。$$

将递推式两边平方并取极限:  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1}^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} (2 + x_n)。$

从而  $a^2 = 2 + a$ , 得出  $a = 2$  (根据极限的保号性  $-1$  被舍去)。

## 4.7 变限积分极限

已知更改区间限制的积分  $s(x) = \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} g(t) dx$ ,  $s'(x) = g[\varphi_2(x)] \cdot \varphi_2'(x) - g[\varphi_1(x)] \cdot \varphi_1'(x)。$