MA0501 – Tarea 2

Diego Alberto Vega Víquez - C38367 — José Carlos Quintero Cedeño - C26152 — Gabriel Valverde Guzmán - C38060

2025-08-29

Tabla de contenidos

Ejercicio 1	2
Ejercicio 2	3
Ejercicio 3	5
Ejercicio 4	5
Ejercicio 5	7
Ejercicio 6	8
Ejercicio 7	9
Ejercicio 8	11
Ejercicio 9	12
Ejercicio 10	14
Ejercicio 11	23
Ejercicio 12	25
Ejercicio 13	25
Ejercicio 14	26
Ejercicio 15	28
Ejercicio 16	28

i Instrucción

Suponga que p^* aproxima a p con 3 dígitos significativos.

Encuentre el intervalo en el cual p^* debe estar, si:

- a) p = 150
- b) p = 900
- c) p = 1500
- d) p = 90

Solución

Vea que si P^* aproxima a P con 3 dígitos significativos eso significa que

$$\begin{split} \frac{|P-P^*|}{|P|} < 0.5 \times 10^{-t+1} \\ |P-P^*| < 0.5 \times 10^{-t+1} \, |P| \end{split}$$

$$\begin{split} |P-P^*| < 0.5 \times 10^{-t+1} \, |P| \\ P - 0.5 \times 10^{-t+1} \, |P| < P^* < P + 0.5 \times 10^{-t+1} \, |P| \end{split}$$

Por lo que se puede concluir que el intervalo en el cual p* debe estar es

$$[(1-0.5\times 10^{-t+1})|P|, (1+0.5\times 10^{-t+1})|P|]$$

```
intervalo <- function(P, t) {
  margen <- 0.5 * 10^(-t + 1)
  inferior <- P * (1 - margen)
  superior <- P * (1 + margen)
  data.frame(
    P = P,
    t = t,</pre>
```

```
Limite_Inferior = round(inferior, 4),
    Limite_Superior = round(superior, 4)
  )
}
tabla_intervalos <- rbind(</pre>
                                                                                     (3)
  intervalo(150, t),
  intervalo(900, t),
  intervalo(1500, t),
  intervalo(90, t)
kableExtra::kable(tabla_intervalos)
```

- (1) Definir el valor de t
- (2) Función que devuelve los extremos del intervalo como fila de una tabla
- (3) Crear tabla con los resultados para varios valores de P
- (4) Mostrar la tabla (Quarto renderiza automáticamente como tabla bonita)

Р	t	Limite_Inferior	Limite_Superior
150	3	149.25	150.75
900	3	895.50	904.50
1500	3	1492.50	1507.50
90	3	89.55	90.45

i Instrucción

Considere los siguientes valores para $p y p^*$:

a.
$$p = \pi$$
 $p^* = 3.1$

b.
$$p = \frac{1}{3}$$
 $p^* = 0.333$

b.
$$p = \frac{1}{3}$$
 $p^* = 0.333$
c. $p = \frac{\pi}{1000}$ $p^* = 0.0031$
d. $p = \frac{100}{3}$ $p^* = 33.3$

d.
$$p = \frac{100}{3}$$
 $p^* = 33.3$

¿Cuál es el error absoluto y relativo al aproximar p por p^* ?

```
a)
err.abs.a <- abs(pi - 3.1)
err.rel.a <- err.abs.a / pi
error absoluto: 0.04159265
error relativo: 0.01323935
  b)
err.abs.b \leftarrow abs(pi/1000 - 0.0031)
err.rel.b \leftarrow err.abs.b/(pi/1000)
error absoluto: 0.00004159265
error relativo: 0.01323935
  c)
err.abs.c <- abs(1/3 - 0.333)
err.rel.c <- err.abs.c/(1/3)
error absoluto: 0.0003333333
error relativo: 0.001
  d)
err.abs.d \leftarrow abs(100/3 - 33.3)
err.rel.d \leftarrow err.abs.d/(100/3)
error absoluto: 0.03333333
error relativo: 0.001
```

i Instrucción

Sea

$$\alpha_n = \frac{n+10}{n^5},$$

pruebe que

$$\alpha_n = 0 + O\bigg(\frac{1}{n^4}\bigg) \,.$$

¿Qué se puede concluir?

Solución

Ejercicio 4

i Instrucción

Suponga que fl(x) es una aproximación de x con redondeo a k dígitos.

Demuestre que:

$$\left|\frac{x-fl(x)}{x}\right| \leq 0.5 \times 10^{-k+1}.$$

Solución

Ya que fl(x) es una aproximación de x con redonde
o a k dígitos eso significa que podemos escribir fl(x) de la siguiente forma

$$fl(x) = 0.d_1d_2\cdots d_k\times 10^n$$

Sea $x \in \mathbb{R}$ que escribiremos como

$$x = 0.d_1 d_2 \cdots \times 10^n$$

De esta forma

$$\begin{split} \left| \frac{x - fl(x)}{x} \right| &= \left| \frac{0.d_1 d_2 \cdots \times 10^n - 0.d_1 d_2 \cdots d_k \times 10^n}{0.d_1 d_2 \cdots \times 10^n} \right| \\ &= \left| \frac{0.d_{k+1} d_{k+2} \cdots \times 10^{n-k}}{0.d_1 d_2 \cdots \times 10^n} \right| \\ &= \left| \frac{0.d_{k+1} d_{k+2} \cdots}{0.d_1 d_2 \cdots} \right| \times 10^{-k} \end{split}$$

Aquí hay que analizar por casos:

• Suponga que $d_{k+1} < 5$

En este caso basta con cortar en \boldsymbol{d}_k así:

$$\begin{split} \left| \frac{x - fl(x)}{x} \right| &= \left| \frac{0.d_{k+1}d_{k+2} \cdots}{0.d_1d_2 \cdots} \right| \times 10^{-k} \\ &\leq 0.5 \cdot \left| \frac{1}{0.1} \right| \times 10^{-k} \\ &= 0.5 \times 10^{-k+1} \end{split}$$

• Suponga que $d_{k+1} \geq 5$.

Recuerde que para este caso en fl(x) pasa que d_k es una unidad mayor que el d_k de x. De esta forma se va a cumplir que $d_{j_{\text{real}}} = d_{j_{\text{aproximado}}}$ para $j = \{1, 2, \dots, k-1\}$ así se tiene que

$$\begin{split} |x-fl(x)| &= 10^{1-k} \cdot (1-0.d_{k+1} \cdots) \\ \left| \frac{x-fl(x)}{x} \right| &= \frac{10^{1-k} \cdot (1-0.d_{k+1} \cdots)}{|0.d_1 d_2 \cdots \times 10^n|} \end{split}$$

Vea que

$$\begin{split} d_{k+1} \geq 5 &\implies 0.d_{k+1} \cdots \geq \frac{1}{2} \\ &\implies 1 - 0.d_{k+1} \cdots \leq \frac{1}{2} \\ &\implies 1 - 0.d_{k+1} \cdots \leq \frac{1}{2} \end{split}$$

Así

$$\left|\frac{x - fl(x)}{x}\right| \leq \frac{10^{1-k} \cdot 0.5}{|0.d_1 d_2 \cdots \times 10^n|} \leq 10^{1-k} \cdot 0.5$$

Luego, concluya que

$$\left| \frac{x - fl(x)}{x} \right| \le 0.5 \times 10^{-k+1} \qquad \blacksquare$$

Ejercicio 5

i Instrucción

Si se calcula la raíz menor en valor absoluto de la ecuación:

$$f(x) = x^2 + 0.4002 \times 10^0 x + 0.8 \times 10^{-4} = 0,$$

con la fórmula cuadrática usual, entonces se produce una pérdida de dígitos significativos. ¿Por qué?

Encuentre una fórmula alternativa para efectuar este cálculo sin que se produzca tal pérdida y determine la raíz de menor magnitud.

Solución

Con la formula usual:

```
a <- 1
b <- 0.4002
c <- 0.8e-4
discriminante <- b^2 -4*a*c
raiz.menor <- abs((-b + sqrt(discriminante))/2*a)
raiz.discriminante <- sqrt(discriminante)

format(raiz.menor, scientific = FALSE, digits = 22)</pre>
```

[1] "0.000199999999999779731752"

b

[1] 0.4002

raiz.discriminante

[1] 0.3998

Una de las razones por las que hay perdida significativa de digitos es porque al aplicar la raiz

del discriminante se obtiene un numero muy parecido a -b, de manera que se esta restando en el numerador numeros muy parecidos.

Una forma de calcular la raiz menor de forma mas precisa es usando la siguiente formula (la cual se obtiene al multiplicar por el conjugado del numerador en forma de un 1 conveniente y desarrollando):

```
raiz.menor.nueva <- abs((2 * c) / (-b - sqrt(discriminante)))
format(raiz.menor.nueva, scientific = FALSE, digits = 22)</pre>
```

[1] "0.00020000000000000000095843"

Ejercicio 6

```
Escriba una función en R que verifique, para cualquier n, la siguiente identidad: \begin{vmatrix} x & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & x & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & x & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{vmatrix} = (x+a_1+\cdots+a_n)(x-a_1)(x-a_2)\cdots(x-a_n).
```

```
a <- matrix(c(1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 1), byrow = TRUE, nrow = 3)
verificar.identidad <- function(matriz) {
  derecha <- sum(matriz[1, ]) * prod(sapply(matriz[1, ][-1], function(y)) {
    return(matriz[1] - y)
}))
  izquierda <- det(matriz)
  return(
  list(
    "Matriz" = matriz,
    "Determinante" = izquierda,
    "ResultadoFormula" = derecha,
    "SeVerificaIdentidad" = (izquierda == derecha)
  )
)</pre>
```

```
verificar.identidad(a)
```

\$Matriz

\$Determinante

[1] 12

\$ResultadoFormula

[1] 12

\$SeVerificaIdentidad

[1] TRUE

Ejercicio 7

i Instrucción

Escriba una función en R que verifique para cualquier n la siguiente identidad:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ b_1 & a_1 & a_1 & \cdots & a_1 & a_1 \\ b_1 & b_2 & a_2 & \cdots & a_2 & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ b_1 & b_2 & b_3 & \cdots & b_n & a_n \end{vmatrix} = (a_1 - b_1)(a_2 - b_2) \cdots (a_n - b_n).$$

```
identidad <- function(df) {
  n <- ncol(df) - 1
  # Validaciones básicas
  if (nrow(df) != n + 1) return(FALSE)
  if (!all(df[1, ] == 1)) return(FALSE)
  M <- df[-1, ]</pre>
```

```
a <- diag(M[, -1])
b <- diag(M[, -ncol(M)])

estructura_valida <- all(
    sapply(1:n, function(i) {
    fila <- M[i, ]
    izquierda <- fila[1:i]
    derecha <- fila[(i+1):(n+1)]
    all(izquierda == b[i]) && all(derecha == a[i])
    })
)
if (!estructura_valida) return(FALSE)
return(isTRUE(all.equal(det(df), prod(a - b))))
}</pre>
```

- 1 Extraer submatriz sin la primera fila
- (2) Verificar estructura: por filas, los valores deben seguir patrón
- (3) Validar identidad con tolerancia numérica

Prueba

```
df <- matrix(c(
    1, 1, 1, 1,
    2, 3, 3, 3,
    2, 2, 4, 4,
    2, 2, 2, 5
), nrow = 4, byrow = TRUE)

identidad(df)</pre>
```

[1] TRUE

i Instrucción

Se dice que una matriz es *rala* si esta tiene más entradas nulas que no nulas (mayor estricto). Escriba una función en R que permita determinar si una matriz es rala.

Solución

\$EsRala

```
a \leftarrow matrix(c(0, 0, 0, 0, 0, 3, 2, 4, 5), nrow = 3, byrow = TRUE)
es.rala <- function(matriz) {</pre>
  nulos <- sum(sapply(matriz, function(y) {</pre>
    if (y == 0) {
      return(1)
    else {
      return(0)
    }
  }))
  no.nulos <- length(matriz) - nulos</pre>
  return(list("Matriz" = matriz, "entradas nulas" = nulos, "entradas no nulas" = no.nulos, "EsI
es.rala(a)
$Matriz
     [,1] [,2] [,3]
[1,]
        0
[2,]
        0
              0
                   3
[3,]
              4
$`entradas nulas`
[1] 5
$`entradas no nulas`
[1] 4
```

i Instrucción

Se dice que una matriz $A\in M_{n\times m}$ tiene forma de O si todas las entradas de la fila 1, fila n, columna 1 y columna m no son nulas, y las demás entradas de la matriz son nulas.

Escriba una función en R que permita determinar si una matriz está en forma de O.

```
a \leftarrow matrix(c(1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1), nrow = 3, byrow = TRUE)
es.o <- function(matriz) {</pre>
  fila.1 <- matriz[1, ]</pre>
  fila.n <- matriz[nrow(matriz), ]</pre>
  col.1 <- matriz[, 1]</pre>
  col.n <- matriz[, ncol(matriz)]</pre>
  if (nrow(matriz) > 2 && ncol(matriz) > 2) {
    matriz.central <- matriz[-c(1, nrow(matriz)), -c(1, ncol(matriz)), drop = FALSE]</pre>
  } else {
    matriz.central <- NULL</pre>
  }
  todo.bien <- TRUE
  for (elem in seq_along(fila.1)) {
    if (fila.1[elem] == 0 \mid \mid fila.n[elem] == 0) {
      todo.bien <- FALSE
      break
    }
  }
  if (todo.bien) {
    for (elem in seq_along(col.1)) {
```

```
if (col.1[elem] == 0 || col.n[elem] == 0) {
       todo.bien <- FALSE</pre>
       break
     }
   }
 }
 if (todo.bien && !is.null(matriz.central)) {
   for (elem in matriz.central) {
     if (elem != 0) {
      todo.bien <- FALSE
      break
    }
   }
 }
 return(list("Matriz" = matriz, "Tiene forma de 0" = todo.bien))
}
es.o(a)
$Matriz
    [,1] [,2] [,3]
[1,] 1 1
[2,] 1 0 1
[3,] 1 1 1
$`Tiene forma de 0`
[1] TRUE
```

i Instrucción

En el capítulo de análisis funcional complete las demostraciones de los teoremas 2, 4, 5, 14, 16 y de los ejemplos 3, 5.

Solución

? Teorema 2

En un espacio vectorial de dimensión finita todas las normas son equivalentes.

Prueba

? Teorema 4

Para todo producto interno se tiene la desigualdad de Cauchy–Schwarz:

$$|\langle x, y \rangle|^2 \le \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle,$$

para todo $x,y\in X$, además se tiene igualdad si para todo x,y son linealmente dependientes.

♦ Prueba

Si x=0 la desigualdad es trivial. Si $x\neq 0$, tome

$$z = y - \frac{\langle y, x \rangle}{\|x\|^2} x,$$

luego es claro que $\langle z, x \rangle = 0$ y que:

$$0 \leq \|z\|^2 = \left\langle y - \frac{\langle y, x \rangle}{\|x\|^2} x, \ y - \frac{\langle y, x \rangle}{\|x\|^2} x \right\rangle = \langle y, y \rangle - \frac{\langle y, x \rangle \langle x, y \rangle}{\|x\|^2} = \|y\|^2 - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|x\|^2}.$$

por lo tanto:

$$|\langle x, y \rangle|^2 \le ||x||^2 ||y||^2 = \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle.$$

Para la igualdad, observe que $||z||^2 = 0$ si y solo si z = 0, es decir:

$$y = \frac{\langle y, x \rangle}{\|x\|^2} x = \lambda x,$$

para $\lambda \in \mathbb{R}$ (o \mathbb{C}). Por lo tanto, x y y son linealmente dependientes.

Recíprocamente, si $y = \lambda x$, entonces:

$$\langle x, y \rangle = \langle x, \lambda x \rangle = \lambda \langle x, x \rangle,$$

y por lo tanto:

$$|\langle x,y\rangle|^2 = |\lambda|^2 \langle x,x\rangle^2 = \langle x,x\rangle (\lambda \overline{\lambda} \langle x,x\rangle) = \langle x,x\rangle \langle y,y\rangle.$$

Así, se tiene igualdad si y solo si x y y son linealmente dependientes.

? Teorema 5

Sea X un espacio vectorial complejo (o real). Entonces la función

$$\|x\|:=\langle x,x\rangle^{1/2}$$

define una norma en X, es decir un espacio pre–Hilbert es siempre un espacio normado.

🌢 Prueba

Sea X un espacio pre–Hilbert, defina la función $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \to \mathbb{C}$ (o \mathbb{R}) y vea que para $x \in V$

- $\langle x, x \rangle \ge 0 \implies \langle x, x \rangle^{1/2} \ge 0$
- $\left(\langle x,x\rangle=0\iff x=0\right) \Longrightarrow \left(\langle x,x\rangle^{1/2}=0\iff x=0\right)$ Sea $\alpha\in\mathbb{C}$ (o \mathbb{R}) entonces

$$\langle \alpha x, \alpha x \rangle^{1/2} = \left(\alpha \langle x, \alpha x \rangle \right)^{1/2}$$

$$= \left(\alpha \overline{\langle \alpha x, x \rangle} \right)^{1/2}$$

$$= \left(\alpha \cdot \overline{\alpha} \cdot \langle x, x \rangle \right)^{1/2}$$

$$= \left(|\alpha|^2 \langle x, x \rangle \right)^{1/2}$$

$$= |\alpha| \langle x, x \rangle^{1/2}$$

• Sea $y \in V$ entonces

$$\langle x + y, x + y \rangle^{1/2} = \left(\langle x, x + y \rangle + \langle y, x + y \rangle \right)^{1/2}$$

$$= \left(\overline{\langle x + y, x \rangle} + \overline{\langle x + y, y \rangle} \right)^{1/2}$$

$$= \left(\langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle \right)^{1/2}$$

$$\leq \left(\langle x, x \rangle + 2 \cdot \langle x, x \rangle^{1/2} \langle y, y \rangle^{1/2} + \langle y, y \rangle \right)^{1/2}$$

Esto último asumiendo que $\langle y, x \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$ y usando Cauchy–Schwarz. De esta forma vea que

$$\langle x + y, x + y \rangle \le \langle x, x \rangle + 2 \cdot \langle x, x \rangle^{1/2} \langle y, y \rangle^{1/2} + \langle y, y \rangle$$

$$= \left(\langle x, x \rangle^{1/2} + \langle y, y \rangle^{1/2} \right)^2$$

$$\Rightarrow \langle x + y, x + y \rangle^{1/2} \le \langle x, x \rangle^{1/2} + \langle y, y \rangle^{1/2}$$

Vea que la función $\|\cdot\|:=\langle\cdot,\cdot\rangle^{1/2}$ cumple las propiedades de una norma, por lo que $\|\cdot\|$ sería la norma del espacio de pre-Hilb Φ t X. Así se puede concluir que el espacio pre-Hilbert es siempre un espacio normado

? Teorema 14

Sea U un subespacio vectorial de un espacio de pre–Hilbert X.

Un elemento v es la mejor aproximación a $w \in X$ con respecto a U si y solo si:

$$\langle w - v, u \rangle = 0 \quad \forall u \in U.$$

Es decir, si y solamente si $w-v\perp U$. Además, para cada $w\in X$ existe a lo más una única mejor aproximación con respecto a U.

Prueba

 (\Rightarrow) Sea r:=w-v, para cualquier $u\in U$ y todo $t\in\mathbb{R}.$

Note que $v + tu \in U$.

Como v es la mejor aproximación:

$$\begin{split} \|w - (v + tu)\|^2 &\geq \|w - v\|^2 \quad \forall t \in \mathbb{R} \\ \|r - tu\|^2 &= \|r\|^2 - 2t \operatorname{Re} \langle r, u \rangle + t^2 \|u\|^2 > \|r\|^2 \quad \forall t \in \mathbb{R} \end{split}$$

Entonces:

$$-2t\operatorname{Re}\langle r,u\rangle+t^2\|u\|^2\geq 0\quad\forall t\in\mathbb{R}$$

La única forma en que esto ocurre para todo t es que $\langle r,u\rangle=0,$ por tanto:

$$\langle w - v, u \rangle = 0$$

 (\Leftarrow) Sea r := w - v y tome cualquier $u \in U$.

Si $v - u \in U$ y $\langle w - v, u \rangle = 0$, entonces:

$$\begin{split} \|w-u\|^2 &= \|(w-v) + (v-u)\|^2 \\ &= \|r\|^2 + \|v-u\|^2 + 2\operatorname{Re}\langle r, v-u\rangle \\ &= \|r\|^2 + \|v-u\|^2 \geq \|r\|^2 \quad (\text{ya que } \langle r, v-u\rangle = 0) \end{split}$$

Por lo tanto, v es la mejor aproximación de w en U.

Unicidad:

Si $v, v' \in U$ fuesen dos mejores aproximaciones, entonces:

$$\|w-v\|^2 = \|w-v'\|^2$$

$$\|w-v\|^2 = \|w-v'\|^2 + \|v-v'\|^2$$

Esto implica que:

$$||v - v'||^2 = 0 \Rightarrow v' = v$$

? Teorema 16

Sea U un subespacio vectorial completo de un espacio pre–Hilbert X.

Entonces para cada elemento $w \in X$ existe una única mejor aproximación con respecto a U.

 - El operador $P:X \to U$ que le asigna a $w \in X$ su mejor aproximación es un operador lineal acotado con las siguientes propiedades:

$$P^2 = P$$
 y $||P|| = 1$.

• Este operador se conoce como la **proyección ortogonal** de X sobre U.



Prueba

(Ejercicio)



Piemplo 3

El espacio vectorial C[a,b] provisto con la norma

$$\|f\|_{\infty}:=\max_{x\in[a,b]}|f(x)|$$

es un espacio de Banach.

Prueba

Sea $\{x_n\}$ una sucesión de Cauchy en C([a,b]).

Sea $\varepsilon > 0$.

Dado que $\{x_n\}$ es de Cauchy, existe $n_0\in\mathbb{N}$ tal que:

$$\|x_n - x_m\|_{\infty} < \varepsilon \quad \forall n, m \ge n_0$$

Entonces:

$$\sup_{t \in [a,b]} |x_n(t) - x_m(t)| < \varepsilon \quad \Rightarrow \quad |x_n(t) - x_m(t)| < \varepsilon \quad \forall t \in [a,b], \, n,m \geq n_0$$

Para cada $t \in [a,b],$ la sucesión $\{x_n(t)\}_{n=1}^{\infty}$ es de Cauchy en $\mathbb{R}.$

Como \mathbb{R} es completo, existe un límite:

$$\lim_{n \to \infty} x_n(t) = x(t) \in \mathbb{R}, \quad \forall t \in [a, b]$$

Por tanto, x es una función de [a,b] en \mathbb{R} y definimos $x \in C([a,b])$.

Sea $t_0 \in [a, b]$.

Notamos que:

$$\begin{split} |x(t) - x(t_0)| & \leq |x(t) - x_{n_0}(t)| + |x_{n_0}(t) - x_{n_0}(t_0)| + |x_{n_0}(t_0) - x(t_0)| \\ & \leq \varepsilon + \varepsilon + \varepsilon = 3\varepsilon \end{split}$$

Ya que $x_{n_0} \in C([a,b])$, es continua en t_0 , entonces existe $\delta > 0$ tal que:

$$|x_{n_0}(t)-x_{n_0}(t_0)|<\varepsilon\quad \text{si } |t-t_0|<\delta$$

Y como además $|x(t)-x_{n_0}(t)|<\varepsilon$ y $|x_{n_0}(t_0)-x(t_0)|<\varepsilon$, se concluye que $x\in C([a,b])$. Finalmente, dado que:

$$\sup_{t \in [a,b]} |x_n(t) - x(t)| < \varepsilon \quad \Rightarrow \quad \|x_n - x\|_{\infty} < \varepsilon \quad \forall n \geq n_0$$

tenemos que $x_n \to x$ en la norma $\|\cdot\|_{\infty}.$

Por tanto:

 $C([a,b]), \; \|\cdot\|_{\infty}$ es un espacio de Banach.

? Ejemplo 5

El espacio vectorial ${\cal C}[a,b]$ provisto con la norma ${\cal L}_2$:

$$\|f\|_1:=\left(\int_a^b|f(x)|^2dx\right)^2$$

NO es un espacio de Banach.

♦ Prueba

Hay que probar que el espacio vectorial C[a,b] normado provisto con la norma L_2 **NO** es completo. Es decir, hay que encontrar una sucesión de Cauchy de elementos de U que **NO** converge a un elemento en U, siendo U un subconjunto del espacio vectorial C[a,b] Sin pérdida de generalidad se toma [a,b] = [0,2] y se escoge:

$$f_n(x) := \begin{cases} x^n & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ 1 & \text{si } 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

Para todo m > n se tiene que:

$$\begin{split} \|f_n - f_m\|_1 &= \left(\int_0^2 |f_n(x) - f_m(x)|^2 \, dx\right)^2 \\ &= \left(\int_0^1 |x^n - x^m|^2 \, dx\right)^2 \\ &= \left(\int_0^1 \left(x^{2n} - 2x^{n+m} + x^{2m}\right) \, dx\right)^2 \\ &= \left(\frac{1}{2n+1} - \frac{2}{n+m+1} + \frac{1}{2m+1}\right)^2 \to 0 \quad \text{cuando } n, m \to \infty, \end{split}$$

por lo tanto (f_n) es una sucesión de Cauchy.

Ahora, supongamos que la sucesión (f_n) converge a una función continua f con respecto a la norma L_1 , es decir:

$$||f_n - f||_1 \to 0$$
 cuando $n \to \infty$.

Entonces,

$$||f||_{1} = ||(f - x^{n}) + x^{n}||_{1}$$

$$\leq ||f - x^{n}||_{1} + ||x^{n}||_{1} \quad \text{(desigualdad triangular)}$$

$$= ||f - f_{n}||_{1} + \left(\int_{0}^{1} |x^{n}|^{2} dx\right)^{2}$$

$$= ||f - f_{n}||_{1} + \left(\int_{0}^{1} x^{2n} dx\right)^{2}$$

$$= ||f - f_{n}||_{1} + \left(\frac{1}{2n+1}\right)^{2} \xrightarrow[n \to \infty]{} 0$$

de donde f(x) = 0 para $0 \le x \le 1$.

Vea además que

i Instrucción

En el teorema 7, si tomamos como espacio pre–Hilbert a \mathbb{R}^n con el producto punto clásico, escriba una función en R que reciba una base de un subespacio de \mathbb{R}^n en una lista de listas y retorne la base ortogonal en una lista de listas, luego otra función que calcule la base ortonormal.

```
prod.punto <- function(x, y) {</pre>
  return(sum(x * y))
}
norma <- function(x) {</pre>
  return(sqrt(prod.punto(x, x)))
proy.ortogonal <- function(u, v) {</pre>
  (prod.punto(u, v) / prod.punto(v, v)) * v
}
gs.ortogonal <- function(base) {</pre>
  U <- base
  Q <- list()
  for (k in seq_along(U)) {
    u \leftarrow U[[k]]
    if (length(Q) > 0) {
       for (q in Q)
         u <- u - proy.ortogonal(u, q)</pre>
    Q[[length(Q) + 1]] \leftarrow u
  }
  return(Q)
```

```
gs.ortonormal <- function(base) {</pre>
  base.ortogonal <- gs.ortogonal(base)</pre>
 return(lapply(base.ortogonal, function(x) {
   return(x / norma(x))
  }))
}
base <- list(c(1,2,3), c(4,5,6), c(1,0,1))
gs.ortogonal(base)
[[1]]
[1] 1 2 3
[[2]]
[1] 1.7142857 0.4285714 -0.8571429
[[3]]
[1] 0.3333333 -0.6666667 0.3333333
gs.ortonormal(base)
[[1]]
[1] 0.2672612 0.5345225 0.8017837
[[2]]
[1] 0.8728716 0.2182179 -0.4364358
[[3]]
[1] 0.4082483 -0.8164966 0.4082483
```

i Instrucción

Repita el ejercicio anterior usando los espacios y el producto interno del ejemplo 7. ¿Será posible hacer una función que reciba también como parámetro el producto interno como una función de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ en \mathbb{R} y genere la base ortogonal y ortonormal usando este producto interno?

Solución

-

Ejercicio 13

i Instrucción

i Corolario 2

Sea U un subespacio vectorial de dimensión finita de un espacio pre-Hilbert X con base ortonormal u_1, u_2, \dots, u_n .

Entonces la proyección ortogonal está dada por:

$$Pw = \sum_{k=1}^{n} \langle w, u_k \rangle u_k, \quad \text{con } w \in X.$$

En el Corolario 2, si tomamos como espacio pre–Hilbert a \mathbb{R}^n con el producto punto clásico, escriba una función en R que reciba una base de un subespacio U de \mathbb{R}^n en una lista de listas, un vector de \mathbb{R}^n y retorne en una lista la mejor aproximación a ese vector en U.

```
prod.punto <- function(x, y) {
    return(sum(x * y))
}

mejor.aprox <- function(base, vector) {
    U <- gs.ortonormal(base)
    aprox <- numeric(length(vector))
    coef <- numeric(length(U))</pre>
```

```
for (k in seq_along(U)) {
    u <- U[[k]]
    coef[k] <- prod.punto(vector, u)
    aprox <- aprox + coef[k] * u
}

return(list("Aproximacion" = aprox, "Coeficientes" = coef))
}

mejor.aprox(list(c(1,2, 3), c(4, 5, 6)), c(1,0,1))

$Aproximacion
[1] 0.66666667 0.66666667

$Coeficientes
[1] 1.0690450 0.4364358</pre>
```

i Instrucción

Repita el ejercicio anterior usando los espacios y el producto interno del ejemplo 7. ¿Será posible hacer una función que reciba también como parámetro el producto interno como una función de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ en \mathbb{R} y genere la mejor aproximación usando este producto interno?

```
prod.12 <- function(f, g) {
   integrate(function(x) f(x) * g(x), lower = 0, upper = 1)$value
}

mejor.aprox.2 <- function(base, f, prod.interno = prod.12) {
   coef <- sapply(base, function(u) prod.interno(f, u))
   aprox <- function(x) {
      s <- 0
      for (k in seq_along(base)) {</pre>
```


```
s \leftarrow s + coef[k] * base[[k]](x)
    }
   return(s)
  }
  return(list("Aproximacion" = aprox, "Coeficientes" = coef))
}
library(tidyverse)
# Base del ejemplo 7
u1 <- function(x) 1
u2 \leftarrow function(x)  sqrt(3) * (2*x - 1)
u3 \leftarrow function(x) sqrt(5) * (6*x^2 - 6*x + 1)
B_ON <- list(u1, u2, u3)</pre>
f <- function(x) tan(x)</pre>
res <- mejor.aprox.2(B_ON, f)
Pf <- res$Aproximacion
x \leftarrow seq(0, 1, length.out = 400)
df \leftarrow data.frame(x = x, real = f(x), aprox = Pf(x))
ggplot(df, aes(x = x)) +
  geom\_line(aes(y = real, color = "f(x) = tan(x)"), size = 1.1) +
  geom_line(aes(y = aprox, color = "Aproximación (P2)"),
             size = 1.1,
             linetype = "dashed") +
  scale_color_manual(values = c(
    "f(x) = tan(x)" = "black",
    "Aproximación (P2)" = "red"
  )) +
  labs(
    title = expression(paste("f(x)=tan(x) vs proyección en ", P[2], "[0,1]")),
```


x = "x",

y = "valor",
color = "Curva"

theme_minimal(base_size = 12) +
theme(legend.position = "top")

f(x)=tan(x) vs proyección en $P_2[0,1]$





Ejercicio 15

i Instrucción

Pruebe que la función $f(x) = \sqrt{x+2}$ tiene un punto fijo único en [0,7].

Solución

Ejercicio 16

i Instrucción

Sea $f:X\to X$ una aplicación. Denotamos por F_f el conjunto de puntos fijos de la aplicación f.

Pruebe las siguientes propiedades:

a. Sean $f,g:X\to X$ aplicaciones tales que $f\circ g=g\circ f$ entonces se tiene que:

$$f(F_q) \subset F_q, \quad g(F_f) \subset F_f.$$

- b. Sean $f, g: X \to X$ aplicaciones, si $F_q = \{x^*\}$ y $f \circ g = g \circ f$ entonces $F_f \neq \emptyset$.
- c. Sea $X \neq \emptyset$ y $f: X \to X$ aplicación. Si existe $n \in \mathbb{R}$ tal que $F_{f^n} = \{x^*\}$ entonces $F_f = \{x^*\}$.
- d. Se
a $X\neq\emptyset$ y $f:X\to X$ aplicación. Si
 $F_f\neq\emptyset$ entonces $F_{f^n}\neq\emptyset$ para todo
 $n\in\mathbb{N}.$
- e. Sea $X \neq \emptyset$ y $f: X \to X$ aplicación sobreyectiva, supóngase que $f_d^{-1}: X \to X$ es tal que $f \circ f_d^{-1} = I_X$ y $F_{f_d^{-1}} \neq \emptyset$ entonces $F_f \neq \emptyset$.
- f. Sea A un conjunto con un número impar de elementos y $f:A\to A$ tal que $f^2(x)=x$ para todo $x\in A$, se tiene entonces que $F_f\neq\emptyset$.
- g. Sea $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ confcontinua y acotada entonces $F_f\neq\emptyset.$
- h. Sea $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ con f continua y periódica entonces $F_f\neq\emptyset$

Solución

a. Sean $f, g: X \to X$ aplicaciones tales que $f \circ g = g \circ f$ entonces se tiene que:

$$f(F_g)\subset F_g,\quad g(F_f)\subset F_f.$$



Tome $x_i \in F_g$.

Entonces:

$$g(x_i) = x_i \quad \Rightarrow \quad f(g(x_i)) = f(x_i)$$

Pero como $f \circ g = g \circ f$, también se cumple que:

$$g(f(x_i)) = f(g(x_i)) = f(x_i)$$

Por lo tanto:

$$f(x_i) \in F_g \quad \Rightarrow \quad f(F_g) \subseteq F_g$$

La misma lógica se puede emplear para mostrar que:

$$g(F_f)\subseteq F_f$$

b. Sean $f,g:X\to X$ aplicaciones, si $F_g=\{x^*\}$ y $f\circ g=g\circ f$ entonces $F_f\neq\emptyset.$

🍐 Prueba

Sea $F_g = \{x^*\},$ es decir, x^* es el único punto fijo de g.

Entonces:

$$g(x^*) = x^* \Rightarrow f(g(x^*)) = f(x^*) \Leftrightarrow g(f(x^*)) = f(x^*)$$

Esto implica que $f(x^*) \in F_g = \{x^*\}$, por lo tanto $f(x^*) = x^*$, es decir, x^* también es punto fijo de f.

Así que:

$$\{x^*\} \subseteq F_f \quad \Rightarrow \quad F_f \neq \emptyset$$

c. Sea $X \neq \emptyset$ y $f: X \to X$ aplicación. Si existe $n \in \mathbb{R}$ tal que $F_{f^n} = \{x^*\}$ entonces $F_f = \{x^*\}$.

🌢 Prueba

(Ejercicio)

d. Se
a $X\neq\emptyset$ y $f:X\to X$ aplicación. Si
 $F_f\neq\emptyset$ entonces $F_{f^n}\neq\emptyset$ para todo
 $n\in\mathbb{N}.$

🌢 Prueba

Sabemos que:

$$F_f \neq \emptyset \Rightarrow \exists x \in X \text{ tal que } f(x) = x$$

Caso base: n = 1

Esto es trivial porque $F_{f^1}=F_f\neq\emptyset$ por hipótesis.

Paso inductivo: Supongamos que $F_{f^n} \neq \emptyset$,

es decir:

$$\exists x \in X \text{ tal que } f^n(x) = x$$

Entonces:

$$f(f^n(x)) = f(x)$$
$$\Rightarrow f^{n+1}(x) = x$$

Por lo tanto:

$$x \in F_{f^{n+1}} \Rightarrow F_{f^{n+1}} \neq \emptyset$$

Concluimos por inducción que:

 $F_{f^n} \neq \emptyset$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

e. Sea $X \neq \emptyset$ y $f: X \to X$ aplicación sobreyectiva, supóngase que $f_d^{-1}: X \to X$ es tal que $f \circ f_d^{-1} = I_X$ y $F_{f_d^{-1}} \neq \emptyset$ entonces $F_f \neq \emptyset$.

Prueba

Si $F_{f_d^{-1}} \neq \emptyset$, entonces:

$$\exists \hat{x} \in X: f_d^{-1}(\hat{x}) = \hat{x}$$

Como $f \circ f_d^{-1} = I_X$, entonces:

$$f(f_d^{-1}(\hat{x})) = f(\hat{x}) = \hat{x} \Rightarrow \hat{x} \in F_f \Rightarrow F_f \neq \emptyset$$

f. Sea A un conjunto con un número impar de elementos y $f:A\to A$ tal que $f^2(x)=x$ para todo $x\in A$, se tiene entonces que $F_f\neq\emptyset$.

Prueba

Se tiene que:

$$f(f(x)) = x \quad \forall x \in A$$

Tome $a \in A$.

Caso 1: f(a) = a

Entonces aes punto fijo de $f\Rightarrow F_f\neq\emptyset$

Caso 2: $f(a) \neq a$

Entonces:

$$f(f(a)) = a \Rightarrow f^{-1}(a) = f(a) \Rightarrow f(f(a)) = a \text{ y } f(a) \neq a$$

Esto implica que para cada $a \in A$ habrá un $b \in A$ tal que:

$$f(a) = b y f(b) = a$$

Es decir, A se puede descomponer en pares de elementos (a, b) tales que f(a) = b, f(b) = a (biyecciones de orden 2).

Pero esto implicaría que A tiene un número \mathbf{par} de elementos.

Sin embargo, A es impar.

Por tanto, no todos los elementos pueden emparejarse \Rightarrow al menos uno debe cumplir f(x) = x.

$$\Rightarrow F_f \neq \emptyset$$

g. Sea $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ conf continua y acotada entonces $F_f\neq\emptyset.$

Prueba

Existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $|f(x)| \leq k$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Sea g(x) := f(x) - x. Como f es continua y $x \mapsto x$ también lo es, g es continua en \mathbb{R} .

Tome M > k. Entonces:

- $g(-M) = f(-M) + M \ge -k + M > 0$
- $g(M) = f(M) M \le k M < 0$

Por el teorema del valor intermedio, existe $x^* \in [-M, M]$ tal que $g(x^*) = 0$:

$$f(x^*) - x^* = 0 \Rightarrow f(x^*) = x^* \Rightarrow x^* \in F_f \Rightarrow F_f \neq \emptyset$$

h. Sea $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ con f continua y periódica entonces $F_f \neq \emptyset$.

Prueba

Sea $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ continua y T>0 un periodo, es decir:

$$f(x+T) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Sea g(x) := f(x) - x, que es continua.

Por la periodicidad:

$$g(x+T) = f(x+T) - (x+T) = f(x) - x - T = g(x) - T$$

Tome $x_0 \in \mathbb{R}$. Entonces:

$$g(x_0+kT)=g(x_0)-kT \quad \forall k\in \mathbb{Z}$$

Tome $m,n\in\mathbb{Z}$ tal que $g(x_0+mT)>0$ y $g(x_0+nT)<0.$

Entonces, por el teorema del valor intermedio:

$$\exists x^* \in [x_0 + nT, x_0 + mT] \text{ tal que } g(x^*) = 0 \Rightarrow f(x^*) = x^* \Rightarrow x^* \in F_f \Rightarrow F_f \neq \emptyset \quad \blacksquare$$