


Análisis Real I

CEM - FCM - UNMSM



Centro de Estudiantes de Matemática

Prólogo

Ante la necesidad concreta del actual período lectivo 2026, surgida directamente de la falta sistemática de material académico disponible en idioma español para el curso Análisis Real I, el Centro de Estudiantes de Matemática, en su rol de organización representativa del alumnado y principal promotor del interés estudiantil, ha tomado la iniciativa de redactar el presente material didáctico con el objetivo de serle de auténtico provecho al estudiantado en su proceso de aprendizaje y aprobación de la materia. El gremio asume esta producción para cubrir un vacío real que afecta a todos los cursantes. Una carencia material exige una respuesta organizada, y este material es la respuesta a dicha urgencia. Este material se basa explícitamente en los textos de Elon Lages Lima y Stephen Abbott.

Índice general

1. Conjuntos y Funciones	4
1.1. Conjuntos	4
1.2. Operaciones entre conjuntos	10
1.3. Funciones	17
1.4. Composición de funciones	25
1.5. Familias	29
2. Conjuntos Finitos, Enumerables y No Enumerables	39
2.1. Números naturales	40
2.2. Buena ordenación y el Segundo Principio de Inducción	46
2.3. Conjuntos finitos e infinitos	50
2.4. Conjuntos enumerables	56
2.5. Conjuntos no enumerables	60
3. Números Reales	68
3.1. Cuerpos	70
3.2. Cuerpos ordenados	74
3.3. Números reales	86
4. Secuencias y Series de Números Reales	109
4.1. Secuencias	111
4.2. Límite de una sucesión	117

4.3. Propiedades aritméticas de los límites	124
4.4. Subsucesiones	129
4.5. Sucesiones de Cauchy	135
4.6. Límites infinitos	139
4.7. Series numéricas	143

Capítulo 1

Conjuntos y Funciones

Introduciremos en este capítulo el lenguaje de Conjuntos y Funciones, que será utilizado sistemáticamente en los capítulos siguientes. Toda la Matemática se presenta hoy en día en ese lenguaje; así, imaginamos que la mayoría de los lectores ya tenga cierta familiaridad con el tema. Sin embargo, no se exigirá conocimiento previo alguno de la materia.

1.1. Conjuntos

Un conjunto (o colección) está formado por objetos, llamados sus elementos. La relación básica entre un objeto y un conjunto es la relación de pertenencia. Cuando un objeto x es uno de los elementos que componen el conjunto A , decimos que x pertenece a A y escribimos

$$x \in A.$$

Si, en cambio, x no es uno de los elementos del conjunto A , decimos que x

no pertenece a A y escribimos

$$x \notin A.$$

Un conjunto A queda definido (o determinado, o caracterizado) cuando se da una regla que permita decidir si un objeto arbitrario x pertenece o no a A .

Ejemplo 1. Sea A el conjunto de los triángulos rectángulos. El conjunto A está bien definido: un objeto x pertenece a A cuando es un triángulo y, además, uno de sus ángulos es recto. Si x no es un triángulo, o si x es un triángulo que no posee ángulo recto, entonces x no pertenece a A .

Se usa la notación

$$X = \{a, b, c, \dots\}$$

para representar el conjunto X cuyos elementos son los objetos a, b, c , etc. Así, por ejemplo, $\{1, 2\}$ es el conjunto cuyos elementos son los números 1 y 2. Dado el objeto a , puede considerarse el conjunto cuyo único elemento es a . Ese conjunto se representa por $\{a\}$.

El conjunto de los números naturales 1, 2, 3, ... será representado por el símbolo $\mathbb{N}$. Por tanto

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}.$$

El conjunto de los números enteros (positivos, negativos y cero) será indicado por el símbolo $\mathbb{Z}$. Así,

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

El conjunto $\mathbb{Q}$, de los números racionales, está formado por las fracciones

p/q , donde p y q pertenecen a $\mathbb{Z}$, siendo $q \neq 0$. En símbolos,

$$\mathbb{Q} = \{p/q ; \quad p \in \mathbb{Z}, \quad q \in \mathbb{Z}, \quad q \neq 0\}.$$

Se lee: "Q es el conjunto de las fracciones p/q tales que p pertenece a $\mathbb{Z}$, q pertenece a $\mathbb{Z}$ y q es diferente de cero".

La mayoría de los conjuntos encontrados en Matemática no se definen especificando, uno a uno, sus elementos. El método más frecuente para definir un conjunto es mediante una propiedad común y exclusiva de sus elementos. Más precisamente, se parte de una propiedad P . Ella define un conjunto X así: si un objeto x goza de la propiedad P , entonces $x \in X$; si x no goza de P , entonces $x \notin X$. Se escribe

$$X = \{x ; \quad x \text{ goza de la propiedad } P\}.$$

Se lee: " X es el conjunto de los elementos x tales que x goza de la propiedad P ".

Muchas veces la propiedad P se refiere a elementos de un conjunto fundamental E . En este caso, se escribe

$$X = \{x \in E ; \quad x \text{ goza de la propiedad } P\}.$$

Por ejemplo, sea $\mathbb{N}$ el conjunto de los números naturales y consideremos la siguiente propiedad, que se refiere a un elemento genérico $x \in \mathbb{N}$:

" x es mayor que 5".

La propiedad P , de que un número natural sea mayor que 5, define el conjunto

$X = \{6, 7, 8, 9, \dots\}$, es decir,

$$X = \{x \in \mathbb{N}; \quad x > 5\}.$$

Se lee: "X es el conjunto de los x pertenecientes a $\mathbb{N}$ tales que x es mayor que 5".

A veces ocurre que ningún elemento de E goza de la propiedad P . En este caso, el conjunto $\{x \in E; \quad x \text{ goza de } P\}$ no posee ningún elemento alguno. Esto es lo que se llama un conjunto vacío. Para representarlo, usaremos el símbolo $\emptyset$.

Por lo tanto, el conjunto vacío $\emptyset$ se define así:

Cualquiera que sea x , se tiene $x \notin \emptyset$.

Por ejemplo, tenemos $\{x \in \mathbb{N}; 1 < x < 2\} = \emptyset$. Y también, $\{x; x \neq x\} = \emptyset$.

Dados los conjuntos A y B , decimos que A es subconjunto de B cuando todo elemento de A es también elemento de B . Para indicar este hecho, se usa la notación

$$A \subset B.$$

Cuando $A \subset B$, se dice también que A es parte de B , que A está incluido en B , o contenido en B . La relación $A \subset B$ se llama relación de inclusión.

Ejemplo 2. Los conjuntos numéricos $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{Q}$, presentados arriba, cumplen las relaciones de inclusión $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ y $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$. Abreviadamente, escribimos $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$.

Ejemplo 3. Sean X el conjunto de los cuadrados e Y el conjunto de los rectángulos. Todo cuadrado es un rectángulo, luego $X \subset Y$.

Cuando se escribe $X \subset Y$ no queda excluida la posibilidad de que resulte

$X = Y$. En el caso en que $X \subset Y$ y $X \neq Y$, se dice que X es una parte propia o un subconjunto propio de Y .

Afirmar $x \in X$ equivale a afirmar $\{x\} \subset X$.

Para mostrar que un conjunto X no es subconjunto de un conjunto Y , se debe obtener un elemento de X que no pertenezca a Y . Así, por ejemplo, no se tiene $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Z}$, pues $1/2 \in \mathbb{Q}$ y $1/2$ no es entero.

De ello se sigue que el conjunto vacío $\emptyset$ es subconjunto de cualquier conjunto X . En efecto, si no fuera $\emptyset \subset X$, existiría algún $x \in \emptyset$ tal que $x \notin X$. Como no existe $x \in \emptyset$, estamos obligados a admitir que

$$\emptyset \subset X,$$

sea cual sea el conjunto X .

La relación de inclusión $A \subset B$ es:

- Reflexiva – $A \subset A$, sea cual sea el conjunto A ;
- Antisimétrica – si $A \subset B$ y $B \subset A$, entonces $A = B$;
- Transitiva – si $A \subset B$ y $B \subset C$, entonces $A \subset C$.

La verificación de estos tres hechos es inmediata.

Se sigue de la propiedad antisimétrica que dos conjuntos A y B son iguales precisamente cuando $A \subset B$ y $B \subset A$, es decir, cuando poseen los mismos elementos.

Recordemos que, sean cuales fueren los significados de los símbolos E y D , el signo de igualdad en una expresión como $E = D$ significa que los símbolos E y D están siendo usados para representar el mismo objeto. En otras palabras, una cosa solo es igual a sí misma.

En el caso de conjuntos, escribir $A = B$ significa que A y B son el mismo con-

junto, o sea, que A y B poseen los mismos elementos. Siempre que tengamos que probar una igualdad entre conjuntos A y B , debemos demostrar primero que $A \subset B$ (esto es, que todo elemento de A pertenece necesariamente a B) y, después, que $B \subset A$.

Dado un conjunto X , se indica con $\mathcal{P}(X)$ el conjunto cuyos elementos son las partes de X . En otras palabras, afirmar que $A \in \mathcal{P}(X)$ es lo mismo que decir $A \subset X$. $\mathcal{P}(X)$ se llama el conjunto de las partes de X . Nunca es vacío: se tiene al menos $\emptyset \in \mathcal{P}(X)$ y $X \in \mathcal{P}(X)$.

Ejemplo 4. Sea $X = \{1, 2, 3\}$. Entonces

$$\mathcal{P}(X) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, X\}.$$

Sean P y Q propiedades que se refieren a elementos de un cierto conjunto E . Las propiedades P y Q definen subconjuntos X e Y de E , a saber:

$$X = \{x \in E ; \quad x \text{ goza de } P\} \quad \text{y} \quad Y = \{y \in E ; \quad y \text{ goza de } Q\}.$$

Las afirmaciones "P implica Q", "si P, entonces Q", "P acarrea Q", "P es condición suficiente para Q", "Q es condición necesaria para P" tienen todas el mismo significado. Quieren decir que $X \subset Y$, es decir, que todo objeto que goza de P también goza de Q. Para expresar este hecho, se usa la notación

$$P \Rightarrow Q.$$

También las afirmaciones "P si, y solo si, Q", "P es condición necesaria y suficiente para Q" tienen todas el mismo significado. Quieren decir que $P \Rightarrow Q$ y $Q \Rightarrow P$, o sea, que el conjunto X de los elementos que gozan de la propiedad P coincide con el conjunto Y de los elementos que gozan de Q .

La notación que expresa este hecho es


$$P \Leftrightarrow Q.$$

1.2. Operaciones entre conjuntos

La unión de los conjuntos A y B es el conjunto $A \cup B$, formado por los elementos de A más los elementos de B . Así, afirmar que $x \in A \cup B$ significa decir que al menos una de las siguientes afirmaciones es verdadera: $x \in A$ o $x \in B$. Podemos entonces escribir:

$$A \cup B = \{x ; \quad x \in A \text{ o } x \in B\}.$$

Al contrario del lenguaje vulgar, la palabra "o" se utiliza siempre en Matemáticas en el sentido amplio: al decir " $x \in A$ o $x \in B$ " se quiere afirmar que al menos una de esas dos alternativas es verdadera, sin quedar excluida la posibilidad de que ambas lo sean, es decir, de tenerse al mismo tiempo $x \in A$ y $x \in B$.




En la figura anterior, donde A y B son discos, la unión $A \cup B$ es la parte sombreada.

Sean cuales fueren los conjuntos A y B , se tiene $A \subset A \cup B$ y $B \subset A \cup B$.

La intersección de los conjuntos A y B es el conjunto $A \cap B$, formado por los elementos comunes a A y B . Así, afirmar que $x \in A \cap B$ significa decir que se tiene, al mismo tiempo, $x \in A$ y $x \in B$. Escribimos entonces

$$A \cap B = \{x ; \quad x \in A \text{ y } x \in B\}.$$

Puede ocurrir que no exista elemento alguno x tal que $x \in A$ y $x \in B$. En este caso, se tiene $A \cap B = \emptyset$ y los conjuntos A y B se dicen disjuntos.



En la figura anterior, los conjuntos A y B están representados por discos y la intersección $A \cap B$ es la parte sombreada.

Cualesquiera que sean los conjuntos A y B se tiene $A \cap B \subset A$ y $A \cap B \subset B$.

Ejemplo 5. Sean $A = \{x \in \mathbb{N}; x \leq 10\}$ y $B = \{x \in \mathbb{N}; x > 5\}$. Entonces $A \cup B = \mathbb{N}$ y $A \cap B = \{6, 7, 8, 9, 10\}$.

Ejemplo 6. Sean $A = \{x \in \mathbb{N}; x > 2\}$ el conjunto de los números naturales mayores que 2, y $B = \{x \in \mathbb{N}; x < 3\}$ el conjunto de los números naturales menores que 3. Entonces $A \cap B = \emptyset$, pues no existen números naturales x tales que $2 < x < 3$. Así los conjuntos A y B son disjuntos.

Relacionamos en las listas siguientes las principales propiedades formales de las operaciones de unión e intersección.

U1) $A \cup \emptyset = A$

- U2) $A \cup A = A$
- U3) $A \cup B = B \cup A$
- U4) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
- U5) $A \cup B = A \iff B \subset A$
- U6) $A \subset B, A' \subset B' \Rightarrow A \cup A' \subset B \cup B'$
- U7) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- I1) $A \cap \emptyset = \emptyset$
- I2) $A \cap A = A$
- I3) $A \cap B = B \cap A$
- I4) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
- I5) $A \cap B = A \iff A \subset B$
- I6) $A \subset B, A' \subset B' \Rightarrow A \cap A' \subset B \cap B'$
- I7) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$


La demostración de cualquiera de estas propiedades se reduce al manejo adecuado de los conectivos "y" y "o". En realidad, podemos interpretar las propiedades anteriores como reglas formales para el manejo de esos conectivos. Demostremos una de ellas, a modo de ejemplo.

Vamos a demostrar ahora U7. Primeramente probaremos que $A \cup (B \cap C) \subset (A \cup B) \cap (A \cup C)$. Dado $x \in A \cup (B \cap C)$, se tiene $x \in A$ o, entonces, $x \in B \cap C$. En el primer caso, viene $x \in A \cup B$ y $x \in A \cup C$, de donde $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. En el segundo caso tenemos $x \in B$ y $x \in C$. De $x \in B$ se sigue $x \in A \cup B$ y de $x \in C$ se concluye $x \in A \cup C$. Luego, $x \in A \cup B$ y $x \in A \cup C$, es decir, $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. En cualquier hipótesis, $x \in A \cup (B \cap C)$ implica $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. Esto quiere decir: $A \cup (B \cap C) \subset (A \cup B) \cap (A \cup C)$. Ahora mostraremos que $(A \cup B) \cap (A \cup C) \subset A \cup (B \cap C)$. Para esto, sea $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. Entonces $x \in A \cup B$ y $x \in A \cup C$. Dentro de esta situación, hay dos posibilidades: o $x \in A$ o $x \notin A$. Si $x \notin A$, entonces (como $x \in A \cup B$ y $x \in A \cup C$) debe ser $x \in B$ y $x \in C$, esto es, $x \in B \cap C$ y, por tanto, $x \in A \cup (B \cap C)$. Si $x \in A$ entonces evidentemente $x \in A \cup (B \cap C)$.

En cualquier hipótesis, $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ implica $x \in A \cup (B \cap C)$, o sea, $(A \cup B) \cap (A \cup C) \subset A \cup (B \cap C)$, como queríamos probar.

La diferencia entre los conjuntos A y B es el conjunto $A - B$, formado por los elementos de A que no pertenecen a B . En símbolos:

$$A - B = \{x ; \quad x \in A \text{ y } x \notin B\}.$$



En la figura anterior, donde los conjuntos A y B están representados por discos, la diferencia $A - B$ es la parte sombreada.

No se exige que B esté contenido en A para formar la diferencia $A - B$. Cuando A y B son disjuntos, ningún elemento de A pertenece a B ; por tanto, $A - B = A$. En cualquier caso, se tiene $A - B = A - (A \cap B)$.

Cuando se tiene $B \subset A$, la diferencia $A - B$ se llama el complementario de B en relación con A y se escribe

$$A - B = \mathcal{C}_A B.$$

Frecuentemente, se tiene un conjunto E que contiene todos los conjuntos que ocurren en una cierta discusión. En este caso, la diferencia $E - X$ se llama simplemente el complementario de X y se indica con la notación $\mathcal{C}X$.

Por ejemplo, en los capítulos siguientes estaremos estudiando subconjuntos

del conjunto $\mathbb{R}$, de los números reales. Dado $X \subset \mathbb{R}$, la diferencia $\mathbb{R} - X$ será llamada el complementario de X e indicada por el símbolo $\mathcal{C}X$, sin necesidad de mencionar explícitamente que se trata del complementario en relación con $\mathbb{R}$.

Confirmando: si nos restringimos a considerar elementos pertenecientes a un conjunto básico E , entonces

$$x \in \mathcal{C}X \iff x \notin X.$$

Ejemplo 7. Sean $A = \{x \in \mathbb{Z}; x \geq -3\}$ y $B = \{x \in \mathbb{Z}; x \leq 2\}$. Entonces $A - B = \{x \in \mathbb{Z}; x \geq 3\}$ y $B - A = \{x \in \mathbb{Z}; x \leq -4\}$. Tomando $\mathbb{Z}$ como conjunto básico, entonces $\mathcal{C}A = \{\text{enteros menores que } -3\}$ y $\mathcal{C}B = \{\text{enteros mayores que } 2\}$.

La noción de diferencia se reduce a la de complementario del siguiente modo: dados A y B , contenidos en un conjunto fundamental E , respecto del cual tomamos complementarios, tenemos:

$$A - B = A \cap \mathcal{C}B.$$

En efecto, $x \in A - B \iff x \in A \text{ y } x \notin B \iff x \in A \text{ y } x \in \mathcal{C}B \iff x \in A \cap \mathcal{C}B$.

Relacionamos a continuación las principales propiedades formales de la operación de tomar complementarios. Los conjuntos A y B son partes de un conjunto fundamental E , en relación con el cual estamos tomando los complementarios.

$$\text{C1) } \mathcal{C}(\mathcal{C}A) = A,$$

$$\text{C2) } A \subset B \iff \mathcal{C}B \subset \mathcal{C}A,$$

$$\text{C3) } A = \emptyset \iff \mathcal{C}A = E,$$

$$\text{C4) } \mathcal{C}(A \cup B) = \mathcal{C}A \cap \mathcal{C}B,$$

$$C5) \mathcal{C}(A \cap B) = \mathcal{C}A \cup \mathcal{C}B.$$

Demostraremos estas cinco propiedades.

C1) Tenemos $x \in \mathcal{C}(\mathcal{C}A) \Leftrightarrow x \notin \mathcal{C}A \Leftrightarrow x \in A$. Luego $\mathcal{C}(\mathcal{C}A) = A$.


C2) Supongamos $A \subset B$. Entonces un elemento $x \in \mathcal{C}B$ no puede pertenecer a B y, con mayor razón, no pertenecerá a A . Luego $x \in \mathcal{C}B \Rightarrow x \in \mathcal{C}A$, o sea $\mathcal{C}B \subset \mathcal{C}A$. Recíprocamente, si tenemos $\mathcal{C}B \subset \mathcal{C}A$ entonces, por lo que acabamos de ver, debe ser $\mathcal{C}(\mathcal{C}A) \subset \mathcal{C}(\mathcal{C}B)$. Usando C1, obtenemos $A \subset B$.

C3) $A = \emptyset \Leftrightarrow x \notin A$ para todo $x \in E \Leftrightarrow x \in \mathcal{C}A$ para todo $x \in E \Leftrightarrow \mathcal{C}A = E$.

C4) Como $A \subset A \cup B$ y $B \subset A \cup B$, se sigue de C2 que $\mathcal{C}(A \cup B) \subset \mathcal{C}A$ y $\mathcal{C}(A \cup B) \subset \mathcal{C}B$, de donde $\mathcal{C}(A \cup B) \subset \mathcal{C}A \cap \mathcal{C}B$. Sea $X = \mathcal{C}A \cap \mathcal{C}B$. Tenemos $X \subset \mathcal{C}A$ y $X \subset \mathcal{C}B$. Por C2, viene $A \subset \mathcal{C}X$ y $B \subset \mathcal{C}X$, de donde $A \cup B \subset \mathcal{C}X$. Por C2 y C1, viene $X \subset \mathcal{C}(A \cup B)$, es decir, $\mathcal{C}A \cap \mathcal{C}B \subset \mathcal{C}(A \cup B)$. Concluimos que $\mathcal{C}(A \cup B) = \mathcal{C}A \cap \mathcal{C}B$.

C5) Demostración análoga a C4.

Las propiedades anteriores muestran que, tomando complementarios, se invierten las inclusiones, se transforman uniones en intersecciones y viceversa.



En la figura de la izquierda, A es un disco, contenido en el rectángulo, que es el conjunto fundamental E . El complementario de A es la parte sombreada con líneas horizontales. En la figura de la derecha, A y B son discos. El complementario de A está sombreado con líneas horizontales y el complementario

de B con líneas verticales. Entonces $\mathcal{C}(A \cup B)$ es la parte cuadriculada, mientras que $\mathcal{C}(A \cap B)$ es la parte que tiene algún tipo de línea (vertical, horizontal o ambas). Esto muestra que $\mathcal{C}(A \cup B) = \mathcal{C}A \cap \mathcal{C}B$ y $\mathcal{C}(A \cap B) = \mathcal{C}A \cup \mathcal{C}B$.

Otra operación útil entre conjuntos es el producto cartesiano. Se basa en el concepto de par ordenado, que discutiremos ahora.

Dados los objetos a, b , el par ordenado (a, b) queda formado cuando se elige uno de esos objetos (a saber: a) para ser la primera coordenada del par y (consecuentemente) el objeto b para ser la segunda coordenada del par. Dos pares ordenados (a, b) y (a', b') serán llamados iguales cuando sus primeras coordenadas, a y a' , sean iguales y sus segundas coordenadas, b y b' , también. Así


$$(a, b) = (a', b') \iff a = a' \text{ y } b = b'.$$

No se debe confundir el par ordenado (a, b) con el conjunto $\{a, b\}$. En efecto, como dos conjuntos que poseen los mismos elementos son iguales, tenemos $\{a, b\} = \{b, a\}$, sean cuales fueren a y b . Por otro lado, por la definición de igualdad entre pares ordenados solo tenemos $(a, b) = (b, a)$ cuando $a = b$. Notemos además que $\{a, a\} = \{a\}$, mientras que (a, a) es un par ordenado legítimo.

El producto cartesiano de los conjuntos A y B es el conjunto $A \times B$ cuyos elementos son todos los pares ordenados (a, b) cuya primera coordenada pertenece a A y la segunda a B . Por tanto:

$$A \times B = \{(a, b) ; \quad a \in A \text{ y } b \in B\}.$$

Cuando $A = B$, tenemos el producto cartesiano $A^2 = A \times A$. El subconjunto $\Delta \subset A \times A$, formado por los pares (a, a) cuyas coordenadas son iguales, se llama la diagonal de A^2 .



En la figura de la izquierda, los conjuntos A y B están representados por segmentos y el producto cartesiano $A \times B$ por un rectángulo. A la derecha, tenemos el cuadrado $A \times A = A^2$, en el cual se destaca la diagonal Δ .

Ejemplo 8. Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{x, y\}$. Entonces

$$A \times B = \{(1, x), (1, y), (2, x), (2, y), (3, x), (3, y)\}$$

Ejemplo 9. La introducción de coordenadas cartesianas en el plano hace que cada punto sea representado por un par ordenado (x, y) , donde x es su abscisa e y su ordenada. Esto identifica el plano con el producto cartesiano $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, donde $\mathbb{R}$ es el conjunto de los números reales.

1.3. Funciones

Una función $f : A \rightarrow B$ consta de tres partes: un conjunto A , llamado el dominio de la función (o el conjunto donde la función está definida), un conjunto B , llamado el codominio de la función, o el conjunto donde la función toma valores, y una regla que permite asociar, de modo bien determinado, a cada elemento $x \in A$, un único elemento $f(x) \in B$, llamado el valor que la función asume en x (o en el punto x).

Se usa la notación $x \mapsto f(x)$ para indicar que f hace corresponder a x el valor $f(x)$.

Muchas veces se dice "la función f " en lugar de "la función $f : A \rightarrow B$ ". En este caso, quedan sobrentendidos el conjunto A , dominio de f , y el conjunto B , codominio de f .

No se debe confundir f con $f(x)$: f es la función, mientras que $f(x)$ es el valor que la función asume en un punto x de su dominio.

La naturaleza de la regla que enseña cómo obtener el valor $f(x) \in B$ cuando se da $x \in A$ es enteramente arbitraria, estando sujeta solo a dos condiciones:

1. No debe haber excepciones: para que f tenga el conjunto A como dominio, la regla debe proporcionar $f(x)$ para todo $x \in A$;
2. No debe haber ambigüedades: a cada $x \in A$, la regla debe hacer corresponder un único $f(x)$ en B .

Vemos que no existen funciones "plurívocas". Por la segunda condición, arriba, si $x = y$ en A , entonces $f(x) = f(y)$ en B .

Se deduce de las consideraciones anteriores que dos funciones $f : A \rightarrow B$ y $g : A' \rightarrow B'$ son iguales si, y solo si, $A = A'$, $B = B'$ y $f(x) = g(x)$ para todo $x \in A$. Es decir, dos funciones son iguales cuando tienen el mismo dominio, el mismo codominio y la misma regla de correspondencia.

Ejemplo 10. Sea P el conjunto de los polígonos del plano, $\mathbb{R}$ el conjunto de los números reales y $f : P \rightarrow \mathbb{R}$ la función que asocia a cada polígono x su área $f(x)$.

Ejemplo 11. Sean $A = B = \mathbb{Q}$. Intentemos definir una función $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ considerando la siguiente regla: a cada número $x \in \mathbb{Q}$, hagamos corresponder el número $f(x) \in \mathbb{Q}$ tal que $x \cdot f(x) = 1$. Esta regla no define una función de $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{Q}$, pues dado $0 \in \mathbb{Q}$, no existe número racional alguno $y = f(0)$ tal que

$0 \cdot y = 1$. Sin embargo, si elegimos el conjunto $A = \mathbb{Q} - \{0\}$ como dominio, la misma regla define la función $f : A \rightarrow \mathbb{Q}$, $f(x) = 1/x$.


Ejemplo 12. Sea T el conjunto de los triángulos del plano y $\mathbb{R}^+$ el conjunto de los números reales positivos. Consideremos el intento de definir una función $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow T$ mediante la siguiente regla: a cada número real $x > 0$ hagamos corresponder el triángulo $f(x)$ cuya área es x . Evidentemente, hay ambigüedades: dado un número real $x > 0$, existe una infinidad de triángulos cuyo área es x . La regla no define una función.

El gráfico de una función $f : A \rightarrow B$ es el subconjunto $G(f)$ del producto cartesiano $A \times B$ formado por los pares ordenados $(x, f(x))$, donde $x \in A$ es arbitrario. Es decir,

$$G(f) = \{(x, y) \in A \times B ; \quad y = f(x)\}.$$

Se sigue de la definición de igualdad entre funciones que dos funciones son iguales si, y solo si, poseen el mismo gráfico.

Para que un subconjunto $G \subset A \times B$ sea el gráfico de una función $f : A \rightarrow B$, es necesario y suficiente que, para cada $x \in A$, exista un único punto $(x, y) \in G$ cuya primera coordenada sea x . Para funciones $f : A \rightarrow B$, donde A y B son conjuntos de números reales, esta condición significa que toda paralela al eje de las ordenadas, trazada por un punto de A , debe cortar al gráfico G en uno y solo un punto.



En la figura de la izquierda tenemos el gráfico de una función $f : A \rightarrow B$. La figura de la derecha muestra un subconjunto de $A \times B$ que no puede ser gráfico de una función de A en B .

Una función $f : A \rightarrow B$ se llama *inyectiva* (o *biunívoca*) cuando, dados x, y cualesquiera en A , $f(x) = f(y)$ implica $x = y$. En otras palabras: cuando $x \neq y$ en A implica $f(x) \neq f(y)$ en B .

El ejemplo más simple de una función inyectiva es la inclusión $i : A \rightarrow B$, definida cuando A es un subconjunto de B , por la regla $i(x) = x$, para todo $x \in A$.

Una función $f : A \rightarrow B$ se llama *sobreyectiva* (o *sobre B*) cuando, para todo $y \in B$ existe al menos un $x \in A$ tal que $f(x) = y$.

Ejemplos de funciones sobreyectivas son las proyecciones $\pi_1 : A \times B \rightarrow A$ y $\pi_2 : A \times B \rightarrow B$, de un producto cartesiano $A \times B$ en los factores A y B , respectivamente. La primera proyección, π_1 , se define por $\pi_1(a, b) = a$, mientras que la segunda proyección, π_2 , se define por $\pi_2(a, b) = b$.

Ejemplo 13. Sea $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por $f(x) = x^2$. Entonces f no es inyectiva, pues $f(-3) = f(3)$, aunque $-3 \neq 3$. Tampoco f es sobreyectiva, pues no existe $x \in \mathbb{Z}$ tal que $x^2 = -1$. Por otro lado, si tomamos $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, definida por $g(x) = 3x + 1$, entonces g es inyectiva. De hecho, si $g(x) = g(y)$ entonces $3x + 1 = 3y + 1$, o sea, $3x = 3y$, de donde $x = y$. Pero g no es

sobreyectiva, pues no existe un entero x tal que $3x + 1 = 0$, por ejemplo. Finalmente, sea $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definida así: $h(1) = 1$ y, para cada número natural $x > 1$, $h(x)$ es el número de factores primos distintos que entran en la composición de x . Entonces h es sobreyectiva, pues $h(2) = 1$, $h(6) = 2$, $h(30) = 3$, $h(210) = 4$, etc. Pero es claro que h no es inyectiva. Por ejemplo, si x e y son dos números primos cualesquiera, se tiene $h(x) = h(y)$.

Ejemplo 14. La verificación de que una función es sobreyectiva implica demostrar la existencia de objetos que satisfacen ciertas condiciones. Por ejemplo, sea $\mathbb{R}^+$ el conjunto de los números reales positivos. Consideremos la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$, definida por $f(x) = x^2$. Decir que f es sobreyectiva significa afirmar que, para todo número real $y > 0$ existe algún número real x tal que $y = x^2$, o sea, que todo número real positivo y posee una raíz cuadrada x . (Esto será probado cuando estudiemos los números reales.) Otro ejemplo: sea p un polinomio no constante, de coeficientes complejos. A cada número complejo z asociemos el valor $p(z)$ del polinomio p . Esto define una función $p : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, donde $\mathbb{C}$ es el conjunto de los números complejos. La afirmación de que p es una función sobreyectiva es equivalente al llamado "Teorema Fundamental del Álgebra" (un teorema de Topología, según el cual todo polinomio complejo no constante posee al menos una raíz compleja). En efecto, admitiendo que $p : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ es sobreyectiva, dado $0 \in \mathbb{C}$, debe existir algún $z \in \mathbb{C}$ tal que $p(z) = 0$. El número z es, por tanto, una raíz de p . Recíprocamente, admitiendo que todo polinomio no constante posee una raíz compleja, probamos que $p : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ es sobreyectiva. En efecto, dado $c \in \mathbb{C}$, la función $z \mapsto p(z) - c$ es un polinomio no constante, luego existe algún $z_0 \in \mathbb{C}$ tal que $p(z_0) - c = 0$. Se tiene $p(z_0) = c$, de donde p es sobreyectiva.

Una función $f : A \rightarrow B$ se llama biyectiva (una biyección, o una correspondencia biunívoca) cuando es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo.

La más simple de las biyecciones es la función identidad $\text{id}_A : A \rightarrow A$, definida por $\text{id}_A(x) = x$, para todo $x \in A$. Cuando no haya peligro de confusión,

escribiremos simplemente $\text{id} : A \rightarrow A$, en lugar de id_A .

Por ejemplo, dados arbitrariamente a, b en $\mathbb{Q}$, con $a \neq 0$, la función $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$, definida por $f(x) = ax + b$, es una biyección. En efecto, si $f(x) = f(y)$, es decir, $ax + b = ay + b$ entonces, sumando $-b$ a ambos miembros, viene $ax = ay$. Multiplicando ambos miembros por $1/a$, obtenemos $x = y$. Así, f es inyectiva. Además, dado $y \in \mathbb{Q}$ cualquiera, el número racional $x = (y - b)/a$ es tal que $ax + b = y$, esto es, $f(x) = y$, de donde f es sobreyectiva.

Dadas una función $f : A \rightarrow B$ y una parte $X \subset A$, se llama imagen de X por la función f al conjunto $f(X)$ formado por los valores $f(x)$ que f asume en los puntos $x \in X$. Así

$$f(X) = \{f(x) ; \quad x \in X\} = \{y \in B ; \quad y = f(x), \quad x \in X\}.$$

Evidentemente, $f(X)$ es un subconjunto de B . Para que $f : A \rightarrow B$ sea sobreyectiva es necesario y suficiente que $f(A) = B$. En general, se tiene solo $f(A) \subset B$. El conjunto $f(A)$ se llama la imagen de la función f . A veces también se dice que $f(A)$ es el conjunto de los valores de f .

Dada una función $f : A \rightarrow B$ e indicando con $X, Y, \dots$ subconjuntos de A , tenemos

$$\text{I1) } f(X \cup Y) = f(X) \cup f(Y),$$

$$\text{I2) } f(X \cap Y) \subset f(X) \cap f(Y),$$

$$\text{I3) } X \subset Y \Rightarrow f(X) \subset f(Y),$$

$$\text{I4) } f(\emptyset) = \emptyset.$$

Demostremos las dos primeras de estas relaciones.

I1) Si $y \in f(X \cup Y)$, entonces existe $x \in X \cup Y$ tal que $f(x) = y$. Si $x \in X$, tenemos $y \in f(X)$. Si, en cambio, $x \in Y$, tenemos $y \in f(Y)$. En cualquier caso, $y \in f(X) \cup f(Y)$. Luego $f(X \cup Y) \subset f(X) \cup f(Y)$.

Recíprocamente, sea $z \in f(X) \cup f(Y)$. Entonces $z \in f(X)$ o $z \in f(Y)$. En el primer caso, existe $x \in X$ tal que $z = f(x)$. En el segundo, existe $y \in Y$ tal que $z = f(y)$. En cualquier hipótesis, existe $w \in X \cup Y$ tal que $z = f(w)$. Así $z \in f(X \cup Y)$, esto es, $f(X) \cup f(Y) \subset f(X \cup Y)$. Estas dos inclusiones muestran que $f(X \cup Y) = f(X) \cup f(Y)$.

I2) Si $y \in f(X \cap Y)$ entonces existe $x \in X \cap Y$ tal que $f(x) = y$. Entonces $x \in X$ y por tanto $y \in f(X)$. También $x \in Y$ y por tanto $y \in f(Y)$. Luego $y \in f(X) \cap f(Y)$.

Ejemplo 15. Sea $\mathbb{R}$ el conjunto de los números reales. Definimos $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ poniendo $f(x) = x^2$. Entonces la imagen de f , o sea, el conjunto $f(\mathbb{R})$, es el conjunto de los números reales ≥ 0 . (Aquí estamos haciendo uso del hecho, que se demostrará más adelante, de que todo número real positivo posee una raíz cuadrada).

Ejemplo 16. Sea $f : A \rightarrow B$ una función que no es inyectiva. Entonces existen $x \neq y$ en A , con $f(x) = f(y)$. Pongamos $X = \{x\}$ e $Y = \{y\}$. Se tiene $X \cap Y = \emptyset$, luego $f(X \cap Y) = \emptyset$. Sin embargo $f(X) \cap f(Y) = \{f(x)\}$ no es vacío. Luego, en este caso, tenemos $f(X \cap Y) \neq f(X) \cap f(Y)$.

Si, en cambio, $f : A \rightarrow B$ es inyectiva, podemos probar que $f(X \cap Y) = f(X) \cap f(Y)$ para cualesquiera X, Y contenidos en A .

En efecto, dado $y \in f(X) \cap f(Y)$, tenemos $y \in f(X)$ e $y \in f(Y)$. Luego existen $x' \in X$ y $x'' \in Y$ con $y = f(x')$ y $y = f(x'')$. Como f es inyectiva, debe ser $x' = x''$ y por tanto $x' \in X \cap Y$. Se sigue que $y = f(x')$ pertenece a $f(X \cap Y)$, lo que muestra que $f(X) \cap f(Y) \subset f(X \cap Y)$. Como la inclusión opuesta es siempre verdadera, concluimos que $f(X \cap Y) = f(X) \cap f(Y)$.

En resumen, para que se tenga $f(X \cap Y) = f(X) \cap f(Y)$ para cualesquiera X, Y contenidos en A , es necesario y suficiente que la función $f : A \rightarrow B$ sea inyectiva.

Dada una función $f : A \rightarrow B$, consideremos un conjunto $Y \subset B$. La imagen inversa de Y por la función f es el conjunto $f^{-1}(Y)$, formado por todos los $x \in A$ tales que $f(x) \in Y$. Así:

$$f^{-1}(Y) = \{x \in A ; \quad f(x) \in Y\}.$$

Nótese que puede ocurrir $f^{-1}(Y) = \emptyset$ incluso si $Y \subset B$ es un subconjunto no vacío. Esto sucede precisamente cuando $Y \cap f(A) = \emptyset$, es decir, cuando Y no tiene puntos en común con la imagen de f . En particular, f no es sobreyectiva. Dado $y \in B$, escribimos $f^{-1}(y)$ en lugar de $f^{-1}(\{y\})$. Puede ocurrir que $f^{-1}(y)$ posea más de un elemento, pues f puede no ser inyectiva.

Ejemplo 17. Los subconjuntos del plano definidos en Geometría Analítica mediante ecuaciones y desigualdades son imágenes inversas de conjuntos. Por ejemplo, la recta que tiene la ecuación $ax + by = c$ es el conjunto $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; \quad ax + by = c\}$. Consideremos la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(x, y) = ax + by$. Entonces la recta X es la imagen inversa del conjunto $\{c\}$ por f , o sea, $X = f^{-1}(c)$. También la circunferencia cuya ecuación es $x^2 + y^2 = 1$ (centro en el origen y radio 1) es el conjunto $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; \quad x^2 + y^2 = 1\}$. Tomemos la función $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $g(x, y) = x^2 + y^2$. Tenemos $C = g^{-1}(1)$.

Ahora consideremos el disco D de centro en el origen y radio 1. Tenemos $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; \quad x^2 + y^2 \leq 1\}$. Sea $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, nuevamente, la función definida por $g(x, y) = x^2 + y^2$. Tomemos el intervalo $I = [0, 1] = \{t \in \mathbb{R} ; \quad 0 \leq t \leq 1\}$. Entonces el disco D es la imagen inversa del intervalo I por la función g : $D = g^{-1}(I)$.

Las imágenes inversas se comportan bien relativamente a las operaciones con conjuntos. En la relación siguiente, Y y Z indican subconjuntos de B . Dada una función $f : A \rightarrow B$, tenemos

$$\text{Inv1)} \quad f^{-1}(Y \cup Z) = f^{-1}(Y) \cup f^{-1}(Z),$$

$$\text{Inv2)} \quad f^{-1}(Y \cap Z) = f^{-1}(Y) \cap f^{-1}(Z),$$

$$\text{Inv3)} \quad f^{-1}(\mathcal{C}Y) = \mathcal{C}f^{-1}(Y),$$

$$\text{Inv4)} \quad Y \subset Z \Rightarrow f^{-1}(Y) \subset f^{-1}(Z),$$

$$\text{Inv5)} \quad f^{-1}(B) = A,$$

$$\text{Inv6)} \quad f^{-1}(\emptyset) = \emptyset.$$

Vamos a demostrar las tres primeras.

$$\text{Inv1)} \quad \text{Tenemos } x \in f^{-1}(Y \cup Z) \iff f(x) \in Y \cup Z \iff f(x) \in Y \text{ o } f(x) \in Z \iff x \in f^{-1}(Y) \text{ o } x \in f^{-1}(Z) \iff x \in f^{-1}(Y) \cup f^{-1}(Z).$$

$$\text{Inv2)} \quad x \in f^{-1}(Y \cap Z) \iff f(x) \in Y \cap Z \iff f(x) \in Y \text{ y } f(x) \in Z \iff x \in f^{-1}(Y) \text{ y } x \in f^{-1}(Z) \iff x \in f^{-1}(Y) \cap f^{-1}(Z).$$

$$\text{Inv3)} \quad x \in f^{-1}(\mathcal{C}Y) \iff f(x) \in \mathcal{C}Y \iff f(x) \notin Y \iff x \notin f^{-1}(Y) \iff x \in \mathcal{C}f^{-1}(Y).$$

1.4. Composición de funciones

Sean $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$ funciones tales que el dominio de g es igual al codominio de f . En este caso, podemos definir la función compuesta $g \circ f : A \rightarrow C$, que consiste en aplicar primero f y después g . Más precisamente,

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) \quad \text{para todo } x \in A.$$

Dadas $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$ y $h : C \rightarrow D$, vale la ley asociativa

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f) : A \rightarrow D.$$

En efecto, para todo $x \in A$, tenemos:

$$[(h \circ g) \circ f](x) = (h \circ g)(f(x)) = h[g(f(x))] = h[(g \circ f)(x)] = [h \circ (g \circ f)](x).$$

Observamos que, más generalmente, basta que la imagen $f(A)$ de la función f esté contenida en el dominio de g para que la definición $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ tenga sentido y proporcione la función compuesta $g \circ f : A \rightarrow C$.

Si $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$ son inyectivas, entonces $g \circ f : A \rightarrow C$ es inyectiva. También la compuesta de funciones sobreyectivas es sobreyectiva. En particular, la compuesta de dos biyecciones es una biyección. Estos hechos son de verificación inmediata.

Por otro lado, cualquier función $f : A \rightarrow B$ puede escribirse como compuesta $f = h \circ f_1$ de una función inyectiva h con una función sobreyectiva. Basta considerar $f_1 : A \rightarrow f(A)$, definida por $f_1(x) = f(x)$, y la inclusión $h : f(A) \rightarrow B$.

También podemos escribir cualquier función $f : A \rightarrow B$ como compuesta $f = \pi \circ F$ de una función sobreyectiva π con una función inyectiva F . Basta tomar $F : A \rightarrow A \times B$, donde $F(x) = (x, f(x))$ y $\pi : A \times B \rightarrow B$, con $\pi(x, y) = y$ (segunda proyección).

Sean $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$ funciones. Dado $X \subset A$, se tiene $(g \circ f)(X) = g(f(X))$. Si $Z \subset C$, tenemos $(g \circ f)^{-1}(Z) = f^{-1}(g^{-1}(Z))$.

Probemos esta última relación. Para $x \in A$, tenemos:

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(g^{-1}(Z)) &\iff f(x) \in g^{-1}(Z) \\ &\iff g(f(x)) \in Z \\ &\iff (g \circ f)(x) \in Z \\ &\iff x \in (g \circ f)^{-1}(Z) \end{aligned}$$

La restricción de una función $f : A \rightarrow B$ a un subconjunto $X \subset A$ es la función $f|_X : X \rightarrow B$, definida por $(f|_X)(x) = f(x)$ para todo $x \in X$.

Considerando la inclusión $i : X \rightarrow A$, tenemos $f|_X = f \circ i : X \rightarrow B$.

Dado $X \subset A$, si $g : X \rightarrow B$ es la restricción de una función $f : A \rightarrow B$ al conjunto X , se dice también que f es una extensión de g . Extender una función $g : X \rightarrow B$ al conjunto $A \supset X$ es, por tanto, obtener una función $f : A \rightarrow B$ que coincida con g en X , esto es, tal que $f|_X = g$. Evidentemente hay, en general, diversas extensiones de la misma función g .

Un gran número de problemas matemáticos importantes se reducen a extender una o varias funciones de modo que las extensiones satisfagan ciertas condiciones adicionales (continuidad, analiticidad, etc.). La función que se desea extender se llama la "condición de contorno".

Dadas las funciones $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow A$, diremos que g es una inversa a la izquierda para f cuando $g \circ f = \text{id}_A : A \rightarrow A$, es decir, cuando $g(f(x)) = x$ para todo $x \in A$.

Por ejemplo, sean A el conjunto de los números reales ≥ 0 y $\mathbb{R}$ el conjunto de todos los números reales. Consideremos $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(x) = x^2$, y $g : \mathbb{R} \rightarrow A$, definida por $g(y) = \sqrt{y}$ si $y \geq 0$ y $g(y) = 0$ si $y < 0$. Para todo $x \in A$, tenemos $g(f(x)) = g(x^2) = \sqrt{x^2} = x$. Luego $g \circ f = \text{id}_A$ y, por tanto, g es una inversa a la izquierda de f . Nótese que cualquier función $h : \mathbb{R} \rightarrow A$, tal que $h(y) = \sqrt{y}$ para $y \geq 0$, es una inversa a la izquierda de f . (La definición de los valores $h(y)$ para $y < 0$ puede ser cualquiera, sin que quede afectada la igualdad $h \circ f = \text{id}_A$).

Una función $f : A \rightarrow B$ posee inversa a la izquierda si, y solo si, es inyectiva.

Demostración. Si f es inyectiva, para cada $y \in f(A)$ existe un único $x \in A$ tal que $y = f(x)$. Escribamos $x = g(y)$. Esto define una función $g : f(A) \rightarrow A$ tal que $g(f(x)) = x$ para todo $x \in A$. Completamos la definición de $g : B \rightarrow A$ poniendo, por ejemplo, $g(y) = x_0$ (elemento que fijamos en A) para $y \in B - f(A)$. Obtenemos $g : B \rightarrow A$ tal que $g \circ f = \text{id}_A$. Recíprocamente,

si existe $g : B \rightarrow A$ tal que $g \circ f = \text{id}_A$ entonces, dados x', x'' en A , $f(x') = f(x'') \Rightarrow x' = g(f(x')) = g(f(x'')) = x''$, y por tanto, f es inyectiva.

Una función $g : B \rightarrow A$ se llama inversa a la derecha de una función $f : A \rightarrow B$ cuando $f \circ g = \text{id}_B : B \rightarrow B$, es decir, cuando $f(g(y)) = y$ para todo $y \in B$.

Por ejemplo, sea $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definida por $f(1) = 1$ y, si $x > 1$, $f(x)$ = número de factores primos distintos que entran en la composición de x . Definamos $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ poniendo $g(y)$ = menor número natural que es el producto de y factores primos distintos. Entonces, para todo número natural y , tenemos $f(g(y)) = y$. Luego $f \circ g = \text{id}_{\mathbb{N}}$ y, por tanto, g es una inversa a la derecha para f . Otras funciones $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ podrían definirse con la propiedad $f \circ h = \text{id}_{\mathbb{N}}$. Por ejemplo, podríamos poner $h(y)$ = menor número natural divisible por 13 que es el producto de y factores primos distintos.

Una función $f : A \rightarrow B$ posee inversa a la derecha si, y solo si, es sobreyectiva.

Demostración. Sea $f : A \rightarrow B$ sobreyectiva. Entonces, para cada $y \in B$, el conjunto $f^{-1}(y)$ no es vacío. Elijamos, para cada $y \in B$, un $x \in A$ tal que $f(x) = y$ y pongamos $g(y) = x$. Esto define una función $g : B \rightarrow A$ tal que $f(g(y)) = y$. Luego g es una inversa a la derecha de f . Recíprocamente, si existe $g : B \rightarrow A$ con $f \circ g = \text{id}_B$ entonces, para cada $y \in B$, poniendo $x = g(y)$, tenemos $f(x) = f(g(y)) = y$. Luego f es sobreyectiva.

Una función $g : B \rightarrow A$ se llama inversa de la función $f : A \rightarrow B$ cuando $g \circ f = \text{id}_A$ y $f \circ g = \text{id}_B$, es decir, cuando g es inversa a izquierda y a la derecha para f .

Por ejemplo, sea a un número racional $\neq 0$ y definamos $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ poniendo $f(x) = ax$. La función $g : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$, definida por $g(x) = x/a$, es inversa de f .

Otro ejemplo: dada una función arbitraria $f : A \rightarrow B$, sea $G(f)$ el gráfico de f . (Recordemos que $G(f)$ es el subconjunto de $A \times B$ formado por los

pares ordenados $(x, f(x))$, donde x recorre A .) Definimos una función $F : A \rightarrow G(f)$ poniendo $F(x) = (x, f(x))$. Sea $\pi : G(f) \rightarrow A$ definida por $\pi(x, f(x)) = x$. (Evidentemente, $\pi = \pi_1|_{G(f)}$ es la restricción a $G(f)$ de la primera proyección $\pi_1 : A \times B \rightarrow A$.) Entonces $F \circ \pi = \text{id}_{G(f)}$ y $\pi \circ F = \text{id}_A$, como se ve fácilmente. Por tanto π es inversa de F .

Se sigue de las dos proposiciones anteriores que una función $f : A \rightarrow B$ posee inversa si, y solo si, es una biyección.

Al contrario de las inversas de un solo lado, si una función $f : A \rightarrow B$ posee una inversa, ella es única.

En efecto, supongamos que $g : B \rightarrow A$ y $h : B \rightarrow A$ sean ambas inversas de f . Entonces $h = h \circ \text{id}_B = h \circ (f \circ g) = (h \circ f) \circ g = \text{id}_A \circ g = g$.

El lector atento habrá notado que probamos arriba un poco más de lo enunciado, a saber: si f posee una inversa a la izquierda, h , y una inversa a la derecha, g , entonces $h = g$ y f tiene una inversa.

Escribiremos $f^{-1} : B \rightarrow A$ para indicar la inversa de la biyección $f : A \rightarrow B$.

Evidentemente, si $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$ son biyecciones, se tiene $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

1.5. Familias

Una familia es una función cuyo valor en un punto x se indica con f_x en lugar de $f(x)$.

Pasemos a las definiciones formales. Sea L un conjunto, cuyos elementos llamaremos índices y representaremos genéricamente por λ .

Dado un conjunto X , una familia de elementos de X con índices en L es una función $x : L \rightarrow X$. El valor de x en el punto $\lambda \in L$ se indicará con el

símbolo x_λ , en lugar de la notación usual $x(\lambda)$. La familia x se representa por la notación $(x_\lambda)_{\lambda \in L}$ o simplemente (x_λ) cuando no haya duda sobre el conjunto de índices L .

Tomemos, por ejemplo, $L = \{1, 2\}$ como conjunto de índices. Dado un conjunto X , una familia de elementos de X con índices en L es una función $x : \{1, 2\} \rightarrow X$. Los valores de esta función en los puntos 1 y 2 se representan por x_1 y x_2 . Se obtiene así un par ordenado (x_1, x_2) de elementos de X . Recíprocamente, todo par ordenado (x_1, x_2) de elementos de X es una familia $x : \{1, 2\} \rightarrow X$. En suma, los pares ordenados de elementos de X son las familias de elementos de X con índices en el conjunto $L = \{1, 2\}$. Es decir, el producto cartesiano $X^2 = X \times X$ es el conjunto de las funciones (familias) $x : \{1, 2\} \rightarrow X$. Más generalmente, dados los conjuntos X_1 y X_2 , el producto cartesiano $X_1 \times X_2$ es el conjunto de las familias $x : \{1, 2\} \rightarrow X_1 \cup X_2$ tales que $x_1 \in X_1$ y $x_2 \in X_2$.

Cuando $L = \{1, 2, \dots, n\}$ es el conjunto de los números naturales desde 1 hasta n , una familia $x : L \rightarrow X$ se llama una n -upla de elementos de X . Una n -upla $x = (x_i)_{i \in L}$ se representa comúnmente por la notación $x = (x_1, \dots, x_n)$. El elemento x_i se llama la i -ésima coordenada de la n -upla $x = (x_1, \dots, x_n)$.

Sea $(A_\lambda)_{\lambda \in L}$ una familia de conjuntos con índices en L . (Esto quiere decir: a cada $\lambda \in L$ hacemos corresponder un conjunto A_λ .) La unión de esa familia es el conjunto de los elementos que pertenecen al menos a uno de los conjuntos A_λ . Se representa por la notación $\bigcup_{\lambda \in L} A_\lambda$ o, simplemente, $\bigcup A_\lambda$. Así

$$\bigcup_{\lambda \in L} A_\lambda = \{x ; \text{ existe } \lambda \in L \text{ con } x \in A_\lambda\}.$$

En otras palabras, $\bigcup A_\lambda$ es el conjunto de los elementos que pertenecen a algún A_λ .

Análogamente, la intersección de la familia $(A_\lambda)_{\lambda \in L}$ es el conjunto de los elementos que pertenecen simultáneamente a todos los A_λ .

Notación: $\bigcap_{\lambda \in L} A_\lambda$ o simplemente $\bigcap A_\lambda$. Por tanto,

$$\bigcap_{\lambda \in L} A_\lambda = \{x ; \quad x \in A_\lambda \text{ para todo } \lambda \in L\}.$$

Cuando $L = \{1, 2, \dots, n\}$, se escribe

$$\bigcup_{i \in L} A_i = \bigcup_{i=1}^n A_i = A_1 \cup \dots \cup A_n,$$

$$\bigcap_{i \in L} A_i = \bigcap_{i=1}^n A_i = A_1 \cap \dots \cap A_n.$$

Una familia con índices en el conjunto $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$ de los números naturales se llama una sucesión. Así, una sucesión $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$ de elementos de un conjunto X es una función $x : \mathbb{N} \rightarrow X$, donde el valor $x(n)$ se indica con el símbolo x_n y se llama el n -ésimo término de la sucesión.

Dada una sucesión de conjuntos $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$, su unión y su intersección se representan por

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \cup \dots,$$

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n \cap \dots.$$

Ejemplo 18. Para cada $n \in \mathbb{N}$, consideremos el conjunto

$$A_n = \{-n, -n+1, \dots, -1, 0, 1, \dots, n-1, n\}.$$

Entonces

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \mathbb{Z} \quad \text{y} \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{-1, 0, 1\},$$

como se ve fácilmente.

Dada una familia $(A_\lambda)_{\lambda \in L}$ de subconjuntos de un conjunto fundamental E , se tiene

$$\mathcal{C}\left(\bigcup A_\lambda\right) = \bigcap \mathcal{C}A_\lambda$$

y

$$\mathcal{C}\left(\bigcap A_\lambda\right) = \bigcup \mathcal{C}A_\lambda.$$

En efecto, dado $x \in E$, tenemos sucesivamente $x \in \mathcal{C}(\bigcup A_\lambda) \iff x \notin \bigcup A_\lambda \iff$ no existe $\lambda \in L$ tal que $x \in A_\lambda \iff x \notin A_\lambda$ para todo $\lambda \in L \iff x \in \mathcal{C}A_\lambda$ para todo $\lambda \in L \iff x \in \bigcap \mathcal{C}A_\lambda$.

Esto prueba la primera igualdad. La segunda es consecuencia, teniendo en cuenta que $\mathcal{C}(\mathcal{C}X) = X$. En efecto, si escribimos $\mathcal{C}A_\lambda = B_\lambda$, tenemos $\mathcal{C}B_\lambda = A_\lambda$. Luego

$$\mathcal{C}\left(\bigcap A_\lambda\right) = \mathcal{C}\left(\bigcap \mathcal{C}B_\lambda\right) = \mathcal{C}\left(\mathcal{C}\left(\bigcup B_\lambda\right)\right) = \bigcup B_\lambda = \bigcup \mathcal{C}A_\lambda.$$

Ejemplo 19. Sea $(A_\lambda)_{\lambda \in L}$ una familia de subconjuntos de un conjunto E . Afirmar que $\bigcup A_\lambda = E$ equivale a decir que, para todo elemento $x \in E$ existe al menos un $\lambda \in L$ tal que $x \in A_\lambda$. Sea $B_\lambda = \mathcal{C}A_\lambda$. Se tiene $\bigcup A_\lambda = E$ si, y solo si, la intersección de los B_λ es vacía, esto es, $\bigcap B_\lambda = \emptyset$. En efecto, por lo que vimos $\bigcap B_\lambda = \mathcal{C}(\bigcup A_\lambda)$.

Dada una función $f : A \rightarrow B$, consideremos una familia $(A_\lambda)_{\lambda \in L}$ de subconjuntos de A , y una familia $(B_\mu)_{\mu \in M}$ de subconjuntos de B . Se tiene

$$f\left(\bigcup A_\lambda\right) = \bigcup f(A_\lambda),$$

$$\begin{aligned}
f\left(\bigcap A_\lambda\right) &\subset \bigcap f(A_\lambda), \\
f^{-1}\left(\bigcup B_\mu\right) &= \bigcup f^{-1}(B_\mu), \\
f^{-1}\left(\bigcap B_\mu\right) &= \bigcap f^{-1}(B_\mu).
\end{aligned}$$

Probemos la primera y la última de estas afirmaciones. Dado $y \in B$, tenemos:

$$\begin{aligned}
y \in f\left(\bigcup A_\lambda\right) &\iff \text{existe } x \in \bigcup A_\lambda \text{ tal que } y = f(x) \\
&\iff \text{existen } \lambda \in L \text{ y } x \in A_\lambda \text{ con } y = f(x) \\
&\iff \text{existe } \lambda \in L \text{ tal que } y \in f(A_\lambda) \\
&\iff y \in \bigcup f(A_\lambda).
\end{aligned}$$

Dado $x \in A$, tenemos

$$\begin{aligned}
x \in f^{-1}(\cap B_\mu) &\iff f(x) \in \cap B_\mu \iff f(x) \in B_\mu \text{ para todo } \mu \in M \\
&\iff x \in f^{-1}(B_\mu) \text{ para todo } \mu \in M \iff x \in \cap f^{-1}(B_\mu).
\end{aligned}$$

La noción de familia permite considerar productos cartesianos de una cantidad arbitraria de conjuntos.

Dados los conjuntos $A_1, \dots, A_n$, su producto cartesiano

$$A = A_1 \times \dots \times A_n = \prod_{i=1}^n A_i$$

es el conjunto formado por todas las n -uplas $a = (a_1, \dots, a_n)$ tales que $a_1 \in A_1, \dots, a_n \in A_n$.

En otras palabras, $A_1 \times \dots \times A_n$ es el conjunto de todas las funciones $a :$

$\{1, 2, \dots, n\} \rightarrow A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ tales que $a(i) = a_i \in A_i$ para $i = 1, 2, \dots, n$.

Esta definición extiende la del producto cartesiano $A \times B$.

Cuando $A_1 = \dots = A_n = A$, el producto cartesiano $A \times \dots \times A$ de n copias de A se indica con A^n . Consiste en todas las funciones $a : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow A$, es decir, de todas las n -uplas de elementos de A .

En el producto cartesiano $A = A_1 \times \dots \times A_n$, destacan las proyecciones $\pi_1 : A \rightarrow A_1, \pi_2 : A \rightarrow A_2, \dots, \pi_n : A \rightarrow A_n$. La i -ésima proyección $\pi_i : A \rightarrow A_i$ se define poniendo $\pi_i(a) = a_i = i$ -ésima coordenada de la n -upla $a = (a_1, \dots, a_n)$. Dados $a = (a_1, \dots, a_n)$ y $b = (b_1, \dots, b_n)$ en $A_1 \times \dots \times A_n$, se tiene $a = b$ si, y solo si, $\pi_i(a) = \pi_i(b)$ para cada $i = 1, \dots, n$.

Sea $X \subset A_1 \times \dots \times A_n$. Los elementos $x = (x_1, \dots, x_n)$ de X poseen n coordenadas. Las funciones $f : X \rightarrow B$, definidas en X , pueden ser pensadas como funciones de n variables (la primera variable estando en A_1 , la segunda en A_2 , etc.) En particular, introduciendo coordenadas cartesianas en el plano, este se identifica con el producto cartesiano $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Las funciones $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, definidas en subconjuntos $X \subset \mathbb{R}^2$, son las funciones reales de dos variables reales.

Dada una familia de conjuntos $(A_\lambda)_{\lambda \in L}$, su producto cartesiano

$$A = \prod_{\lambda \in L} A_\lambda$$

es el conjunto de las familias $(a_\lambda)_{\lambda \in L}$ tales que, para cada $\lambda \in L$, se tiene $a_\lambda \in A_\lambda$.

En otras palabras, A es el conjunto de todas las funciones $a : L \rightarrow \bigcup A_\lambda$ tales que $a(\lambda) = a_\lambda \in A_\lambda$ para cada $\lambda \in L$.

Las proyecciones $\pi_\lambda : A \rightarrow A_\lambda$ se definen por $\pi_\lambda(a) = a_\lambda$. Cada proyección π_λ

es una función sobreyectiva. Dada una función $f : X \rightarrow \prod A_\lambda$, de un conjunto cualquiera X en el producto cartesiano de los A_λ , se obtiene, para cada $\lambda \in L$, una función $f_\lambda : X \rightarrow A_\lambda$, dada por $f_\lambda = \pi_\lambda \circ f$. Así, $f(x) = (f_\lambda(x))_{\lambda \in L}$ para cada $x \in X$. Recíprocamente, si se da, para cada $\lambda \in L$, una función $f_\lambda : X \rightarrow A_\lambda$, entonces existe una única $f : X \rightarrow \prod A_\lambda$ tal que $f_\lambda = \pi_\lambda \circ f$ para cada $\lambda \in L$. Basta poner $f(x) = (f_\lambda(x))_{\lambda \in L}$ para cada $x \in X$. Las funciones f_λ se llaman las coordenadas de f .

En el caso particular en que todos los conjuntos A_λ son iguales al mismo conjunto A , se escribe A^L en lugar de $\prod_{\lambda \in L} A_\lambda$. A^L es, por tanto, el conjunto de todas las funciones de L en A .

Se destaca, en especial, el producto cartesiano de una sucesión de conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$, el cual se representa con las notaciones

$$\prod_{n \in \mathbb{N}} A_n = \prod_{n=1}^{\infty} A_n = A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n \times \dots$$

Los elementos de este conjunto son las sucesiones $a = (a_1, a_2, \dots, a_n, \dots)$ sujetas a la condición de que $a_n \in A_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Ejercicios

1. Dados los conjuntos A y B , sea X un conjunto con las siguientes propiedades:

$$1^a \quad X \supset A \text{ y } X \supset B,$$

$$2^a \quad \text{Si } Y \supset A \text{ y } Y \supset B \text{ entonces } Y \supset X.$$

Probar que $X = A \cup B$.

2. Enuncie y demuestre un resultado análogo al anterior, caracterizando $A \cap B$.

3. Sean $A, B \subset E$. Pruebe que $A \cap B = \emptyset$ si, y solo si, $A \subset \mathcal{C}B$. Pruebe también que $A \cup B = E$ si, y solo si, $\mathcal{C}A \subset B$.
4. Dados $A, B \subset E$, pruebe que $A \subset B$ si, y solo si, $A \cap \mathcal{C}B = \emptyset$.
5. Dé ejemplo de conjuntos A, B, C tales que $(A \cup B) \cap C \neq A \cup (B \cap C)$.
6. Si $A, X \subset E$ son tales que $A \cap X = \emptyset$ y $A \cup X = E$, pruebe que $X = \mathcal{C}A$.
7. Si $A \subset B$, entonces $B \cap (A \cup C) = (B \cap C) \cup A$ para todo conjunto C . Por otro lado, si existe C de modo que la igualdad anterior sea satisfecha, entonces $A \subset B$.
8. Pruebe que $A = B$ si, y solo si, $(A \cap \mathcal{C}B) \cup (\mathcal{C}A \cap B) = \emptyset$.
9. Pruebe que $(A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$.
10. Sea $A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$. Pruebe que $A \Delta B = A \Delta C$ implica $B = C$. Examine la validez de un resultado análogo con $\cap, \cup$ o $\times$ en lugar de Δ .
11. Pruebe las siguientes afirmaciones:
 - a) $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$;
 - b) $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$;
 - c) $(A - B) \times C = (A \times C) - (B \times C)$;
 - d) $A \subset A', B \subset B' \Rightarrow A \times B \subset A' \times B'$.
12. Dada la función $f : A \rightarrow B$:
 - a) Pruebe que se tiene $f(X - Y) \supset f(X) - f(Y)$, sean cuales fueren los subconjuntos X e Y de A ;
 - b) Muestre que si f es inyectiva entonces $f(X - Y) = f(X) - f(Y)$ para cualesquiera X, Y contenidos en A .
13. Muestre que la función $f : A \rightarrow B$ es inyectiva si, y solo si, $f(A - X) = f(A) - f(X)$ para todo $X \subset A$.

14. Dada la función $f : A \rightarrow B$, pruebe:

- a) $f^{-1}(f(X)) \supset X$ para todo $X \subset A$;
- b) f es inyectiva si, y solo si, $f^{-1}(f(X)) = X$ para todo $X \subset A$.

15. Dada $f : A \rightarrow B$, pruebe:

- a) para todo $Z \subset B$, se tiene $f(f^{-1}(Z)) \subset Z$;
- b) f es sobreyectiva si, y solo si, $f(f^{-1}(Z)) = Z$ para todo $Z \subset B$.

16. Dada una familia de conjuntos $(A_\lambda)_{\lambda \in L}$, sea X un conjunto con las siguientes propiedades:

1^a) para todo $\lambda \in L$, se tiene $X \supset A_\lambda$;

2^a) Si $Y \supset A_\lambda$ para todo $\lambda \in L$, entonces $Y \supset X$.

Pruebe que, en estas condiciones, se tiene $X = \bigcup_{\lambda \in L} A_\lambda$.

17. Enuncie y demuestre un resultado análogo al anterior, caracterizando $\bigcap_{\lambda \in L} A_\lambda$.

18. Sea $f : \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(A)$ una función tal que $X \subset Y \Rightarrow f(Y) \subset f(X)$ y $f(f(X)) = X$. Pruebe que $f(\bigcup X_\lambda) = \bigcap f(X_\lambda)$ y $f(\bigcap X_\lambda) = \bigcup f(X_\lambda)$. [Aquí X, Y y cada X_λ son subconjuntos de A].

19. Dadas las familias $(A_\lambda)_{\lambda \in L}$ y $(B_\mu)_{\mu \in M}$, forme dos familias con índices en $L \times M$ considerando los conjuntos

$$(A_\lambda \cup B_\mu)_{(\lambda, \mu) \in L \times M} \quad \text{y} \quad (A_\lambda \cap B_\mu)_{(\lambda, \mu) \in L \times M}.$$

Pruebe que se tiene

$$\left(\bigcup_{\lambda \in L} A_\lambda \right) \cap \left(\bigcup_{\mu \in M} B_\mu \right) = \bigcup_{(\lambda, \mu) \in L \times M} (A_\lambda \cap B_\mu),$$

$$\left(\bigcap_{\lambda \in L} A_\lambda\right) \cup \left(\bigcap_{\mu \in M} B_\mu\right) = \bigcap_{(\lambda, \mu) \in L \times M} (A_\lambda \cup B_\mu).$$

20. Sea $(A_{ij})_{(i,j) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}}$ una familia de conjuntos con índices en $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Pruebe, o refute mediante un contraejemplo, la igualdad

$$\bigcup_{j=1}^{\infty} \left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_{ij} \right) = \bigcap_{i=1}^{\infty} \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_{ij} \right).$$

21. Dados los conjuntos A, B, C , establezca una biyección entre $\mathcal{F}(A \times B; C)$ y $\mathcal{F}(A; \mathcal{F}(B; C))$.

Capítulo 2

Conjuntos Finitos, Enumerables y No Enumerables

Una vez que tenemos los conceptos generales y los hechos básicos sobre conjuntos y funciones, los aplicaremos, en este capítulo, para estudiar las nociones de conjunto finito y conjunto infinito.

A Cantor se debe el descubrimiento fundamental de que hay diversos tipos de infinito, así como el análisis de esos tipos.

La noción de conjunto enumerable está estrictamente ligada al conjunto $\mathbb{N}$ de los números naturales. Por ello iniciaremos este capítulo con una breve presentación de la teoría de los números naturales a partir de los axiomas de Peano.

Los axiomas de Peano exhiben los números naturales como "números ordinales", es decir, objetos que ocupan lugares determinados en una secuencia ordenada: 1 es el primer número natural, 2 es el número que viene justo después del 1, 3 viene a continuación del 2, etc. Pero los números naturales también pueden ocurrir como "Números cardinales", es decir, como resultado

de una operación de conteo, en respuesta a la pregunta: ¿cuántos elementos tiene este conjunto?

En el §2, empleamos los números naturales para el conteo de los conjuntos finitos, mostrando cómo pueden ser considerados como números cardinales y completando, por tanto, su descripción.

Una exposición sistemática de los sistemas numéricos utilizados en el Análisis Matemático puede hacerse a partir de los números naturales, mediante sucesivas extensiones del concepto de número: primero se amplía $\mathbb{N}$ para obtener el conjunto $\mathbb{Z}$ de los números enteros; luego se extiende $\mathbb{Z}$, pasando al conjunto $\mathbb{Q}$ de los números racionales; de este se pasa al conjunto $\mathbb{R}$ de los reales y, de ahí, al conjunto $\mathbb{C}$ de los complejos. Esta elaboración, aunque instructiva, es un proceso lento.

2.1. Números naturales

Toda la teoría de los números naturales puede deducirse de los tres axiomas siguientes, conocidos como axiomas de Peano.

Se dan, como objetos no definidos, un conjunto $\mathbb{N}$, cuyos elementos se llaman números naturales, y una función $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, el número $s(n)$, valor que la función asume en el punto n , se llama el sucesor de n .

La función s satisface los siguientes axiomas:

P1. $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ es inyectiva. En otros términos: $m, n \in \mathbb{N}$, $s(m) = s(n) \Rightarrow m = n$. O, en palabras, dos números que tienen el mismo sucesor son iguales.

P2. $\mathbb{N} - s(\mathbb{N})$ consta de un solo elemento. Es decir, existe un único número natural que no es sucesor de ningún otro. Ese se llama “uno” y se representa con el símbolo 1. Así, cualquiera que sea $n \in \mathbb{N}$, se tiene $1 \neq s(n)$. Por otro lado, si $n \neq 1$ entonces existe un (único) $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $s(n_0) = n$.

P3. (Principio de Inducción). Si $X \subset \mathbb{N}$ es un subconjunto tal que $1 \in X$ y, para todo $n \in X$ se tiene también $s(n) \in X$, entonces $X = \mathbb{N}$.

El Principio de Inducción puede también enunciarse de la siguiente manera:

Sea $\mathcal{P}$ una propiedad referente a números naturales. Si 1 goza de la propiedad $\mathcal{P}$ y si, del hecho de que un número natural n goce de $\mathcal{P}$ se puede concluir que $n + 1$ goza de la propiedad $\mathcal{P}$, entonces todos los números naturales gozan de esa propiedad.

Una demostración en la que se emplea el axioma P3 se llama una demostración por inducción.

Para dar un ejemplo de demostración por inducción, mostremos que para todo $n \in \mathbb{N}$ se tiene $s(n) \neq n$. En efecto, sea $X = \{n \in \mathbb{N}; s(n) \neq n\}$. Se tiene $1 \in X$, pues 1 no es sucesor de ningún número, en particular $1 \neq s(1)$. Además, $n \in X \Rightarrow n \neq s(n) \Rightarrow$ (por la inyectividad de s) $s(n) \neq s[s(n)] \Rightarrow s(n) \in X$. Así, $n \in X \Rightarrow s(n) \in X$. Como $1 \in X$, se sigue del axioma P3 que $X = \mathbb{N}$, o sea $n \neq s(n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

El Principio de Inducción es muy útil para demostrar proposiciones que se refieren a enteros. Él está implícito en todos los argumentos donde se dice “y así sucesivamente”, “y así seguidamente” o “etc.”.

No menos importante que demostrar proposiciones por inducción es saber definir objetos inductivamente.

Las definiciones por inducción se basan en la posibilidad de iterar una función $f : X \rightarrow X$ un número arbitrario n de veces.

Más precisamente, sea $f : X \rightarrow X$ una función cuyo dominio y codominio son el mismo conjunto X . A cada $n \in \mathbb{N}$ podemos, de modo único, asociar una función $f^n : X \rightarrow X$ de tal manera que $f^1 = f$ y $f^{s(n)} = f \circ f^n$. En particular, si llamamos $2 = s(1)$, $3 = s(2)$, tendremos $f^2 = f \circ f$, $f^3 = f \circ f \circ f$.

En una exposición sistemática de la teoría de los números naturales, la existencia de la n -ésima iterada f^n de una función $f : X \rightarrow X$ es un teorema, llamado “Teorema de la Definición por Inducción”. No daremos su demostración aquí. Solo observaremos que no nos sería posible, a estas alturas, definir f^n simplemente como $f \circ f \circ \cdots \circ f$ (n veces) pues “ n veces” es una expresión sin sentido en el contexto de los axiomas de Peano, ya que un número natural n es, por ahora, solo un elemento del conjunto $\mathbb{N}$ (un número ordinal), sin condiciones de servir de respuesta a la pregunta “¿cuántas veces?”, hasta que se le otorgue la condición de número cardinal.

Admitamos, por tanto, que, dada una función $f : X \rightarrow X$, sabemos asociar, de modo único, a cada número natural $n \in \mathbb{N}$, una función $f^n : X \rightarrow X$, llamada la n -ésima iterada de f , de tal modo que $f^1 = f$ y $f^{s(n)} = f \circ f^n$.

Veamos un ejemplo de definición por inducción. Usando las iteradas de la función $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, definiremos la suma de números naturales. Dados $m, n \in \mathbb{N}$, su suma $m + n \in \mathbb{N}$ se define por:

$$m + n = s^n(m).$$

Así, sumar m con 1 es tomar el sucesor de m mientras que, en general, sumar m con n es partir de m e iterar n veces la operación de tomar el sucesor. En otras palabras, tenemos, por definición:

$$m + 1 = s(m),$$

$$m + s(n) = s(m + n).$$

Así, si queremos, podremos prescindir de la notación $s(n)$ para indicar el sucesor de n y usar la notación definitiva $n + 1$ para representar dicho sucesor. Esto se hará gradualmente. Con la notación definitiva, la última de las

igualdades anteriores se lee:

$$m + (n + 1) = (m + n) + 1.$$

Vemos que la propia definición de la suma $m + n$ ya contiene una indicación de que goza de la propiedad asociativa. Probaremos ahora, en general, que se tiene:

$$m + (n + p) = (m + n) + p,$$

cualesquiera que sean $m, n, p \in \mathbb{N}$.

La demostración de la propiedad asociativa se hace así: sea X el conjunto de los números naturales p tales que $m + (n + p) = (m + n) + p$, cualesquiera que sean $m, n \in \mathbb{N}$. Ya vimos que $1 \in X$. Además, si $p \in X$, entonces,

$$m + (n + s(p)) = m + s(n + p) = s(m + (n + p)) = s((m + n) + p) = (m + n) + s(p).$$

(En el tercer signo de igualdad, usamos la hipótesis $p \in X$ y en los demás la definición de suma.) Luego, $p \in X \Rightarrow s(p) \in X$. Como $1 \in X$, concluimos, por inducción, que $X = \mathbb{N}$, es decir, $m + (n + p) = (m + n) + p$, cualesquiera que sean $m, n, p \in \mathbb{N}$.

Las propiedades formales de la adición se relacionan a continuación:

Asociatividad: $m + (n + p) = (m + n) + p$;

Conmutatividad: $m + n = n + m$;

Ley de cancelación: $m + n = m + p \Rightarrow n = p$;

Tricotomía: dados $m, n \in \mathbb{N}$, exactamente una de las tres alternativas siguientes puede ocurrir: o $m = n$, o existe $p \in \mathbb{N}$ tal que $m = n + p$, o bien existe $q \in \mathbb{N}$ con $n = m + q$.

Omitimos las demostraciones de esas propiedades, que se hacen por induc-

ción.

La relación de orden entre los números naturales se define en términos de la adición. Dados los números naturales m, n decimos que m es menor que n y escribimos

$$m < n,$$

para significar que existe $p \in \mathbb{N}$ tal que $n = m + p$. En las mismas condiciones, decimos que n es mayor que m y escribimos $n > m$. La notación $m \leq n$ significa que m es menor o igual que n .

La relación $<$ goza de las siguientes propiedades:

Transitividad: si $m < n$ y $n < p$ entonces $m < p$.

Tricotomía: dados m, n , exactamente una de las siguientes alternativas puede ocurrir: o $m = n$, o $m < n$ o $n < m$.

Monotonicidad de la adición: si $m < n$ entonces, para todo $p \in \mathbb{N}$ se tiene $m + p < n + p$.

Probemos la última: $m < n$ significa que existe $q \in \mathbb{N}$ tal que $m + q = n$. Entonces $(m + p) + q = n + p$, y, por tanto, $m + p < n + p$.

Observemos que $m < n$ significa que, para cierto $p \in \mathbb{N}$, tenemos $n = s^p(m)$, esto es, n es el sucesor del sucesor ... del sucesor de m .

Introduciremos ahora la multiplicación de números naturales.

Así, como la suma $m + n$ fue definida como el resultado que se obtiene cuando se itera n veces, a partir de m , la operación de tomar el sucesor, definiremos el producto $m \cdot n$ como la suma de n sumandos iguales a m , o mejor, el resultado que se obtiene cuando se añade a m , $n - 1$ veces, el mismo número m .

En términos precisos, para cada $m \in \mathbb{N}$, sea $f_m : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ la función definida

por $f_m(p) = p + m$. (Es decir, f_m es la función “sumar m ”). Usaremos esta función para definir la multiplicación de números naturales.

El producto de dos números naturales se define así, $m \cdot 1 = m$ y $m \cdot (n + 1) = (f_m)^n(m)$.

En palabras: multiplicar un número m por 1 no lo altera. Multiplicar m por un número mayor que 1, es decir, por un número de la forma $n + 1$, es iterar n veces la operación de sumar m , comenzando con m . Así, por ejemplo, $m \cdot 2 = f_m(m) = m + m$, $m \cdot 3 = (f_m)^2(m) = m + m + m$.

Recordando la definición de $(f_m)^n$, vemos que el producto $m \cdot n$ está definido inductivamente por las propiedades siguientes:

$$m \cdot 1 = m,$$

$$m \cdot (n + 1) = m \cdot n + m.$$

La última igualdad anterior ya sugiere que el producto debe gozar de la propiedad distributiva

$$m \cdot (n + p) = m \cdot n + m \cdot p.$$

Demostremos este hecho. Sea X el conjunto de los números $p \in \mathbb{N}$ tales que $(m + n) \cdot p = m \cdot p + n \cdot p$ cualesquiera que sean $m, n \in \mathbb{N}$. Acabamos de observar que $1 \in X$. Además, si $p \in X$, concluiremos que

$$\begin{aligned} (m + n) \cdot (p + 1) &= (m + n) \cdot p + m + n \\ &= m \cdot p + n \cdot p + m + n = m \cdot p + m + n \cdot p + n \\ &= m \cdot (p + 1) + n \cdot (p + 1). \end{aligned}$$

(En las igualdades anteriores usamos, sucesivamente, la definición de producto, la hipótesis de que $p \in X$, la asociatividad y la conmutatividad de la adición y, nuevamente, la definición de producto).

Se sigue que $p + 1 \in X$. Así, $X = \mathbb{N}$, es decir, $(m + n) \cdot p = m \cdot p + n \cdot p$, cualesquiera que sean $m, n, p \in \mathbb{N}$.

Las principales propiedades de la multiplicación son:

Asociatividad: $m \cdot (n \cdot p) = (m \cdot n) \cdot p$;

Conmutatividad: $m \cdot n = n \cdot m$;

Ley de cancelación: $m \cdot p = n \cdot p \Rightarrow m = n$;

Distributividad: $m(n + p) = m \cdot n + m \cdot p$;

Monotonicidad: $m < n \Rightarrow m \cdot p < n \cdot p$.

2.2. Buena ordenación y el Segundo Principio de Inducción

Sea X un conjunto de números naturales. Se dice que un número $p \in X$ es el menor elemento de X (o elemento mínimo de X) cuando se tiene $p \leq n$ para todo $n \in X$. Por ejemplo, 1 es el menor elemento del conjunto $\mathbb{N}$ de todos los números naturales. Con mayor razón, cualquiera que sea $X \subset \mathbb{N}$ con $1 \in X$, 1 es el menor elemento de X .

Dado $X \subset \mathbb{N}$, si $p \in X$ y $q \in X$ son ambos los menores elementos de X , entonces $p \leq q$ y $q \leq p$, de donde $p = q$. Así, el menor elemento de un conjunto es único.

Análogamente, si $X \subset \mathbb{N}$, un número $p \in X$ se llama el mayor elemento de X (o elemento máximo de X) cuando se tiene $p \geq n$ para todo $n \in X$. No todo conjunto de números naturales posee un elemento máximo. Por ejemplo, el propio $\mathbb{N}$ no tiene un mayor elemento ya que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene

$$n + 1 > n.$$

Si existe el elemento máximo de un conjunto $X \subset \mathbb{N}$, es único. En efecto, si $p \in X$ y $q \in X$ son ambos máximos, entonces $p \geq q$ y $q \geq p$, de donde $p = q$.

Un resultado de gran importancia, incluso como método de demostración, es el hecho de que todo conjunto no vacío de números naturales posee un menor elemento. Este hecho se conoce como el Principio de Buena Ordenación.

Teorema 1. (Principio de Buena Ordenación). Todo subconjunto no vacío $A \subset \mathbb{N}$ posee un elemento mínimo.

Demostración. Usando la notación $I_n = \{p \in \mathbb{N} : 1 \leq p \leq n\}$, consideremos el conjunto $X \subset \mathbb{N}$ formado por los números $n \in \mathbb{N}$ tales que $I_n \subset \mathbb{N} - A$. (Así, decir que $n \in X$ significa afirmar que $n \notin A$ y que todos los números naturales menores que n tampoco pertenecen a A .) Si tenemos $1 \in A$, el teorema estará demostrado pues 1 será el menor elemento de A . Si, en cambio, es $1 \notin A$, entonces $1 \in X$. Por otro lado, tenemos $X \neq \mathbb{N}$ (pues $X \subset \mathbb{N} - A$ y $A \neq \emptyset$). Así, X cumple la primera parte de la hipótesis de P3 (contiene 1) pero no satisface la conclusión de P3 (no es igual a $\mathbb{N}$). Luego no puede cumplir la segunda parte de la hipótesis. Esto quiere decir: debe existir algún $n \in X$ tal que $n + 1 \notin X$. Sea $a = n + 1$. Entonces todos los enteros desde 1 hasta n pertenecen al complemento de A pero $a = n + 1$ pertenece a A . De esta manera, a es el menor elemento del conjunto A , lo que demuestra el teorema.

Del Principio de Buena Ordenación se deduce una proposición conocida como el Segundo Principio de Inducción, que demostramos ahora.

Teorema 2. (Segundo Principio de Inducción.) Sea $X \subset \mathbb{N}$ un conjunto con la siguiente propiedad: dado $n \in \mathbb{N}$, si X contiene todos los números naturales m tales que $m < n$, entonces $n \in X$. En estas condiciones, $X = \mathbb{N}$.

Demostración. Sea $Y = \mathbb{N} - X$. Afirmamos que $Y = \emptyset$. En efecto, si Y no fuera vacío, existiría un elemento mínimo $p \in Y$. Entonces, para todo número

natural $m < p$, sería $m \in X$. Por la hipótesis hecha sobre X , tendríamos $p \in X$, una contradicción.

El Segundo Principio de Inducción constituye un método útil para demostración de proposiciones referentes a números naturales. También puede enunciarse así: Sea $\mathcal{P}$ una propiedad relativa a números naturales. Si, dado $n \in \mathbb{N}$, del hecho de que todo número natural $m < n$ goce de la propiedad $\mathcal{P}$ puede inferirse que n goza de la propiedad $\mathcal{P}$, entonces todo número natural goza de $\mathcal{P}$.

Ejemplo 1. Un número natural p se llama primo cuando $p \neq 1$ y no se puede escribir $p = m \cdot n$ con $m < p$ y $n < p$. El llamado Teorema Fundamental de la Aritmética dice que todo número natural se descompone, de modo único, como producto de factores primos. La demostración utiliza el Segundo Principio de Inducción. En efecto, dado $n \in \mathbb{N}$, supongamos que todo número natural menor que n puede descomponerse como producto de factores primos. Entonces, o n es primo (y en este caso n es, de modo trivial, un producto de factores primos) o bien $n = m \cdot k$, con $m < n$ y $k < n$. Por la hipótesis de inducción, m y k son productos de factores primos. Se sigue que n también lo es. Por el Segundo Principio de Inducción, concluimos que todo número natural es producto de números primos.

Concluiremos este párrafo hablando del método general de definición por inducción.

Sea X un conjunto cualquiera. Se trata de definir una función $f : \mathbb{N} \rightarrow X$. Supongamos que se nos da el valor $f(1)$ y se da también una regla que nos permita obtener $f(n)$ siempre que conozcamos los valores $f(m)$, para todo $m < n$. Entonces existe una, y solo una, función $f : \mathbb{N} \rightarrow X$ en esas condiciones. Este es el método general de definición por inducción (o por recurrencia).

Ejemplo 2. Fijado $\alpha \in \mathbb{N}$, definamos una función $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, inductivamente,

poniendo $f(1) = \alpha$ y $f(n+1) = \alpha \cdot f(n)$. La función f cumple entonces $f(2) = \alpha \cdot \alpha$, $f(3) = \alpha \cdot \alpha \cdot \alpha$, etc. Luego $f(n) = \alpha^n$. Acabamos de definir, por inducción, la n -ésima potencia del número natural α . Nótese que, en este caso, tenemos solo la iteración de la multiplicación por α , es decir, la forma más simple de definición por inducción. Los ejemplos siguientes requieren la forma general, esto es, no se reducen inmediatamente a la iteración de una función dada.

Ejemplo 3. Sea $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ la función definida inductivamente por $\varphi(1) = 1$ y $\varphi(n+1) = (n+1) \cdot \varphi(n)$. Entonces $\varphi(1) = 1$, $\varphi(2) = 2 \cdot 1$, $\varphi(3) = 3 \cdot 2 \cdot 1$, etc. Así, $\varphi(n) = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1$, o sea, $\varphi(n) = n!$ es el factorial de n .

Ejemplo 4. Definamos $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ inductivamente poniendo

$$f(1) = 1, \quad f(2) = 1/2 \text{ y, en general, } f(n+2) = \frac{f(n) + f(n+1)}{2}.$$

Entonces $f(3) = 3/4$, $f(4) = 5/8$, etc. Cada valor $f(n)$, para $n > 2$, es la media aritmética de los dos valores anteriores de f .

Ejemplo 5. La suma $a_1 + \cdots + a_n$ de una n -upla de números naturales $a_1, \dots, a_n$ se define inductivamente así: a_1 y $a_1 + a_2$ ya se conocen. Suponiendo que ya se sabe sumar n números cualesquiera, se pone, por definición, $a_1 + \cdots + a_{n+1} = (a_1 + \cdots + a_n) + a_{n+1}$. A primera vista, no se ve aquí la definición de una función $f : \mathbb{N} \rightarrow X$, por inducción. En realidad, sin embargo, la suma de n números naturales (n fijo) es una función $\sigma_n : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$. Lo que se acaba de definir inductivamente fue la función $f : n \rightarrow \sigma_n$. (¿Cuál es el codominio X de f ?)

Ejemplo 6. También el producto $a_1 \cdot a_2 \cdots a_n$ de una n -upla de números naturales se define inductivamente: $a_1 \cdot a_2$ son conocidos. Se pone $a_1 \cdot a_2 \cdots a_{n+1} = (a_1 \cdot a_2 \cdots a_n) \cdot a_{n+1}$.

2.3. Conjuntos finitos e infinitos

En este párrafo, indicaremos con el símbolo I_n el conjunto $\{1, \dots, n\}$ de los números naturales desde 1 hasta n . Más precisamente, dado $n \in \mathbb{N}$, tenemos

$$I_n = \{p \in \mathbb{N} ; 1 \leq p \leq n\}.$$

Un conjunto X se llama finito cuando es vacío o cuando existe, para algún $n \in \mathbb{N}$, una biyección

$$\varphi : I_n \rightarrow X.$$

En el primer caso, diremos que X tiene cero elementos. En el segundo caso, diremos que $n \in \mathbb{N}$ es el número de elementos de X , es decir, que X posee n elementos.

Los siguientes hechos se deducen inmediatamente de las definiciones:

- a) cada conjunto I_n es finito y posee n elementos;
- b) si $f : X \rightarrow Y$ es una biyección, uno de esos conjuntos es finito si, y solo si, el otro lo es.

Intuitivamente, una biyección $\varphi : I_n \rightarrow X$ significa un conteo de los elementos de X . Poniendo $\varphi(1) = x_1, \varphi(2) = x_2, \dots, \varphi(n) = x_n$, tenemos $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Esta es la representación ordinaria de un conjunto finito.

Para que el número de elementos de un conjunto no sea una noción ambigua, debemos probar que si existen dos biyecciones $\varphi : I_n \rightarrow X$ y $\psi : I_m \rightarrow X$, entonces $m = n$. Considerando la función compuesta $f = \psi^{-1} \circ \varphi : I_n \rightarrow I_m$, basta entonces probar que si existe una biyección $f : I_n \rightarrow I_m$, entonces se tiene $m = n$. Para fijar ideas, supongamos $m \leq n$. De ahí, $I_m \subset I_n$. La unicidad del número de elementos de un conjunto finito será, por tanto, una consecuencia de la proposición más general siguiente:

Teorema 3. Sea $A \subset I_n$. Si existe una biyección $f : I_n \rightarrow A$, entonces $A = I_n$.

Demostración. Usaremos inducción en n . El resultado es obvio para $n = 1$. Supongamos que sea válido para un cierto n y consideremos una biyección $f : I_{n+1} \rightarrow A$. Pongamos $a = f(n+1)$. La restricción de f a I_n proporciona una biyección $f' : I_n \rightarrow A - \{a\}$. Si tenemos $A - \{a\} \subset I_n$, entonces, por la hipótesis de inducción, concluiremos que $A - \{a\} = I_n$, de donde $a = n+1$ y $A = I_{n+1}$. Si, en cambio, no es $A - \{a\} \subset I_n$, entonces debe tenerse $n+1 \in A - \{a\}$. En este caso, existe $p \in I_{n+1}$ tal que $f(p) = n+1$. Entonces definiremos una nueva biyección $g : I_{n+1} \rightarrow A$ poniendo $g(x) = f(x)$ si $x \neq p$ y $x \neq n+1$, mientras que $g(p) = a$, $g(n+1) = n+1$. Ahora, la restricción de g a I_n nos dará una biyección $g' : I_n \rightarrow A - \{n+1\}$. Evidentemente, $A - \{n+1\} \subset I_n$. Luego, por la hipótesis de inducción, $A - \{n+1\} = I_n$, de donde $A = I_{n+1}$. Esto concluye la demostración.

Corolario 1. Si existe una biyección $f : I_m \rightarrow I_n$ entonces $m = n$. En consecuencia, si existen dos biyecciones $\psi : I_n \rightarrow X$ y $\varphi : I_m \rightarrow X$, debe tenerse $m = n$.

En efecto, podemos suponer, para fijar las ideas, que $m \leq n$. Entonces $I_m \subset I_n$. Tomando $A = I_m$ en el Teorema 3, obtenemos $I_m = I_n$ y, por tanto, $m = n$.

Corolario 2. No puede existir una biyección $f : X \rightarrow Y$ de un conjunto finito X sobre una parte propia $Y \subset X$.

En efecto, siendo X finito, existe una biyección $\varphi : I_n \rightarrow X$. Sea $A = \varphi^{-1}(Y)$. Entonces A es una parte propia de I_n y la restricción de φ a A proporciona una biyección $\varphi' : A \rightarrow Y$.

$$\begin{array}{ccc}
X & \xrightarrow{f} & Y \\
\varphi \uparrow & & \uparrow \varphi' \\
I_n & \xrightarrow{g} & A
\end{array}$$

La composición $g = (\varphi')^{-1} \circ f \circ \varphi : I_n \rightarrow A$ sería entonces una biyección de I_n sobre su parte propia A , lo que contradice el Teorema 3. Luego no existe la biyección f .

Teorema 4. Si X es un conjunto finito entonces todo subconjunto $Y \subset X$ es finito. El número de elementos de Y no excede al de X y solo es igual cuando $Y = X$.

Demostración. Basta probar el teorema en el caso en que $X = I_n$. Esto es claro para $n = 1$ pues las únicas partes de I_1 son $\emptyset$ y I_1 . Supongamos el teorema demostrado para I_n y consideremos un subconjunto $Y \subset I_{n+1}$. Si $Y \subset I_n$ entonces, por la hipótesis de inducción, Y será un conjunto finito cuyo número de elementos es $\leq n$ y, por tanto, $\leq n + 1$. Si, por el contrario, $n + 1 \in Y$ entonces $Y - \{n + 1\} \subset I_n$ y consecuentemente (salvo en el caso trivial $Y = \{n + 1\}$) existe una biyección $\psi : I_p \rightarrow Y - \{n + 1\}$, con $p \leq n$. Definiremos entonces una biyección $\varphi : I_{p+1} \rightarrow Y$, poniendo $\varphi(x) = \psi(x)$ para $x \in I_p$ y $\varphi(p + 1) = n + 1$. Se sigue que Y es finito y su número de elementos no excede $p + 1$. Como $p \leq n$, tenemos $p + 1 \leq n + 1$. Resta solo mostrar que si $Y \subset I_n$ tiene n elementos entonces $Y = I_n$. Esto es claro pues, por el Corolario 2 del Teorema 3, no puede haber una biyección de I_n sobre una parte propia suya Y .

Corolario 1. Sea $f : X \rightarrow Y$ una función inyectiva. Si Y es finito entonces X también lo es. Además, el número de elementos de X no excede al de Y .

En efecto, f define una biyección de X sobre su imagen $f(X)$, la cual es finita por ser una parte del conjunto finito Y . Además, el número de elementos de $f(X)$, que es igual al de X , no excede al de Y .

Corolario 2. Sea $g : X \rightarrow Y$ una función sobreyectiva. Si X es finito entonces Y también lo será y su número de elementos no excede al de X .

En efecto, como vimos en el Capítulo I (§4), g posee una inversa por la derecha, es decir, existe una función $f : Y \rightarrow X$ tal que $g \circ f = \text{id}_Y$. Entonces g es inversa por la izquierda de f y, por tanto, f es una función inyectiva de Y en el conjunto finito X . Se sigue del Corolario 1 que Y es finito y su número de elementos no excede al de X .

Un conjunto X se llama infinito cuando no es finito. Más explícitamente, X es infinito cuando no es vacío y, además, cualquiera que sea $n \in \mathbb{N}$, no existe una biyección $\varphi : I_n \rightarrow X$.

Por ejemplo, el conjunto $\mathbb{N}$ de los números naturales es infinito. En efecto, dada cualquier función $\varphi : I_n \rightarrow \mathbb{N}$, con $n > 1$, sea $p = \varphi(1) + \cdots + \varphi(n)$. Entonces $p > \varphi(x)$ para todo $x \in I_n$, de donde $p \notin \varphi(I_n)$. Luego, ninguna función $\varphi : I_n \rightarrow \mathbb{N}$ es sobreyectiva.

Otra manera de verificar que $\mathbb{N}$ es infinito es considerar el conjunto $P = \{2, 4, 6, \dots\}$ de los números pares y definir la biyección $f : \mathbb{N} \rightarrow P$, donde $f(n) = 2n$. Como P es una parte propia de $\mathbb{N}$, se sigue del Corolario 2 del Teorema 3 que $\mathbb{N}$ no es finito.

Los hechos que acabamos de establecer para conjuntos finitos proporcionan, por exclusión, resultados sobre conjuntos infinitos. Por ejemplo, si $f : X \rightarrow Y$ es inyectiva y X es infinito, entonces Y también lo es. Dada $f : X \rightarrow Y$ sobreyectiva, si Y es infinito, entonces X es infinito. O también, como acabamos de usar, si X admite una biyección sobre una de sus partes propias, entonces X es infinito.

Otros ejemplos de conjuntos infinitos son $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{Q}$, pues ambos conjuntos contienen $\mathbb{N}$. Según una proposición debida a Euclides, el conjunto de los números primos es infinito. Caracterizaremos ahora los subconjuntos finitos (y por

tanto los infinitos) de $\mathbb{N}$.

Un conjunto $X \subset \mathbb{N}$ se llama acotado cuando existe un $p \in \mathbb{N}$ tal que $p \geq n$ para cualquiera que sea $n \in X$.

Teorema 5. Sea $X \subset \mathbb{N}$ no vacío. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (a) X es finito;
- (b) X es acotado;
- (c) X posee un mayor elemento.

Demostración. Probaremos que $(a) \Rightarrow (b)$, $(b) \Rightarrow (c)$ y $(c) \Rightarrow (a)$.

$(a) \Rightarrow (b)$ – Sea $X = \{x_1, \dots, x_n\}$. Tomando $p = x_1 + \dots + x_n$, tenemos $p > x$, para todo $x \in X$, luego X es acotado.

$(b) \Rightarrow (c)$ – Suponiendo $X \subset \mathbb{N}$ acotado, se sigue que el conjunto $A = \{p \in \mathbb{N}; p \geq n \text{ para todo } n \in X\}$ es no vacío. Por el Principio de Buena Ordenación, existe $p_0 \in A$, que es el menor elemento de A . Afirmamos que debe ser $p_0 \in X$. En efecto, si fuese $p_0 \notin X$ entonces tendríamos $p_0 > n$ para todo $n \in X$. Como $X \neq \emptyset$, esto obligaría $p_0 > 1$, de donde $p_0 = p_1 + 1$. Si existiese algún $n \in X$ con $p_1 < n$, esto traería $p_0 = p_1 + 1 \leq n$ y (como estamos suponiendo $p_0 \notin X$) $p_0 < n$, un absurdo. Luego es $p_1 \geq n$ para todo $n \in X$. Pero esto significa $p_1 \in A$, lo que es absurdo en vista de $p_1 < p_0$ y $p_0 =$ menor elemento de A . Por lo tanto debe ser $p_0 \in X$. Como $p_0 \geq n$ para todo $n \in X$, concluimos que p_0 es el mayor elemento de X .

$(c) \Rightarrow (a)$ – Si existe un elemento $p \in X$ que es el mayor de todos, entonces X está contenido en I_p y, por consiguiente, X es finito, por el Teorema 4.

Un conjunto $X \subset \mathbb{N}$ se llama ilimitado cuando no es acotado. Esto significa que, dado cualquier $p \in \mathbb{N}$, existe algún $n \in X$ tal que $n > p$. Los conjuntos ilimitados $X \subset \mathbb{N}$ son, como acabamos de ver, precisamente los subconjuntos

infinitos de $\mathbb{N}$.

Teorema 6. Sean X, Y conjuntos finitos disjuntos, con m y n elementos respectivamente. Entonces $X \cup Y$ es finito y posee $m + n$ elementos.

Demostración. Dadas las biyecciones $\varphi : I_m \rightarrow X$ y $\psi : I_n \rightarrow Y$, definamos la función $\xi : I_{m+n} \rightarrow X \cup Y$ poniendo $\xi(x) = \varphi(x)$ si $1 \leq x \leq m$ y $\xi(m+x) = \psi(x)$ si $1 \leq x \leq n$. Como $X \cap Y = \emptyset$, se comprueba inmediatamente que ξ es una biyección, lo que prueba el teorema.

Corolario 1. Sean $X_1, \dots, X_k$ conjuntos finitos, dos a dos disjuntos, con $m_1, \dots, m_k$ elementos respectivamente. Entonces $X_1 \cup \dots \cup X_k$ es finito y posee $m_1 + \dots + m_k$ elementos.

El corolario se obtiene aplicando el teorema $k - 1$ veces.

Corolario 2. Sean $Y_1, \dots, Y_k$ conjuntos finitos (no necesariamente disjuntos) con $m_1, \dots, m_k$ elementos respectivamente. Entonces $Y_1 \cup \dots \cup Y_k$ es finito y posee a lo sumo $m_1 + \dots + m_k$ elementos.

Para cada $i = 1, \dots, k$, sea $X_i = \{(x, i); x \in Y_i\}$, es decir $X_i = Y_i \times \{i\}$. Entonces los X_i son dos a dos disjuntos y cada X_i posee m_i elementos. Luego $X_1 \cup \dots \cup X_k$ es finito y tiene $m_1 + \dots + m_k$ elementos, por el Corolario 1. Ahora la aplicación $f : X_1 \cup \dots \cup X_k \rightarrow Y_1 \cup \dots \cup Y_k$, definida por $f(x, i) = x$, es sobreyectiva. El resultado se sigue.

Corolario 3. Sean $X_1, \dots, X_k$ conjuntos finitos con $m_1, \dots, m_k$ elementos respectivamente. El producto cartesiano $X_1 \times \dots \times X_k$ es finito y posee $m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_k$ elementos.

Basta demostrar el Corolario 3 para $k = 2$, pues el caso general se reduce a este mediante aplicaciones sucesivas del mismo resultado. Ahora, dados X e Y finitos, escribamos $Y = \{y_1, \dots, y_n\}$. Entonces $X \times Y = X_1 \cup \dots \cup X_n$, donde $X_i = X \times \{y_i\}$. Como los X_i son dos a dos disjuntos y poseen el

mismo número de elementos (digamos m) que X , concluimos que $X \times Y$ posee $m + m + \cdots + m = m \cdot n$ elementos.

Corolario 4. Si X e Y son conjuntos finitos y poseen respectivamente m y n elementos, entonces el conjunto $F(X; Y)$ de todas las funciones $f : X \rightarrow Y$ es finito y posee n^m elementos.

Consideremos primero el caso en que $X = I_m$. Entonces una función $f : I_m \rightarrow Y$ es simplemente una m -tupla de elementos de Y . En otras palabras, $F(I_m; Y) = Y \times \cdots \times Y$ (m factores). Por el Corolario 3, el número de elementos de $F(I_m; Y)$ es n^m . El caso general se reduce a este. En efecto, sea $\varphi : I_m \rightarrow X$ una biyección. La correspondencia que a cada $f : X \rightarrow Y$ le asocia $f \circ \varphi : I_m \rightarrow Y$ es una biyección de $F(X; Y)$ sobre $F(I_m; Y)$. Luego estos dos conjuntos poseen el mismo número de elementos, a saber, n^m .

2.4. Conjuntos enumerables

Un conjunto X se dice enumerable cuando es finito o cuando existe una biyección $f : \mathbb{N} \rightarrow X$. En el segundo caso, X se dice infinito enumerable y, poniendo $x_1 = f(1), x_2 = f(2), \dots, x_n = f(n), \dots$, se tiene $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$. Cada biyección $f : \mathbb{N} \rightarrow X$ se llama una enumeración (de los elementos) de X .

Ejemplo 7. La biyección $f : \mathbb{N} \rightarrow P$, $f(n) = 2^n$, muestra que el conjunto P de los números naturales pares es infinito enumerable. Análogamente, $g : \mathbb{N} \rightarrow 2\mathbb{N} - 1$ define una biyección de $\mathbb{N}$ sobre el conjunto de los números naturales impares, el cual es, por tanto, infinito enumerable. También el conjunto $\mathbb{Z}$ de los números enteros es enumerable. Basta notar que la función $h : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$, definida por $h(n) = 2n$ cuando n es positivo y $h(n) = -2n + 1$ cuando n es negativo o cero, es una biyección. Luego, $h^{-1} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ es una enumeración de $\mathbb{Z}$.

Teorema 7. Todo conjunto infinito X contiene un subconjunto infinito enumerable.

Demostración. Basta definir una función inyectiva $f : \mathbb{N} \rightarrow X$. Para ello, comenzamos eligiendo, en cada subconjunto no vacío $A \subset X$, un elemento $x_A \in A$. A continuación, definimos f por inducción. Ponemos $f(1) = x_X$ y, suponiendo ya definidos $f(1), \dots, f(n)$, escribimos $A_n = X - \{f(1), \dots, f(n)\}$. Como X no es finito, A_n no es vacío. Pondremos entonces $f(n+1) = x_{A_n}$. Esto completa la definición inductiva de la función $f : \mathbb{N} \rightarrow X$. Afirmamos que f es inyectiva. En efecto, dados $m \neq n$ en $\mathbb{N}$, sea $m < n$. Entonces $f(m) \in \{f(1), \dots, f(n-1)\}$ mientras que $f(n) \in \mathbb{C}\{f(1), \dots, f(n-1)\}$. Luego $f(m) \neq f(n)$. La imagen $f(\mathbb{N})$ es, por tanto, un subconjunto infinito enumerable de X .

Corolario. Un conjunto X es infinito si, y solo si, existe una biyección $f : X \rightarrow Y$ de X sobre una parte propia $Y \subset X$.

En efecto, si tal biyección existe, X será infinito, por el Corolario 2 del Teorema 3. Recíprocamente, si X es infinito, contiene un subconjunto infinito enumerable $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$. Sea $Y = (X - A) \cup \{a_2, a_4, \dots, a_{2n}, \dots\}$. Evidentemente, Y es una parte propia de X . Definimos una biyección $f : X \rightarrow Y$ poniendo $f(x) = x$ si $x \in X - A$ y $f(a_n) = a_{2n}$.

Evidentemente, el corolario anterior también puede enunciarse así: "Un conjunto es finito si, y solo si, no admite una biyección sobre una parte propia suya". Se obtiene así una caracterización de los conjuntos finitos en la que no interviene el conjunto $\mathbb{N}$. Esta fue la manera como Dedekind definió conjunto finito.

Teorema 8. Todo subconjunto $X \subset \mathbb{N}$ es enumerable.

Demostración. Si X es finito, es enumerable. Si es infinito, definiremos inductivamente una biyección $f : \mathbb{N} \rightarrow X$. Pondremos $f(1) =$ menor ele-

mento de X . Supongamos $f(1), \dots, f(n)$ definidos de modo que satisfagan las siguientes condiciones: (a) $f(1) < f(2) < \dots < f(n)$; (b) poniendo $B_n = X - \{f(1), \dots, f(n)\}$, se tiene $f(n) < x$ para todo $x \in B_n$. A continuación, notando que $B_n \neq \emptyset$ (pues X es infinito), definimos $f(n+1) =$ menor elemento de B_n . Esto completa la definición de $f : \mathbb{N} \rightarrow X$, de modo que se mantienen las condiciones (a) y (b) para todo $n \in \mathbb{N}$. Se sigue de (a) que f es inyectiva. Por otro lado, (b) implica que f es sobreyectiva pues si existiese algún $x \in X - f(\mathbb{N})$, tendríamos $x \in B_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, por tanto, $x > f(n)$, cualquiera que fuese $n \in \mathbb{N}$. Entonces el conjunto infinito $f(\mathbb{N}) \subset \mathbb{N}$ sería acotado, una contradicción, en vista del Teorema 5.

Corolario 1. Un subconjunto de un conjunto enumerable es enumerable. O sea: si $f : X \rightarrow Y$ es inyectiva e Y es enumerable, entonces X es enumerable.

Una función $f : X \rightarrow Y$, donde $X, Y \subset \mathbb{N}$, se llama creciente cuando, dados $m < n$ en X , se tiene $f(m) < f(n)$.

Corolario 2. Dado un subconjunto infinito $X \subset \mathbb{N}$, existe una biyección creciente $f : \mathbb{N} \rightarrow X$.

Esto es lo que se demostró en el Teorema 8. Se sigue del Teorema 8 que el conjunto de los números primos es (infinito y) enumerable.

Teorema 9. Sea X un conjunto enumerable. Si $f : X \rightarrow Y$ es sobreyectiva, entonces Y es enumerable.

Demostración. Existe $g : Y \rightarrow X$ tal que $f \circ g = id_Y$. Luego f es una inversa por la izquierda de g , y, por tanto, g es inyectiva. Se sigue que Y es enumerable. (Corolario 1 del Teorema 8.)

Teorema 10. Sean X, Y conjuntos enumerables. El producto cartesiano $X \times Y$ es enumerable.

Demostración. Existen funciones inyectivas $\varphi : X \rightarrow \mathbb{N}$ y $\psi : Y \rightarrow \mathbb{N}$. Luego

$g : X \times Y \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, dada por $g(x, y) = (\varphi(x), \psi(y))$ es inyectiva. Siendo así, por el Corolario 1 del Teorema 8, basta probar que $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable. Para ello definimos la función $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, donde $f(m, n) = 2^m \cdot 3^n$. Por la unicidad de la descomposición en factores primos, f es inyectiva, de donde proporciona una biyección de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ sobre el conjunto enumerable $f(\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \subset \mathbb{N}$.

Corolario 1. El conjunto $\mathbb{Q}$ de los números racionales es enumerable.

En efecto, si indicamos por $\mathbb{Z}^*$ el conjunto de los números enteros $\neq 0$, veremos que $\mathbb{Z}^*$ es enumerable. Luego es también enumerable el producto cartesiano $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$. Ahora, la función $f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^* \rightarrow \mathbb{Q}$, definida por $f(m, n) = \frac{m}{n}$, es sobreyectiva. Se sigue del Teorema 9 que $\mathbb{Q}$ es enumerable.

Corolario 2. Sean $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ conjuntos enumerables.

La unión $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$ es enumerable.

En palabras: una unión enumerable de conjuntos enumerables es un conjunto enumerable.

Para demostrarlo, tenemos, para cada $m \in \mathbb{N}$, una función sobreyectiva $f_m : \mathbb{N} \rightarrow X_m$. A continuación, definamos una función $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow X$ poniendo $f(m, n) = f_m(n)$. Se ve inmediatamente que f es sobreyectiva. Como $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable, se concluye del Teorema 9 que X es enumerable.

En particular, una unión finita $X = X_1 \cup \dots \cup X_n$ de conjuntos enumerables es enumerable: basta aplicar el corolario anterior, con $X_{n+1} = X_{n+2} = \dots = \emptyset$.

Aplicaciones repetidas del Teorema 10 muestran que, si $X_1, \dots, X_k$ son conjuntos enumerables, su producto cartesiano $X = X_1 \times \dots \times X_k$ es enumerable. No es verdad, sin embargo, que el producto cartesiano $X = \prod_{n=1}^{\infty} X_n$ de una secuencia de conjuntos enumerables sea siempre enumerable. Examinaremos este fenómeno en el párrafo siguiente.

2.5. Conjuntos no enumerables

El principal ejemplo de conjunto no enumerable que encontraremos en este libro será el conjunto $\mathbb{R}$ de los números reales. Esto se probará en el capítulo siguiente. Aquí veremos, mediante un argumento simple debido a Cantor, que existen conjuntos no enumerables. Más generalmente, mostraremos que, dado cualquier conjunto X , existe siempre un conjunto cuyo número cardinal es mayor que el de X .

No definiremos qué es el número cardinal de un conjunto pero diremos que dos conjuntos X e Y tienen el mismo número cardinal, y escribiremos

$$\text{card}(X) = \text{card}(Y),$$

para significar que existe una biyección $f : X \rightarrow Y$.

Así, dos conjuntos finitos tienen el mismo número cardinal si, y solo si, poseen el mismo número de elementos de acuerdo con la definición dada en el §3. Si X es infinito enumerable, se tiene $\text{card}(X) = \text{card}(Y)$ si, y solo si, Y es infinito enumerable.

Dados los conjuntos X, Y , diremos que $\text{card}(X) < \text{card}(Y)$ cuando exista una función inyectiva $f : X \rightarrow Y$ pero no exista una función sobreyectiva $f : X \rightarrow Y$.

El Teorema 7 muestra que, para todo conjunto infinito X , se tiene $\text{card}(\mathbb{N}) \leq \text{card}(X)$. Así, el número cardinal de un conjunto infinito enumerable es el menor de los números cardinales de los conjuntos infinitos.

Recordamos que, dados dos conjuntos X, Y , el símbolo $\mathcal{F}(X; Y)$ representa el conjunto de todas las funciones $f : X \rightarrow Y$.

Teorema 11. (Cantor). Sean X un conjunto arbitrario e Y un conjunto que

contenga al menos dos elementos. Ninguna función $\varphi : X \rightarrow \mathcal{F}(X; Y)$ es sobreyectiva.

Demostración. Dada $\varphi : X \rightarrow \mathcal{F}(X; Y)$, indicaremos con φ_x el valor de φ en el punto $x \in X$. Así, φ_x es una función de X en Y . Construiremos ahora una $f \in \mathcal{F}(X; Y)$ tal que $\varphi_x \neq f$ para todo $x \in X$. Esto se hace eligiendo, para cada $x \in X$, un elemento $f(x) \in Y$, diferente de $\varphi_x(x)$. Como Y contiene al menos dos elementos, esto es posible. La función $f : X \rightarrow Y$ así obtenida es tal que $f(x) \neq \varphi_x(x)$ y, por tanto, $f \neq \varphi_x$, para todo $x \in X$. Luego $f \notin \varphi(X)$ y, en consecuencia, φ no es sobreyectiva.

Corolario. Sean $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ conjuntos infinitos enumerables. El producto cartesiano $\prod_{n=1}^{\infty} X_n$ no es enumerable.

Basta considerar el caso en que todos los X_n son iguales a $\mathbb{N}$. En este caso, $\prod X_n = \mathcal{F}(\mathbb{N}; \mathbb{N})$, que no es enumerable, por el Teorema 11.

El argumento usado en la demostración del Teorema 11 se llama "método de la diagonal, de Cantor". Este nombre se debe al caso particular en que $X = \mathbb{N}$. Los elementos de $\mathcal{F}(\mathbb{N}; Y)$ son sucesiones de elementos de Y . Para probar que ninguna función $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{F}(\mathbb{N}; Y)$ es sobreyectiva, escribimos $\varphi(1) = s_1, \varphi(2) = s_2, \dots$ etc., donde $s_1, s_2, \dots$ son sucesiones de elementos de Y . Luego

$$s_1 = (y_{11}, y_{12}, y_{13}, \dots)$$

$$s_2 = (y_{21}, y_{22}, y_{23}, \dots)$$

$$s_3 = (y_{31}, y_{32}, y_{33}, \dots)$$

.....

A continuación, formamos una nueva sucesión $s = (y_1, y_2, y_3, \dots)$ de elementos de Y simplemente eligiendo, para cada $n \in \mathbb{N}$, un elemento $y_n \in Y$ diferente del n -ésimo término de la diagonal: $y_n \neq y_{nn}$. La sucesión s no

pertenece a la lista de las sucesiones s_n (pues el n -ésimo término de s es diferente del n -ésimo término de s_n). Así, ninguna lista enumerable puede agotar todas las funciones en $\mathcal{F}(\mathbb{N}; Y)$.

Como en el caso particular de este teorema, consideremos el conjunto de todas las listas infinitas (enumerables) que se pueden formar utilizando solo los dígitos 0 y 1, como por ejemplo,

$$\begin{array}{cccccccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & \dots \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & \dots \end{array}$$

El conjunto de todas estas listas de ceros y unos no es enumerable. Sea $\mathcal{P}(A)$ el conjunto de las partes de un conjunto dado A . Considerando el conjunto de dos elementos $\{0, 1\}$, veremos ahora que existe una biyección:

$$\xi : \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{F}(A; \{0, 1\}).$$

A cada $X \in \mathcal{P}(A)$, es decir, a cada subconjunto $X \subset A$, le asociamos la función $\xi_X : A \rightarrow \{0, 1\}$ llamada función característica del conjunto X : se tiene $\xi_X(x) = 1$ si $x \in X$ y $\xi_X(x) = 0$ si $x \notin X$.

La correspondencia $X \mapsto \xi_X$ es una biyección de $\mathcal{P}(A)$ sobre $\mathcal{F}(A; \{0, 1\})$. Su inversa asocia a cada función $f : A \rightarrow \{0, 1\}$ el conjunto X de los puntos $x \in A$ tales que $f(x) = 1$.

Como $\{0, 1\}$ tiene dos elementos, se sigue del Teorema 11 que ninguna función $\varphi : A \rightarrow \mathcal{F}(A; \{0, 1\})$ es sobreyectiva. En consecuencia, ninguna función $\psi : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ es sobreyectiva. (Si lo fuera, $\varphi = \xi \circ \psi : A \rightarrow \mathcal{F}(A; \{0, 1\})$ también sería sobreyectiva.)

Pero existe una función inyectiva evidente $f : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$, definida por $f(x) = \{x\}$. Concluimos entonces que $\text{card}(A) < \text{card}[\mathcal{P}(A)]$, para todo conjunto A .

Sobre números cardinales de conjuntos, informamos que, dados dos conjuntos A y B cualesquiera, vale una, y solo una, de las siguientes alternativas: $\text{card}(A) = \text{card}(B)$, $\text{card}(A) < \text{card}(B)$ o $\text{card}(B) < \text{card}(A)$. Además, si existen una función inyectiva $f : A \rightarrow B$ y una función inyectiva $g : B \rightarrow A$, existirá también una biyección $h : A \rightarrow B$.

Ejercicios

1. Pruebe que, en presencia de los axiomas P1 y P2, el axioma (A) siguiente es equivalente a P3. (A) Para todo subconjunto no vacío $A \subset \mathbb{N}$, se tiene $A - s(A) \neq \emptyset$.
2. Dados los números naturales a, b , pruebe que existe un número natural m tal que $m \cdot a > b$.
3. Sea a un número natural. Si un conjunto X es tal que $a \in X$ y, además, $n \in X \Rightarrow n + 1 \in X$, entonces X contiene todos los números naturales $\geq a$.
4. Intente descubrir, independientemente, algunas de las demostraciones omitidas en el texto. Si no logra alguna, consulte uno de los libros aquí citados, u otros de su predilección. [Sugerencia: Prácticamente todas las proposiciones sobre $\mathbb{N}$ se demuestran por inducción.]
5. Un elemento $a \in \mathbb{N}$ se llama antecesor de $b \in \mathbb{N}$ cuando se tiene $a < b$ pero no existe $c \in \mathbb{N}$ tal que $a < c < b$. Pruebe que, excepto 1, todo número natural posee un antecesor.
6. Use inducción para demostrar los siguientes hechos:
 - a) $2(1 + 2 + \cdots + n) = n(n + 1)$
 - b) $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n + 1) = (n + 1)^2$

- c) $(a - 1)(1 + a + \cdots + a^n) = a^{n+1} - 1$, cualesquiera sean $a, n \in \mathbb{N}$
- d) $n \geq 4 \Rightarrow n! > 2^n$
7. Use el Segundo Principio de Inducción para demostrar la unicidad de la descomposición de un número natural en factores primos.
8. Sea X un conjunto con n elementos. Use inducción para probar que el conjunto de las biyecciones (o permutaciones) $f : X \rightarrow X$ tiene $n!$ elementos.
9. Sean X e Y conjuntos finitos.
- Pruebe que $\text{card}(X \cup Y) + \text{card}(X \cap Y) = \text{card}(X) + \text{card}(Y)$.
 - ¿Cuál sería la fórmula correspondiente para tres conjuntos?
 - Generalice.
10. Dado un conjunto finito X , pruebe que una función $f : X \rightarrow X$ es inyectiva si, y solo si, es sobreyectiva (y por tanto una biyección).
11. Formula matemáticamente y demuestra el siguiente hecho (conocido como el "principio de los cajones" o principio de palomar). Si $m < n$, entonces, de cualquier modo que se guarden n objetos en m cajones, habrá siempre al menos un cajón que contendrá más de un objeto.
12. Sea X un conjunto con n elementos. Determina el número de funciones inyectivas $f : I_p \rightarrow X$.
13. ¿Cuántos subconjuntos con p elementos posee un conjunto X , sabiendo que X tiene n elementos?
14. Demuestra que si A tiene n elementos, entonces $\mathcal{P}(A)$ tiene 2^n elementos.
15. Define una función sobreyectiva $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, el conjunto $f^{-1}(n)$ sea infinito.

16. Demuestra que si X es infinito enumerable, el conjunto de las partes finitas de X también es (infinito) enumerable.
17. Sea $f : X \rightarrow X$ una función. Un subconjunto $Y \subset X$ se llama estable respecto a f cuando $f(Y) \subset Y$. Demuestra que un conjunto X es finito si, y solo si, existe una función $f : X \rightarrow X$ que solo admite los subconjuntos estables $\emptyset$ y X .
18. Sea $f : X \rightarrow X$ una función inyectiva tal que $f(X) \neq X$. Tomando $x \in X - f(X)$, demuestra que los elementos $x, f(x), f(f(x)), \dots$ son dos a dos distintos.
19. Sean X un conjunto infinito e Y un conjunto finito. Muestra que existe una función sobreyectiva $f : X \rightarrow Y$ y una función inyectiva $g : Y \rightarrow X$.
- 20.a) Si X es finito e Y es enumerable, entonces $\mathcal{F}(X; Y)$ es enumerable.
 b) Para cada función $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ sea $A_f = \{n \in \mathbb{N}; f(n) \neq 1\}$. Demuestra que el conjunto X de las funciones $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tales que A_f es finito es un conjunto enumerable.
21. Obtén una descomposición $\mathbb{N} = X_1 \cup X_2 \cup \dots \cup X_n \cup \dots$ tal que los conjuntos $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ sean infinitos y dos a dos disjuntos.
22. Define $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, poniendo $f(1, n) = 2n - 1$ y $f(m + 1, n) = 2^m \cdot (2n - 1)$. Prueba que f es una biyección.
23. Sea $X \subset \mathbb{N}$ un subconjunto infinito. Demuestra que existe una única biyección creciente $f : \mathbb{N} \rightarrow X$.
24. Demuestra que todo conjunto infinito se descompone como unión de una infinidad enumerable de conjuntos infinitos, dos a dos disjuntos.
25. Sea A un conjunto. Dadas dos funciones $f, g : A \rightarrow \mathbb{N}$, define la suma $f + g : A \rightarrow \mathbb{N}$, el producto $f \cdot g : A \rightarrow \mathbb{N}$, y da el significado de la afirmación $f \leq g$. Indicando con ξ_X la función característica de un subconjunto $X \subset A$,

prueba:

- a) $\xi_{X \cap Y} = \xi_X \cdot \xi_Y$;
- b) $\xi_{X \cup Y} = \xi_X + \xi_Y - \xi_{X \cap Y}$. En particular, $\xi_{X \cup Y} = \xi_X + \xi_Y \Leftrightarrow X \cap Y = \emptyset$;
- c) $X \subset Y \Leftrightarrow \xi_X \leq \xi_Y$;
- d) $\xi_{A-X} = 1 - \xi_X$.

26. Demuestra que el conjunto de las sucesiones crecientes $(n_1 < n_2 < n_3 < \dots)$ de números naturales no es enumerable.

27. Sean $(\mathbb{N}, s)$ y $(\mathbb{N}', s')$ dos pares formados, cada uno, por un conjunto y una función. Supongamos que ambos cumplen los axiomas de Peano. Demuestra que existe una única biyección $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}'$ tal que $f(1) = 1'$, $f(s(n)) = s'(f(n))$. Concluye que:

- a) $m < n \Leftrightarrow f(m) < f(n)$;
- b) $f(m + n) = f(m) + f(n)$; y
- c) $f(m \cdot n) = f(m) \cdot f(n)$.

28. Dada una sucesión de conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$, considere los conjuntos

$$\limsup A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(\bigcup_{i=n}^{\infty} A_i \right) \quad \text{y} \quad \liminf A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\bigcap_{i=n}^{\infty} A_i \right).$$

- a) Demuestre que $\limsup A_n$ es el conjunto de los elementos que pertenecen a A_n para una infinidad de valores de n y que $\liminf A_n$ es el conjunto de los elementos que pertenecen a todo A_n salvo para un número finito de valores de n .
- b) Concluya que $\liminf A_n \subset \limsup A_n$.
- c) Muestre que si $A_n \subset A_{n+1}$ para todo n , entonces $\liminf A_n = \limsup A_n =$

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n.$$

d) Por otro lado, si $A_n \supset A_{n+1}$ para todo n , entonces $\liminf A_n = \limsup A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$.

e) Dé un ejemplo de una sucesión (A_n) tal que $\limsup A_n \neq \liminf A_n$.

f) Dé un ejemplo de una sucesión para la cual los dos límites coinciden pero $A_m \not\subset A_n$ cualesquiera que sean m y n .

29. Dados los conjuntos A y B , suponga que existan funciones inyectivas $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow A$. Demuestre que existe una biyección $h : A \rightarrow B$. (Teorema de Cantor-Bernstein-Schröder.)

Capítulo 3

Números Reales

Todo lo que se dirá en los capítulos siguientes se referirá a conjuntos de números reales: funciones definidas y que toman valores en esos conjuntos, límites, continuidad, derivadas e integrales de esas funciones. Por ello, vamos a establecer ahora los fundamentos de la teoría de los números reales.

Nuestra actitud será la siguiente. Haremos una lista que contenga varios hechos elementales acerca de los números reales. Estos hechos serán admitidos como axiomas, es decir, no serán demostrados. A partir de ellos deduciremos ciertas consecuencias, que demostraremos como teoremas. Debemos aclarar que no solo lo que usaremos en este libro, sino todas las propiedades de los números reales se derivan lógicamente de los axiomas que enunciaremos en este capítulo. Estos axiomas presentan al conjunto $\mathbb{R}$ de los números reales como un cuerpo ordenado completo.

Como las nociones de cuerpo y de cuerpo ordenado poseen un interés algebraico propio, presentamos los axiomas de los números reales por etapas, dejando para el final la existencia del supremo, precisamente el axioma no algebraico, aquel que desempeñará el papel más importante en los capítulos siguientes.

Un espíritu más crítico indagaría sobre la existencia de los números reales, es decir, si realmente se conoce algún ejemplo de cuerpo ordenado completo. En otras palabras: partiendo de los números naturales (digamos, presentados a través de los axiomas de Peano) ¿sería posible, mediante extensiones sucesivas del concepto de número, llegar a la construcción de los números reales? La respuesta es afirmativa. Esto puede hacerse de varias maneras. El paso crucial es de los racionales a los reales, el cual puede seguir el método de las cortaduras de Dedekind o de las sucesiones de Cauchy (debido a Cantor), por citar solo los dos más populares.

“Es completamente irrelevante que un número real sea, por casualidad, una colección de números racionales; tal hecho nunca debería entrar en la demostración de cualquier teorema importante sobre números reales. Las demostraciones aceptables deberían usar solo el hecho de que los números reales forman un cuerpo ordenado completo...”

Así, cualquier proceso de construcción de los números reales a partir de los racionales es importante solo porque prueba que los cuerpos ordenados completos existen. A partir de ahí, todo lo que interesa es que $\mathbb{R}$ es un cuerpo ordenado completo.

Una pregunta relevante es, sin embargo, la siguiente: al definir el conjunto $\mathbb{R}$ de los números reales, ¿no estamos siendo ambiguos? En otras palabras, ¿acaso existen dos cuerpos ordenados completos con propiedades distintas? Esta es la cuestión de la unicidad de $\mathbb{R}$.

Evidentemente, en un sentido exageradamente estricto, no se puede decir que existe solo un cuerpo ordenado completo. Si construimos los números reales mediante cortaduras de Dedekind, obtenemos un cuerpo ordenado completo cuyos elementos son colecciones de números racionales. Si usamos el proceso de Cantor, el cuerpo ordenado completo que obtenemos está formado por clases de equivalencia de sucesiones de Cauchy. Son, por tanto, dos cuerpos

ordenados completos diferentes el uno del otro. El punto fundamental que ellos difieren solo por la naturaleza de sus elementos, pero no por la manera en que esos elementos se comportan. Ahora bien, ya acordamos, desde el capítulo anterior, adoptar el método axiomático, según el cual la naturaleza intrínseca de los objetos matemáticos es una cuestión irrelevante, siendo importante las relaciones entre esos objetos. Así pues, la manera adecuada de formular la cuestión de la unicidad de los números reales es la siguiente: ¿existen dos cuerpos ordenados completos no isomorfos? La respuesta es negativa. Dados K, L , cuerpos ordenados completos, existe una única biyección $f : K \rightarrow L$ tal que $f(x + y) = f(x) + f(y)$ y $f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y)$. La función f se llama un isomorfismo entre K y L . Ella cumple, ipso facto, la condición $x < y \Leftrightarrow f(x) < f(y)$. Los cuerpos K y L son, pues, isomorfos, es decir, indistinguibles en lo que respecta a propiedades de cuerpos ordenados completos.

3.1. Cuerpos

Un cuerpo es un conjunto K , provisto de dos operaciones, llamadas adición y multiplicación, que satisfacen ciertas condiciones, llamadas los axiomas de cuerpo, especificadas a continuación.

La adición hace corresponder a cada par de elementos $x, y \in K$ su suma $x + y \in K$, mientras que la multiplicación asocia a esos elementos su producto $x \cdot y \in K$. Los axiomas de cuerpo son los siguientes:

A. Axiomas de la adición

A1. Asociatividad

Cualesquiera que sean $x, y, z \in K$, se tiene $(x + y) + z = x + (y + z)$.

A2. Conmutatividad

cualesquiera que sean $x, y \in K$, se tiene $x + y = y + x$.

A3. Elemento neutro

Existe $0 \in K$ tal que $x + 0 = x$, sea cual sea $x \in K$. El elemento 0 se llama cero.

A4. Simétrico

Todo elemento $x \in K$ posee un simétrico $-x \in K$ tal que $x + (-x) = 0$.

De la conmutatividad se sigue que $0 + x = x$ y $-x + x = 0$, sea cual sea $x \in K$. La suma $x + (-y)$ se indicará con la notación $x - y$ y se llamará la diferencia entre x e y . La operación $(x, y) \mapsto x - y$ se llama sustracción.

Sumando y a ambos miembros de una igualdad del tipo $x - y = z$ se obtiene $x = y + z$. Análogamente, si $x = y + z$ entonces, sumando $-y$ a ambos miembros, se obtiene $x - y = z$. Por lo tanto, $x - y = z \Leftrightarrow x = y + z$. De ahí se deduce que el cero es único. Es decir, si $x + \theta = x$ (para algún $x \in K$ y algún $\theta \in K$) entonces $\theta = x - x$, o sea $\theta = 0$. Resulta también que todo $x \in K$ tiene solamente un simétrico: si $x + y = 0$, entonces $y = 0 - x$, es decir $y = -x$. También tenemos $-(-x) = x$, ya que $(-x) + x = 0$. Finalmente, vale la ley de cancelación: $x + z = y + z \Rightarrow x = y$ (basta sumar $-z$ a ambos miembros de la primera igualdad). Concluimos así que las reglas usuales relativas a la adición y sustracción se deducen de los cuatro axiomas anteriores y son, por tanto, válidas en cualquier cuerpo. A propósito, un conjunto donde está definida solo una operación que satisface estos axiomas es lo que se llama un grupo abeliano.

B. Axiomas de la multiplicación

M1. Asociatividad

Dados cualesquiera x, y, z en K , se tiene $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$.

M2. Conmutatividad

sean cuales fueren $x, y \in K$, vale $x \cdot y = y \cdot x$.

M3. Elemento neutro

Existe $1 \in K$ tal que $1 \neq 0$ y $x \cdot 1 = x$, cualquier que sea $x \in K$. El elemento

1 se llama uno.

M4. Inverso multiplicativo

Todo $x \neq 0$ en K posee un inverso $x^{-1} \in K$ tal que $x \cdot x^{-1} = 1$.

Por conmutatividad, se sigue que $x \cdot 1 = 1 \cdot x = x$ para todo $x \in K$, y que $x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = 1$ para todo $x \neq 0$ en K .

Los axiomas anteriores dicen, en particular, que los elementos diferentes de 0 en un cuerpo K forman un grupo abeliano respecto a la operación de multiplicación (el elemento neutro es 1 y, en lugar del simétrico $-x$, tenemos el inverso x^{-1}). En consecuencia, valen propiedades análogas a las que fueron demostradas arriba para la adición, teniendo el cuidado de recordar que 0 no posee inverso multiplicativo.

Dados x e y en K , con $y \neq 0$, se escribe también x/y en lugar de $x \cdot y^{-1}$. La operación $(x, y) \mapsto x/y$, definida para x cualquiera e $y \neq 0$ en K , se llama división y el resultado x/y es el cociente de x por y . No se divide por cero: $x/0$ no tiene sentido.

Si $y \neq 0$, se tiene $x/y = z \Leftrightarrow x = y \cdot z$. De ahí se deduce la utilísima ley de cancelación: si $x \cdot z = y \cdot z$ y $z \neq 0$, entonces $x = y$ (es importante tener en mente que $x \cdot z = y \cdot z$ solo implica $x = y$ cuando se sabe a priori que $z \neq 0$). Si $x \cdot y = x$ para todo $x \in K$, entonces tomando $x = 1$ obtenemos $y = 1$. Esto prueba la unicidad del 1. Sabiendo solo que $x \cdot y = x$ para un cierto x , hay dos posibilidades: si $x \neq 0$ entonces $y = 1$, por la ley de cancelación. Si, en cambio, $x = 0$ entonces y puede ser cualquiera pues, como veremos a continuación, $0 \cdot y = 0$ para todo $y \in K$. Finalmente, si $x \cdot y = 1$ entonces, como veremos más abajo, $x \neq 0$ e $y \neq 0$ y (multiplicando por x^{-1}) concluimos $y = x^{-1}$. Esto prueba la unicidad del elemento inverso.

Por último, las operaciones de adición y multiplicación en un cuerpo K se hallan relacionadas por un axioma, con el cual queda completa la definición

de cuerpo.

D1. Axioma de la distributividad.

Dados x, y, z cualesquiera en K , se tiene $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$.

Por conmutatividad, también se tiene $(x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z$.

De este axioma resulta que $x \cdot 0 = 0$ para todo $x \in K$. En efecto, $x \cdot 0 + x = x \cdot 0 + x \cdot 1 = x(0 + 1) = x \cdot 1 = x$, de donde $x \cdot 0 = 0$. Por otro lado, dados $x, y \in K$ con $x \cdot y = 0$, se sigue que $x = 0$ o $y = 0$. En efecto, si $x \cdot y = 0$ y $x \neq 0$, entonces obtenemos $x \cdot y = x \cdot 0$ y, por cancelación, $y = 0$. Así, en un cuerpo K , se tiene $x \cdot y \neq 0$ siempre que los dos factores x e y sean ambos diferentes de cero.

En el axioma de la distributividad está la explicación de las “reglas de los signos” del Álgebra Elemental: $(-x) \cdot y = x \cdot (-y) = -(x \cdot y)$ y $(-x) \cdot (-y) = x \cdot y$. En efecto, en primer lugar tenemos $(-x) \cdot y + x \cdot y = (-x + x) \cdot y = 0 \cdot y = 0$, de donde $(-x) \cdot y = -(x \cdot y)$. Análogamente, $x \cdot (-y) = -(x \cdot y)$. Luego $(-x) \cdot (-y) = -[x \cdot (-y)] = -[-(x \cdot y)] = x \cdot y$. En particular, $(-1) \cdot (-1) = 1$.

Ejemplos de cuerpos

Ejemplo 1. El conjunto $\mathbb{Q}$ de los números racionales, con las operaciones $\frac{p}{q} + \frac{p'}{q'} = \frac{pq' + p'q}{qq'}$ y $\frac{p}{q} \cdot \frac{p'}{q'} = \frac{pp'}{qq'}$. (Recordemos la igualdad: $\frac{p}{q} = \frac{p'}{q'} \Leftrightarrow pq' = p'q$.) El simétrico de $\frac{p}{q}$ es $-\frac{p}{q}$. El cero es $\frac{0}{q}$, sea cual sea $q \neq 0$. El inverso del número racional $\frac{p}{q} \neq 0$ es $\frac{q}{p}$.

Ejemplo 2. El cuerpo $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$, formado solo por dos elementos distintos 0 y 1, con las operaciones $0+1 = 1+0 = 1$, $0+0 = 1+1 = 0$, $0 \cdot 0 = 0 \cdot 1 = 1 \cdot 0 = 0$ y $1 \cdot 1 = 1$. Aquí, el simétrico de cada elemento es él mismo (y el inverso también).

Ejemplo 3. El cuerpo $\mathbb{Q}(i)$, cuyos elementos son los pares ordenados $z = (x, y)$ de números racionales (es decir, como conjunto, $\mathbb{Q}(i) = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$). Las ope-

raciones se definen así: $(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y')$ y $(x, y) \cdot (x', y') = (xx' - yy', x'y + xy')$. El cero es el elemento $(0, 0)$ y la unidad es el elemento $(1, 0)$. Escribiendo x para representar el par $(x, 0)$ y usando la notación $i = (0, 1)$, observamos que cada elemento $z = (x, y) = (x, 0) + (0, y)$ puede escribirse como $z = x + iy$ y que las operaciones anteriores fueron definidas de modo que los “números complejos” de la forma $z = x + iy$ se sumen y multipliquen de la manera usual, con el cuidado de notar que $i^2 = -1$. $\mathbb{Q}(i)$ se llama el cuerpo de los números complejos racionales. La verificación de los axiomas queda a cargo del lector. Por ejemplo, dado $z = (x, y) \neq 0$,

$$\text{se tiene } z^{-1} = \left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{-y}{x^2 + y^2} \right).$$

Ejemplo 4. El conjunto $\mathbb{Q}(t)$ de las funciones racionales

$$r(t) = \frac{p(t)}{q(t)},$$

donde p, q son polinomios con coeficientes racionales, siendo q no idénticamente nulo. Si $u(t)$ es también no idénticamente nulo, se tiene $\frac{p(t)}{q(t)} = \frac{p(t) \cdot u(t)}{q(t) \cdot u(t)}$. Las operaciones en $\mathbb{Q}(t)$ se definen de la manera obvia.

Para terminar estas consideraciones generales sobre cuerpos, observemos un hecho útil. En un cuerpo K , $x^2 = y^2 \Rightarrow x = \pm y$. En efecto, $x^2 = y^2 \Rightarrow x^2 - y^2 = 0 \Rightarrow (x + y)(x - y) = 0 \Rightarrow x + y = 0$ o $x - y = 0$. En el primer caso, $x = -y$ y, en el segundo, $x = y$.

3.2. Cuerpos ordenados

Un cuerpo ordenado es un cuerpo K , en el cual se ha destacado un subconjunto $P \subset K$, llamado el conjunto de los elementos positivos de K , tal que las siguientes condiciones se satisfacen:

P1. La suma y el producto de elementos positivos son positivos. Es decir, $x, y \in P \Rightarrow x + y \in P$ y $x \cdot y \in P$.

P2. Dado $x \in K$, exactamente una de las tres alternativas siguientes ocurre: o $x = 0$, o $x \in P$, o $-x \in P$.

Así, si indicamos con $-P$ el conjunto de los elementos $-x$, donde $x \in P$, tenemos $K = P \cup (-P) \cup \{0\}$, siendo los conjuntos P , $-P$ y $\{0\}$ disjuntos dos a dos. Los elementos de $-P$ se llaman negativos.

En un cuerpo ordenado, si $a \neq 0$ entonces $a^2 \in P$. En efecto, siendo $a \neq 0$, o $a \in P$ o $-a \in P$. En el primer caso, $a^2 = a \cdot a \in P$. En el segundo caso, $a^2 = (-a) \cdot (-a) \in P$. En particular, en un cuerpo ordenado $1 = 1 \cdot 1$ es siempre positivo.

Se sigue que $-1 \in -P$. En particular, en un cuerpo ordenado, -1 no es cuadrado de ningún elemento.

Ejemplo 5. $\mathbb{Q}$ es un cuerpo ordenado, en el cual el conjunto P está formado por los números racionales p/q tales que $p \cdot q \in \mathbb{N}$. (Intuitivamente, esto significa que los enteros p y q tienen “el mismo signo”.)

Ejemplo 6. El cuerpo $\mathbb{Q}(t)$ puede ser ordenado llamando positiva a una fracción $r(t) = \frac{p(t)}{q(t)}$ cuando, en el polinomio pq , el coeficiente del término de mayor grado es positivo. El conjunto P de las fracciones positivas según esta definición cumple las condiciones P1 y P2. En efecto, dadas las fracciones positivas $r = \frac{p}{q}$ y $r' = \frac{p'}{q'}$, los coeficientes de los términos de mayor grado en pq y en $p'q'$ son > 0 . En $r + r'$, el producto del numerador por el denominador es el polinomio $pq(q')^2 + p'q' \cdot q^2$, cuyo término de mayor grado debe tener coeficiente positivo. Luego, la suma de dos fracciones “positivas” es positiva. Las demás afirmaciones se verifican sin dificultad.

Ejemplo 7. El cuerpo $\mathbb{Z}_2$ no puede ser ordenado pues $1 + 1 = 0$ mientras que en un cuerpo ordenado 1 debe ser positivo y la suma $1 + 1$ de dos

elementos positivos debería ser aún positiva. También el cuerpo $\mathbb{Q}(i)$, de los números complejos racionales, no admite una ordenación compatible con sus operaciones pues el cuadrado del elemento $i = (0, 1)$ es igual a -1 . En un cuerpo ordenado, ningún cuadrado puede ser negativo y -1 siempre es negativo.

En un cuerpo ordenado K , escribiremos $x < y$, y diremos que x es menor que y , para significar que $y - x \in P$, es decir, que $y = x + z$, donde $z \in P$. En las mismas circunstancias, también se escribe $y > x$ y se dice que y es mayor que x .

En particular $x > 0$ significa que $x \in P$, esto es, que x es positivo, mientras que $x < 0$ quiere decir que x es negativo, es decir, que $-x \in P$. Si $x \in P$ e $y \in -P$ se tiene siempre $x > y$.

La relación de orden $x < y$ en un cuerpo ordenado K goza de las siguientes propiedades:

- O1. Transitividad – si $x < y$ e $y < z$ entonces $x < z$.
- O2. Tricotomía – dados $x, y \in K$, ocurre exactamente una de las siguientes alternativas: o $x = y$, o $x < y$, o $x > y$.
- O3. Monotonicidad de la adición – si $x < y$ entonces, para todo $z \in K$, se tiene $x + z < y + z$.
- O4. Monotonicidad de la multiplicación – si $x < y$ entonces, para todo $z > 0$, se tiene $xz < yz$. Si, en cambio, $z < 0$, entonces $x < y$ implica $xz > yz$.

Demostremos estas propiedades:

O1. Decir $x < y$ e $y < z$ significa afirmar que $y - x \in P$ y $z - y \in P$. Por P1 concluimos que $(z - y) + (y - x) \in P$, es decir, $z - x \in P$, lo que significa $x < z$.

O2. Dados $x, y \in K$, o bien $y - x \in P$, o bien $y - x = 0$, o bien $y - x \in -P$ (esto es, $x - y \in P$). En el primer caso se tiene $x < y$, en el segundo $x = y$ y

en el tercero $x > y$. Estas posibilidades se excluyen mutuamente, por P2.

O3. Si $x < y$ entonces $y - x \in P$, de donde $(y + z) - (x + z) = y - x \in P$. Esto significa que $x + z < y + z$.

O4. Si $x < y$ y $z > 0$ entonces $y - x \in P$ y $z \in P$. Luego $(y - x) \cdot z \in P$, es decir, $y \cdot z - x \cdot z \in P$, lo que significa $x \cdot z < y \cdot z$. Si, en cambio, $x < y$ y $z < 0$, entonces $y - x \in P$ y $-z \in P$, de donde $(y - x) \cdot (-z) \in P$, es decir, $x \cdot z - y \cdot z \in P$, lo que significa $y \cdot z < x \cdot z$.

En particular, en un cuerpo ordenado K , $x < y$ es equivalente a $-y < -x$. Basta multiplicar ambos miembros de cualquiera de estas desigualdades por -1 .

Se sigue de O1 y O3 que $x < y$ y $x' < y'$ implica $x + x' < y + y'$, es decir, se pueden sumar dos desigualdades miembro a miembro. En efecto, por O3, $x < y \Rightarrow x + x' < y + x'$ y $x' < y' \Rightarrow y + x' < y + y'$. Por O1, concluimos $x + x' < y + y'$.

Análogamente, de O1 y O4 se sigue que $0 < x < y$ y $0 < x' < y'$ implican $xx' < yy'$, es decir, se pueden multiplicar miembro a miembro dos desigualdades formadas por elementos positivos.

En un cuerpo ordenado K , el producto de un elemento $x > 0$ por un elemento $y < 0$ da un elemento $xy < 0$. (Basta observar que $x(-y) = -(x \cdot y)$ o bien multiplicar ambos miembros de $y < 0$ por x). Como $1 > 0$, concluimos de $x \cdot x^{-1} = 1$ que si $x > 0$ debe ser $x^{-1} > 0$ también. Así, el inverso de un elemento positivo es positivo. Se sigue que $x > 0$ e $y > 0$ implica $x/y > 0$.

Si $x < y$ y ambos son positivos, entonces $y^{-1} < x^{-1}$. Basta observar que $\frac{1}{y} - \frac{1}{x} = \frac{x-y}{xy}$.

En un cuerpo ordenado K , se escribe $x \leq y$ para significar que $x < y$ o $x = y$. Se lee: " x es menor o igual que y ". En las mismas circunstancias, se escribe

$y \geq x$. Esto quiere decir, evidentemente, que $y - x \in P \cup \{0\}$. Los elementos del conjunto $P \cup \{0\}$ se llaman no negativos y se caracterizan por la relación $x \geq 0$.

Se tiene, evidentemente, $x \leq x$ para todo $x \in K$.

Dados $x, y \in K$, se tiene $x = y$ si, y solamente si, $x \leq y$ e $y \leq x$. Es muy frecuente, en Análisis, probar que dos números x e y son iguales mostrando primero que $x \leq y$ y, después, que $y \leq x$.

Con la excepción de O2 (tricotomía), que es sustituida por las propiedades $x \leq x$ (reflexividad) y $x \leq y, y \leq x \Rightarrow x = y$ (antisimetría), todas las propiedades demostradas arriba para la relación $x < y$ se trasladan a $x \leq y$.

En un cuerpo ordenado K , como $1 > 0$, tenemos $1 < 1 + 1 < 1 + 1 + 1 < \dots$ y el subconjunto de K formado por estos elementos es, por tanto, infinito. Más precisamente, vamos a mostrar cómo se puede considerar el conjunto $\mathbb{N}$ de los números naturales inmerso de manera natural en K .

Temporalmente, indiquemos con el símbolo $1'$ el elemento unidad del cuerpo ordenado K . Definamos una función $f : \mathbb{N} \rightarrow K$ poniendo $f(1) = 1', f(2) = 1' + 1'$, etc. La manera correcta de definir f es por inducción: $f(1) = 1'$ y $f(m+1) = f(m) + 1'$. Por inducción, se verifica que $f(m+n) = f(m) + f(n)$ y que (como todos los valores $f(n)$ son positivos) $m < p \Rightarrow f(m) < f(p)$. Así, la función $f : \mathbb{N} \rightarrow K$ define una biyección del conjunto $\mathbb{N}$ de los números naturales sobre un subconjunto $\mathbb{N}' = f(\mathbb{N})$, formado por los elementos $1', 1' + 1', 1' + 1' + 1', \dots$. Se acostumbra identificar $\mathbb{N}'$ con $\mathbb{N}$ y considerar los números naturales contenidos en K . Esto es lo que haremos. Tenemos $\mathbb{N} \subset K$ y volvemos a escribir 1, en lugar de $1'$.

En particular, todo cuerpo ordenado es infinito y tiene "característica cero", es decir, $1 + 1 + \dots + 1 \neq 0$ siempre.

Dado el cuerpo ordenado K y considerando $\mathbb{N} \subset K$, como estamos haciendo,

los simétricos $-n$ de los elementos $n \in \mathbb{N}$ y además el cero ($0 \in K$) constituyen un grupo abeliano, que se identifica con el grupo $\mathbb{Z}$ de los enteros. Así, tenemos $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset K$.

Aún más, dados $m, n \in \mathbb{Z}$, con $n \neq 0$, existe el inverso $n^{-1} \in K$. Podemos, por tanto, referirnos al conjunto formado por todos los elementos $m \cdot n^{-1} = m/n \in K$, donde $m, n \in \mathbb{Z}$ y $n \neq 0$. Este conjunto es un subcuerpo de K (es decir, las operaciones de K , cuando se aplican a elementos de este conjunto, dan resultados aún dentro del conjunto). Se trata del menor subcuerpo de K . En efecto, todo subcuerpo debe contener al menos 0 y 1; por adiciones sucesivas de 1, todo subcuerpo de K debe contener a $\mathbb{N}$; por toma de simétricos, debe contener a $\mathbb{Z}$ y, por divisiones en $\mathbb{Z}$, debe contener al conjunto de las fracciones m/n , $m, n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$. Evidentemente, este menor subcuerpo de K se identifica con el cuerpo $\mathbb{Q}$ de los números racionales.

Concluimos así que, dado un cuerpo ordenado K , podemos considerar, de modo natural, las inclusiones $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset K$. Por ejemplo, el cuerpo $\mathbb{Q}(t)$ contiene las fracciones del tipo p/q , donde p y q son polinomios constantes, enteros, con $q \neq 0$. Estas fracciones forman el cuerpo $\mathbb{Q}$ y se tiene $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(t)$.

Ejemplo 8. Desigualdad de Bernoulli. En todo cuerpo ordenado K , si $n \in \mathbb{N}$ y $x \geq -1$, vale $(1+x)^n \geq 1+nx$. Esto se demuestra por inducción en n . Para $n = 1$ es obvio. De $(1+x)^n \geq 1+n \cdot x$ se deduce $(1+x)^{n+1} = (1+x)^n \cdot (1+x) \geq (1+nx)(1+x) = 1+nx+x+nx^2 = 1+(n+1)x+n \cdot x^2 \geq 1+(n+1)x$. (Se multiplicaron ambos miembros de la desigualdad $(1+x)^n \geq 1+n \cdot x$ por $1+x$. Por eso fue necesario suponer $x \geq -1$). Cuando $n > 1$ ($n \in \mathbb{N}$) y $x > -1$, se tiene, por el mismo argumento, la desigualdad estricta $(1+x)^n > 1+n \cdot x$, siempre que $x \neq 0$.

sobre la buena ordenación

El Principio de la Buena Ordenación no se aplica inmediatamente al conjunto $\mathbb{Z}$ de los enteros. Existen conjuntos no vacíos de números enteros que no

poseen un menor elemento. El propio $\mathbb{Z}$ es uno de ellos: cualquiera que sea $n \in \mathbb{Z}$, el entero $n - 1$ es menor que n , luego no existe un entero n_0 menor que todos los demás. También el conjunto $A = \{\dots, -4, -2, 0, 2, \dots\}$ de los enteros pares, es decir $A = \{2n; n \in \mathbb{Z}\}$, no posee un menor elemento. En general, si $X \subset \mathbb{N}$ es un conjunto infinito de números naturales, entonces el conjunto $-X = \{-n; n \in X\}$ es un conjunto no vacío de números enteros que no posee elemento mínimo.

Sin embargo, podemos constatar lo siguiente: si un conjunto no vacío $X \subset \mathbb{Z}$ está acotado inferiormente, es decir, si existe algún $a \in \mathbb{Z}$ tal que $a < x$ para todo $x \in X$, entonces X posee un elemento mínimo.

Este hecho se reduce al Principio de la Buena Ordenación del siguiente modo. Siendo $a < x$ para todo $x \in X$, concluimos que los elementos del conjunto no vacío $A = \{x - a; x \in X\}$ son todos números enteros positivos, es decir, $A \subset \mathbb{N}$. Luego existe $n_0 \in A$, $n_0 =$ menor elemento de A . Tenemos $n_0 = x_0 - a$, con $x_0 \in X$ y, como se verifica fácilmente, x_0 es el menor elemento del conjunto X .

Intervalos

En un cuerpo ordenado K , existe la importante noción de intervalo. Dados $a, b \in K$, con $a < b$, usaremos las notaciones siguientes:

$$\begin{aligned} [a, b] &= \{x \in K; a \leq x \leq b\} & (-\infty, b] &= \{x \in K; x \leq b\} \\ [a, b) &= \{x \in K; a \leq x < b\} & (-\infty, b) &= \{x \in K; x < b\} \\ (a, b] &= \{x \in K; a < x \leq b\} & [a, +\infty) &= \{x \in K; a \leq x\} \\ (a, b) &= \{x \in K; a < x < b\} & (a, +\infty) &= \{x \in K; a < x\} \\ (-\infty, +\infty) & & &= K \end{aligned}$$

Los cuatro intervalos de la izquierda tienen extremos a y b . $[a, b]$ es un intervalo cerrado, $[a, b)$ es cerrado a la izquierda, $(a, b]$ es cerrado a la derecha y (a, b)

es un intervalo abierto. Estos son intervalos acotados. Los cinco intervalos de la derecha son no acotados: $(-\infty, b]$ es la semirrecta izquierda cerrada, de origen b ; $(-\infty, b)$ es la semirrecta izquierda abierta, de origen b ; $[a, +\infty)$ es la semirrecta derecha cerrada, de origen a y $(a, +\infty)$ es la semirrecta derecha abierta, de origen a . Finalmente, el intervalo total $(-\infty, +\infty) = K$ puede ser considerado abierto o cerrado.

Cuando consideremos un intervalo de extremos a y b , suponemos siempre $a < b$, con una excepción que destacaremos ahora. Al tomar el intervalo cerrado $[a, b]$, es conveniente admitir el caso en que $a = b$. El intervalo $[a, a]$ consiste en un único punto a y se llama intervalo degenerado. Todo intervalo no degenerado es un conjunto infinito. Basta observar lo siguiente: en un cuerpo ordenado K , si $x < y$, entonces $x < \frac{x+y}{2} < y$. Así, si I es un intervalo que contiene los elementos a, b , con $a < b$, podemos obtener una infinidad de elementos $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ en I , tomando $x_1 = \frac{a+b}{2}$, $x_2 = \frac{a+x_1}{2}$, $\dots$, $x_{n+1} = \frac{a+x_n}{2}$, $\dots$. Tendremos $a < \dots < x_3 < x_2 < x_1 < b$.

En un cuerpo ordenado K , definiremos el valor absoluto de un elemento x , como x si $x \geq 0$ y $-x$ si $x < 0$. Usaremos el símbolo $|x|$ para indicar el valor absoluto. Así,

dado $x \in K$, se tiene

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

La noción de valor absoluto es de la mayor importancia en Análisis. Estudiaremos ahora sus propiedades.

Dado x en un cuerpo ordenado K , o bien x y $-x$ son ambos cero, o bien uno es positivo y el otro es negativo. Aquel entre x y $-x$ que no sea negativo será llamado $|x|$. Por tanto, $|x|$ es el mayor de los dos números x y $-x$. Este

hecho podría haberse usado como definición:

$$|x| = \max\{x, -x\}.$$

Tenemos, por tanto, $|x| \geq x$ y $|x| \geq -x$. Esta última desigualdad puede escribirse como $-|x| \leq x$. Así, tenemos

$$-|x| \leq x \leq |x|, \text{ para todo } x \in K.$$

Más generalmente, vale el

Teorema 1. Sean x, a elementos de un cuerpo ordenado K . Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (i) $-a \leq x \leq a$;
- (ii) $x \leq a$ y $-x \leq a$;
- (iii) $|x| \leq a$.

Demostración. $-a \leq x \leq a \Leftrightarrow [-a \leq x \text{ y } x \leq a] \Leftrightarrow [a \geq x \text{ y } a \geq -x] \Leftrightarrow a \geq |x|$. La última equivalencia se debe al hecho de que $|x|$ es el mayor de los dos elementos x y $-x$.

Corolario. Dados $a, x, b \in K$, se tiene $|x - a| \leq b$ si, y solamente si, $a - b \leq x \leq a + b$.

En efecto, por el teorema, $|x - a| \leq b$ es equivalente a $-b \leq x - a \leq b$, es decir, $a - b \leq x \leq a + b$ (sumando a).


Todas las afirmaciones del teorema y de su corolario son aún verdaderas con $<$ en lugar de $\leq$, como se verifica fácilmente.

En particular, tenemos las siguientes equivalencias, que serán ampliamente

utilizadas en el estudio de los límites y de las funciones continuas:

$$x \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon) \Leftrightarrow a - \varepsilon < x < a + \varepsilon \Leftrightarrow |x - a| < \varepsilon$$

Si representamos geométricamente los elementos de un cuerpo ordenado como puntos de una recta, el valor absoluto $|x - a|$ significa la distancia del punto x al punto a . La relación $x < y$ significa que x está a la izquierda de y . Las equivalencias anteriores expresan el hecho de que el intervalo abierto $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$, de centro a y radio ε , está formado por los puntos x cuya distancia a a es menor que ε .



Tales interpretaciones geométricas no deben intervenir en las demostraciones, pero constituyen una ayuda valiosísima para la comprensión de los conceptos y teoremas de Análisis.

Teorema 2. Para elementos arbitrarios de un cuerpo ordenado K , valen las relaciones:

- (i) $|x + y| \leq |x| + |y|$;
- (ii) $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$;
- (iii) $||x| - |y|| \leq |x - y|$;
- (iv) $|x - z| \leq |x - y| + |y - z|$.

Demostración. (i) se demuestra observando que $-|x| \leq x \leq |x|$ y $-|y| \leq y \leq |y|$, de donde, por adición, $-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|$. Por el Teorema 1 esto significa que $|x + y| \leq |x| + |y|$.

Para probar (ii), comenzamos notando que, sea cual sea $x \in K$, tenemos

$x^2 = |x|^2$, pues $|x|$ es uno de los elementos x o $-x$ y vale $x^2 = (-x)^2$. Luego $|x \cdot y|^2 = (x \cdot y)^2 = x^2 \cdot y^2 = |x|^2 \cdot |y|^2 = (|x| \cdot |y|)^2$. Se sigue de ahí que $|x \cdot y| = \pm |x| \cdot |y|$. Como $|x \cdot y|$ y $|x| \cdot |y|$ son ambos no negativos, concluimos que $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$.

Ahora probemos (iii). En virtud de (i), tenemos $|x| = |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y|$, lo que da $|x| - |y| \leq |x - y|$. Por el mismo motivo, tenemos $|y| - |x| \leq |y - x|$. Ahora, es evidente que $|y - x| = |x - y|$. Concluimos que $|y - x| \leq |x - y|$. Así, valen simultáneamente $|x - y| \geq |x| - |y|$ y $|x - y| \geq -(|x| - |y|)$. Por el Teorema 1, resulta que $||x| - |y|| \leq |x - y|$. La otra desigualdad en (iii) es obvia.

La última afirmación del teorema, la desigualdad (iv), resulta de (i) aplicada a la suma $x - z = (x - y) + (y - z)$.

Un subconjunto X de un cuerpo ordenado K se llama acotado superiormente cuando existe $b \in K$ tal que $b \geq x$ para todo $x \in X$. En otras palabras, se tiene $X \subset (-\infty, b]$. Cada $b \in K$ con esta propiedad se llama una cota superior de X .

Análogamente, $X \subset K$ se dice acotado inferiormente cuando existe $a \in K$ tal que $x \in X \Rightarrow a \leq x$. Un elemento $a \in K$ con esta propiedad se llama una cota inferior de X . Entonces se tiene $X \subset [a, +\infty)$.

Un subconjunto X de un cuerpo ordenado K se llama acotado cuando es acotado superior e inferiormente, es decir, cuando existen $a, b \in K$ tales que $X \subset [a, b]$.

Ejemplo 9. En el cuerpo $\mathbb{Q}$ de los números racionales, el conjunto $\mathbb{N}$ de los números naturales es acotado inferiormente, pues $\mathbb{N} \subset [0, \infty)$, pero no es acotado superiormente. En efecto, dado cualquier $p/q \in \mathbb{Q}$, se tiene $|p| + 1 \in \mathbb{N}$ y $|p| + 1 > p/q$. El conjunto $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ no es acotado superiormente ni inferiormente. Constituye quizá una sorpresa el hecho de que existen cuerpos

ordenados en los cuales el conjunto $\mathbb{N}$ es acotado superiormente. Uno de ellos es el cuerpo $\mathbb{Q}(t)$ de las funciones racionales, con el orden introducido en el Ejemplo 6. El polinomio $p(t) = t$ es una fracción con denominador 1, y por tanto pertenece a $\mathbb{Q}(t)$. Para todo $n \in \mathbb{N}$ el coeficiente del término de más alto grado de $t - n$ es positivo ($= 1$), luego $t - n \in \mathbb{P}$. Luego, tenemos $n < t$ cualquiera que sea $n \in \mathbb{N}$, es decir, $p(t) = t$ es una cota superior para $\mathbb{N}$ en $\mathbb{Q}(t)$. En este cuerpo, por tanto, el conjunto $\mathbb{N}$ es acotado.

A propósito de esta situación, tenemos la proposición siguiente.

Teorema 3. En un cuerpo ordenado K , las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (i) $\mathbb{N} \subset K$ es no acotado superiormente;
- (ii) dados $a, b \in K$, con $a > 0$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $n \cdot a > b$;
- (iii) dado cualquier $a > 0$ en K , existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $0 < \frac{1}{n} < a$.

Demostración. (i) $\Rightarrow$ (ii). Como $\mathbb{N}$ es no acotado, dados $a > 0$ y b en K , existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{b}{a} < n$ y, por tanto, $b < a \cdot n$. Para probar que (ii) $\Rightarrow$ (iii), dado $a > 0$, existe, en virtud de (ii), un $n \in \mathbb{N}$ tal que $n \cdot a > 1$. Entonces $0 < \frac{1}{n} < a$. Finalmente, mostremos que (iii) $\Rightarrow$ (i). Dado cualquier $b > 0$ existe, por (iii), un $n \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{n} < \frac{1}{b}$, es decir $n > b$. Así, ningún elemento > 0 en K puede ser cota superior de $\mathbb{N}$. Evidentemente, un elemento ≤ 0 tampoco puede. Luego $\mathbb{N}$ es no acotado superiormente.

Un cuerpo ordenado K se llama arquimediano cuando en él es válida cualquiera de las tres condiciones equivalentes citadas en el Teorema 3.

Así, el cuerpo $\mathbb{Q}$ de los números racionales es arquimediano, mientras que el cuerpo $\mathbb{Q}(t)$ de las funciones racionales, con el orden introducido en el Ejemplo 6, es no arquimediano.

3.3. Números reales

Sean K un cuerpo ordenado y $X \subset K$ un subconjunto acotado superiormente. Un elemento $b \in K$ se llama supremo del subconjunto X cuando b es la menor de las cotas superiores de X en K . (A veces se dice "extremo superior" en lugar de "supremo".)

Así, para que $b \in K$ sea el supremo de un conjunto $X \subset K$, es necesario y suficiente que se satisfagan las dos condiciones siguientes:

S1. Para todo $x \in X$, se tiene $x \leq b$;

S2. Si $c \in K$ es tal que $x \leq c$ para todo $x \in X$, entonces $b \leq c$.

La condición S1 dice que b es cota superior de X , mientras que S2 afirma que cualquier otra cota superior de X debe ser mayor o igual que b .

La condición S2 puede reformularse así:

S2'. Dado $c < b$ en K , existe $x \in X$ tal que $c < x$.

En efecto, la condición S2' dice que ningún elemento de K que sea inferior a b puede ser cota superior de X .

Es inmediato que si dos elementos b y b' en K cumplen las condiciones S1 y S2 anteriores, se debe tener $b \leq b'$ y $b' \leq b$, es decir, $b = b'$. Por lo tanto, el supremo de un conjunto, cuando existe, es único. Escribiremos $\sup X$ para indicarlo.

Las condiciones que caracterizan al supremo pueden, por tanto, escribirse así:

S1. $x \in X \Rightarrow x \leq \sup X$;

S2. $c \geq x$ para todo $x \in X \Rightarrow c \geq \sup X$;

S2'. Si $c < \sup X$ entonces existe $x \in X$ tal que $c < x$.

: Si $X = \emptyset$ entonces todo $b \in K$ es cota superior de X . Como no existe el

menor elemento en un cuerpo ordenado K , se sigue que el conjunto vacío $\emptyset$ no posee supremo en K . Lo mismo se aplica para el ínfimo, que estudiaremos ahora.

Análogamente, un elemento $a \in K$ se llama ínfimo de un conjunto $Y \subset K$, acotado inferiormente, cuando a es la mayor de las cotas inferiores de K .

Para que $a \in K$ sea el ínfimo de $Y \subset K$ es necesario y suficiente que se satisfagan las condiciones siguientes:

- I1. Para todo $y \in Y$ se tiene $a \leq y$;
- I2. Si $c \in K$ es tal que $c \leq y$ para todo $y \in Y$, entonces $c \leq a$.

El ínfimo de Y , cuando existe, es único y se escribe $a = \inf Y$. La condición I2 anterior puede reformularse en los siguientes términos:

- I2'. Dado $c \in K$ con $a < c$, existe $y \in Y$ tal que $y < c$.

Esto significa que un elemento c de K que sea mayor que a no puede ser cota inferior de Y .

Ejemplo 10. Si $X \subset K$ posee un elemento máximo, este será su supremo; si X posee un elemento mínimo, este será su ínfimo. Recíprocamente, si $\sup X$ pertenece a X , entonces es el mayor elemento de X ; si $\inf X$ pertenece a X , será su menor elemento. En particular, todo subconjunto finito $X \subset K$ posee ínfimo y supremo. Otro ejemplo: si $X = (-\infty, b]$ e $Y = [a, +\infty)$, tenemos $\inf Y = a$ y $\sup X = b$.

Ejemplo 11. Dados $a < b$ en K , sea $X = (a, b)$ el intervalo abierto con esos extremos. Se tiene $\inf X = a$ y $\sup X = b$. En efecto, a es evidentemente una cota inferior de X . Probemos ahora que ningún $c \in K$ con $a < c$ es cota inferior de X . Esto es claro si $c \geq b$. Por otro lado, si $a < c < b$, entonces $x = \frac{a+c}{2}$ es un elemento de X , con $a < x < c$, lo que prueba que c no es cota inferior de X . Así $a = \inf X$. De manera análoga se muestra que $b = \sup X$.

En este caso, se tiene $\sup X \notin X$ e $\inf X \notin X$.

Ejemplo 12. Sea $Y \subset \mathbb{Q}$ el conjunto de las fracciones del tipo $\frac{1}{2^n}$, con $n \in \mathbb{N}$.

Afirmamos que $\inf Y = 0$ y $\sup Y = \frac{1}{2}$. En efecto, en primer lugar, tenemos $\frac{1}{2} \in Y$ y $\frac{1}{2^n} < \frac{1}{2}$ para todo $n > 1$. Luego $\frac{1}{2}$ es el mayor elemento de Y y, por consiguiente, $\frac{1}{2} = \sup Y$. Por otro lado, como $0 < \frac{1}{2^n}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, vemos que 0 es cota inferior de Y . Solo resta probar que ningún número racional $c > 0$ es cota inferior de Y . En efecto, siendo $\mathbb{Q}$ arquimediano, dado $c > 0$, podemos obtener $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > \frac{1}{c} - 1$. Esto significa $1 + n > \frac{1}{c}$. [Ahora, por la desigualdad de Bernoulli (Ejemplo 8),] tenemos $2^n = (1 + 1)^n \geq 1 + n > \frac{1}{c}$, es decir, $\frac{1}{2^n} < c$. Luego ningún $c > 0$ es cota inferior de Y y, por tanto, $\inf Y = 0$.

La insuficiencia más grave de los números racionales, para efectos del Análisis Matemático, es el hecho de que algunos conjuntos acotados de números racionales no poseen supremo (o ínfimo). Este hecho está ligado a la inexistencia de raíces cuadradas racionales de ciertos números enteros, pero es una dificultad que va mucho más allá de esa falta.

Pitágoras y sus discípulos descubrieron el siguiente

Lema. No existe un número racional cuyo cuadrado sea igual a 2.

Demostración. Supongamos, por absurdo, que se tenga $\left(\frac{p}{q}\right)^2 = 2$, es decir $p^2 = 2q^2$, con p y q enteros. El factor 2 aparece un número par de veces en la descomposición de p^2 y de q^2 en factores primos. Luego p^2 contiene un número par de factores iguales a 2 mientras que $2q^2$ contiene un número impar de esos factores. Siendo así, no puede tenerse $p^2 = 2q^2$.

Ejemplo 13. Sean $X = \{x \in \mathbb{Q}; x \geq 0 \text{ y } x^2 < 2\}$ e $Y = \{y \in \mathbb{Q}; y > 0 \text{ y } y^2 > 2\}$. Como $x > 2 \Rightarrow x^2 > 4 \Rightarrow x \notin X$, concluimos que $X \subset [0, 2]$, luego X es un conjunto acotado de números racionales. Por otro lado, $Y \subset (0, +\infty)$, de modo que Y es acotado inferiormente. Mostraremos ahora que no existen

$\sup X$ ni $\inf Y$ en $\mathbb{Q}$. (Es claro que existe $\inf X = 0$, pues 0 es el menor elemento de X .) Para esto, estableceremos los siguientes hechos:

A) El conjunto X no posee elemento máximo. En efecto, dado $x \in X$ (esto es, dado un número racional no negativo cuyo cuadrado es inferior a 2), tomamos un número racional $r < 1$ tal que $0 < r < \frac{2-x^2}{2x+1}$. Afirmamos que $x+r$ todavía pertenece a X . En efecto, de $r < 1$ se sigue $r^2 < r$. De la otra desigualdad que r satisface se sigue $r(2x+1) < 2-x^2$. Por consiguiente, $(x+r)^2 = x^2 + 2rx + r^2 < x^2 + 2rx + r = x^2 + r(2x+1) < x^2 + 2 - x^2 = 2$. Así, dado cualquier $x \in X$, existe un número mayor, $x+r \in X$.

B) El conjunto Y no posee elemento mínimo. En efecto, dado cualquier $y \in Y$, tenemos $y > 0$ y $y^2 > 2$. Luego podemos obtener un número racional r tal que $0 < r < \frac{y^2-2}{2y}$. Entonces $2ry < y^2 - 2$ y de ahí $(y-r)^2 = y^2 - 2ry + r^2 > y^2 - 2ry > 2$. Obsérvese también que $r < \frac{y}{2} - \frac{1}{y}$, de donde $r < y$, es decir, $y-r$ es positivo. Así, dado $y \in Y$ arbitrario, podemos obtener $y-r \in Y$, $y-r < y$.

C) Si $x \in X$ e $y \in Y$, entonces $x < y$. En efecto, se tiene $x^2 < 2 < y^2$ y, por tanto, $x^2 < y^2$. Como x e y son ambos positivos, se concluye que $x < y$. (Estrictamente, podría ser $x = 0$, pero, en este caso, la conclusión $x < y$ es obvia.)

Usando los hechos A, B y C, mostremos que, entre los números racionales, no existen $\sup X$ ni $\inf Y$.

Supongamos, primero, que existiera $\alpha = \sup X$. Sería forzosamente $\alpha > 0$. No podría ser $\alpha^2 < 2$ porque eso obligaría $\alpha \in X$ y, entonces, α sería el elemento máximo de X , que no existe, por A. Tampoco podría ser $\alpha^2 > 2$, porque eso haría $\alpha \in Y$. Como, en virtud de B, Y no posee elemento mínimo, existiría $b \in Y$, con $b < \alpha$. Usando C, concluiríamos que $x < b < \alpha$ para todo $x \in X$, lo que contradice que $\alpha = \sup X$.

Así, si existiera $\alpha = \sup X$, debería ser $\alpha^2 = 2$. Pero, por el Lema de Pitágoras, ningún número racional existe con esta propiedad. Concluimos que en $\mathbb{Q}$ el conjunto X no posee supremo.

Un razonamiento enteramente análogo, basado en los hechos A, B y C, mostraría que el número $b = \inf Y$, si existiera, debe satisfacer $b^2 = 2$, y, por tanto, Y no posee ínfimo en $\mathbb{Q}$.

Al mismo tiempo, estos argumentos muestran que, si existiera un cuerpo ordenado en el que todo conjunto no vacío, acotado superiormente, posea supremo, existiría, en dicho cuerpo, un elemento $a > 0$ cuyo cuadrado es 2. En efecto, tal cuerpo, siendo ordenado, contiene a $\mathbb{Q}$, luego contiene al conjunto X y en él existirá $a = \sup X$, cuyo cuadrado, no pudiendo ser menor ni mayor que 2, deberá ser igual a 2. Se escribe $a = \sqrt{2}$.

Ejemplo 14. Veamos ahora otro ejemplo de un conjunto acotado superiormente en un cuerpo ordenado K , el cual no posee supremo en K . Para ello, tomemos un cuerpo no arquimediano K . El conjunto $\mathbb{N} \subset K$ es acotado superiormente. Si $b \in K$ es una cota superior de $\mathbb{N}$, entonces $n + 1 \leq b$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Se sigue que $n \leq b - 1$ cualquiera que sea $n \in \mathbb{N}$. En otras palabras, si $b \in K$ es una cota superior de $\mathbb{N}$, $b - 1$ también lo será. Como $b - 1 < b$, se sigue que, en un cuerpo no arquimediano K , el conjunto $\mathbb{N}$ de los números naturales es acotado superiormente pero no existe $\sup \mathbb{N}$ en K .

Un cuerpo ordenado K se llama completo cuando todo subconjunto no vacío, acotado superiormente, $X \subset K$, posee supremo en K .

Resulta de la definición que, en un cuerpo ordenado completo, todo conjunto no vacío, acotado inferiormente, $Y \subset K$, posee un ínfimo. En efecto, dado Y , sea $X = -Y$, esto es, $X = \{-y; y \in Y\}$. Entonces X es no vacío y acotado superiormente; luego existe $a = \sup X$. Como se ve fácilmente, se tiene $-a = \inf Y$.

Se sigue del Ejemplo 14 anterior que todo cuerpo ordenado completo es arquimediano.

Adoptaremos, a partir de ahora, el axioma fundamental del Análisis Matemático.

Axioma. Existe un cuerpo ordenado completo, $\mathbb{R}$, llamado el cuerpo de los números reales.

Pasaremos a examinar ahora algunas propiedades de los números reales que resultan inmediatamente de la definición de $\mathbb{R}$ como un cuerpo ordenado completo.

Como se observó al final del Ejemplo 13, existe en $\mathbb{R}$ un número positivo a tal que $a^2 = 2$. Este número se representa con el símbolo $\sqrt{2}$. Es claro que solo existe un número positivo cuyo cuadrado es 2, pues $a^2 = b^2 = 2 \Rightarrow 0 = a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) \Rightarrow a + b = 0$ o $a - b = 0$. En el primer caso, $a = -b$ (luego no pueden ser a y b ambos positivos) y en el segundo $a = b$. Por el Lema de Pitágoras, $\sqrt{2}$ no es un número racional.

A los elementos del conjunto $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$, es decir, a los números reales que no son racionales, los llamaremos números irracionales. Así, $\sqrt{2}$ es un número irracional. Veremos otros más adelante.

Probaremos ahora que, dados $a > 0$ en $\mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$ cualesquiera, existe un único número real $b > 0$ tal que $b^n = a$. El número b se llama la raíz n -ésima de a y se representa por el símbolo $b = \sqrt[n]{a}$. La demostración imita el argumento usado en el Ejemplo 13. Veámosla.

Consideramos el conjunto $X = \{x \in \mathbb{R}; x \geq 0, x^n < a\}$. El conjunto X es no vacío (pues $0 \in X$) y es acotado superiormente. (Si $a < 1$, entonces 1 es una cota superior de X . Si $a > 1$, entonces $a^n > a$ y de ahí a es una cota superior de X .)

Sea $b = \sup X$. Afirmamos que $b^n = a$. Esto se basa en los siguientes hechos:

A) El conjunto X no posee elemento máximo. Dado $x \in X$ cualquiera, probaremos que es posible tomar $d > 0$ tan pequeño que aún se tenga $(x+d)^n < a$, es decir $x+d \in X$. Para ello, usaremos un hecho auxiliar, que demostraremos por inducción. Se trata del siguiente: dado $x > 0$ existe, para cada n , un número real positivo A_n (dependiendo de x) tal que $(x+d)^n \leq x^n + A_n \cdot d$, sea cual sea d con $0 < d < 1$. Esto es claro para $n = 1$. Suponiéndolo verdadero para n , tenemos $(x+d)^{n+1} = (x+d)^n(x+d) \leq (x^n + A_n \cdot d)(x+d) = x^{n+1} + A_n \cdot d \cdot x + d \cdot x^n + A_n \cdot d^2 = x^{n+1} + (A_n \cdot x + x^n + A_n \cdot d) \cdot d < x^{n+1} + (A_n \cdot x + x^n + A_n) \cdot d$ (ya que $0 < d < 1$). Tomando $A_{n+1} = A_n \cdot x + x^n + A_n$, obtenemos $(x+d)^{n+1} < x^{n+1} + A_{n+1} \cdot d$.

Ahora, si $x \in X$, es decir, $x \geq 0$ y $x^n < a$, tomamos d tal que $d < 1$ y $0 < d < \frac{a-x^n}{A_n}$. Tendremos $x^n + A_n \cdot d < a$ y, por consiguiente, $(x+d)^n < a$, lo que prueba que X no posee elemento máximo.

B) El conjunto $Y = \{y \in \mathbb{R}; y > 0, y^n > a\}$ no posee elemento mínimo. Sea $y \in Y$. Escogeremos d , con $0 < d < y$, tal que $(y-d)^n > a$, es decir, $y-d \in Y$. Para ello observamos que, siendo $0 < d < y$, tenemos $(y-d)^n = y^n \left(1 - \frac{d}{y}\right)^n > y^n \left(1 - n \cdot \frac{d}{y}\right) = y^n - ny^{n-1} \cdot d$, como resulta de la desigualdad de Bernoulli (Ejemplo 8), con $x = -\frac{d}{y}$. Si tomamos $0 < d < \frac{y^n - a}{n \cdot y^{n-1}}$ obtenemos entonces $y^n - ny^{n-1}d > a$ y, por tanto, $(y-d)^n > a$. Esto muestra que Y no posee elemento mínimo.

C) Si $x \in X$ e $y \in Y$ entonces $x < y$. En efecto, en estas condiciones $x^n < a < y^n$ y, como x e y son positivos, se sigue $x < y$. (El caso $x = 0$ da $x < y$ obviamente.)

Se deduce de A, B y C que el número $b = \sup X$ satisface la condición $b^n = a$. En efecto, si fuera $b^n < a$ entonces b pertenecería al conjunto X del cual es supremo, luego b sería el elemento máximo de X , lo que contradice A. Tampoco puede ser $b^n > a$ porque entonces $b \in Y$ y como, por B, Y no

posee elemento mínimo, habría un $c \in Y$ con $c < b$. Por C , vendría $x < c < b$ para todo $x \in X$: c sería una cota superior de X menor que $b = \sup X$, otra contradicción. Luego, debe ser $b^n = a$.

De ahora en adelante, todos los intervalos que consideremos se referirán al conjunto $\mathbb{R}$ de los números reales.

Por lo que acabamos de ver, dado $n \in \mathbb{N}$, la función $f : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$, definida por $f(x) = x^n$, es sobreyectiva. Es claro que $0 < x < y$ implica $0 < x^n < y^n$ (por la monotonía de la multiplicación). Luego f es inyectiva y por tanto es una biyección de $[0, +\infty)$ sobre sí mismo. Su función inversa está dada por $y \mapsto \sqrt[n]{y}$, la raíz n -ésima (positiva única) de $y > 0$.

El Lema de Pitágoras muestra que el número real $\sqrt{2}$ no es racional. Generalizando este hecho, probaremos ahora que, dado un $n \in \mathbb{N}$, si un número natural m no posee una raíz n -ésima natural, tampoco poseerá una raíz n -ésima racional. En efecto, sea $\left(\frac{p}{q}\right)^n = m$. Podemos suponer p y q primos entre sí. Entonces p^n y q^n también serán primos entre sí. Pero tenemos $p^n = q^n \cdot m$, lo que implica que q^n es un divisor de p^n . Absurdo, a menos que fuera $q = 1$. En resumen, dados $m, n \in \mathbb{N}$, si $\sqrt[n]{m} \notin \mathbb{N}$ entonces $\sqrt[n]{m} \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$.


Los números reales que no son racionales, es decir, los elementos del conjunto $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$, se llaman números irracionales. Acabamos de ver que existen: $\sqrt{2}, \sqrt{5}, \sqrt{6}$, etc. son números irracionales. Pero hay muchos otros, obtenidos de modos mucho más complicados que simplemente extraer raíces no enteras de números enteros o incluso resolver ecuaciones algebraicas con coeficientes enteros.

Mostraremos ahora que los números irracionales se hallan esparcidos por todas partes entre los números reales. A continuación, probaremos que hay más números irracionales que racionales. Para explicar precisamente lo que significa "esparcidos por todas partes", comenzaremos con una definición.

Un conjunto $X \subset \mathbb{R}$ se llama denso en $\mathbb{R}$ cuando todo intervalo abierto (a, b) contiene algún punto de X .

En otras palabras, diremos que el conjunto X de números reales es denso en $\mathbb{R}$ cuando, dados arbitrariamente $a < b$ en $\mathbb{R}$, sea posible encontrar $x \in X$ tal que $a < x < b$.

Por ejemplo, sea $X = \mathbb{C}\mathbb{Z}$ [esto es, el complemento de los enteros] el conjunto de los números reales que no son enteros. X es denso en $\mathbb{R}$. En efecto, todo intervalo (a, b) es un conjunto infinito, mientras que existe a lo sumo un número finito de enteros n tales que $a < n < b$. Luego cualquier intervalo (a, b) contiene elementos de X (es decir, números reales no enteros).



Es recomendable pensar en los números reales como puntos de una recta, siendo la distancia de x a y dada por $|x - y|$ y significando la relación $x < y$ que x está a la izquierda de y . En este caso, los números enteros se hallan a una distancia entera ≥ 1 unos de otros. La imagen geométrica deja evidente que $\mathbb{C}\mathbb{Z}$ [complemento de los enteros] es denso en $\mathbb{R}$, aunque ello no deba intervenir en la demostración de este hecho.

Teorema 4. El conjunto $\mathbb{Q}$ de los números racionales y el conjunto $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ de los números irracionales son ambos densos en $\mathbb{R}$.

Demostración. Sea (a, b) un intervalo abierto cualquiera en $\mathbb{R}$. Debemos mostrar que existen un número racional y un número irracional en (a, b) . Como $b - a > 0$, existe un número natural p tal que $0 < \frac{1}{p} < b - a$. Los números de la forma $\frac{m}{p}$, $m \in \mathbb{Z}$, descomponen la recta $\mathbb{R}$ en intervalos de longitud $\frac{1}{p}$. Como $\frac{1}{p}$ es menor que la longitud $b - a$ del intervalo (a, b) , alguno de los números $\frac{m}{p}$ debe caer dentro de (a, b) . Esta es la idea intuitiva de la demostración. Razonemos ahora lógicamente. Sea

$A = \{m \in \mathbb{Z}; \frac{m}{p} \geq b\}$. Como $\mathbb{R}$ es arquimediano, A es un conjunto no vacío de números enteros, acotado inferiormente por $b \cdot p$. Sea $m_0 \in A$ el menor elemento de A . Entonces $b \leq \frac{m_0}{p}$, pero, como $m_0 - 1 < m_0$, se tiene $\frac{m_0-1}{p} < b$. Afirmamos que $a < \frac{m_0-1}{p} < b$. En efecto, si no fuera así, tendríamos $\frac{m_0-1}{p} \leq a < b \leq \frac{m_0}{p}$. Esto acarrearía $b - a \leq \frac{m_0}{p} - \frac{m_0-1}{p} = \frac{1}{p}$, una contradicción. Luego, el número racional $\frac{m_0-1}{p}$ pertenece al intervalo (a, b) . Para obtener un número irracional en el intervalo (a, b) , tomamos $p \in \mathbb{N}$ tal que $1 < \frac{b-a}{\sqrt{2}} < b - a$. Los números de la forma $\frac{m\sqrt{2}}{p}$, donde $m \in \mathbb{Z}$, son (salvo $m = 0$) irracionales y dividen la recta $\mathbb{R}$ en intervalos de longitud $\frac{\sqrt{2}}{p}$. Como $\frac{\sqrt{2}}{p}$ es menor que la longitud $b - a$ del intervalo (a, b) , se concluye que algún $\frac{m\sqrt{2}}{p}$ debe pertenecer a (a, b) . La demostración formal se hace como en el caso anterior: si m_0 es el menor entero tal que $b \leq \frac{m_0\sqrt{2}}{p}$ entonces el número irracional $\frac{(m_0-1)\sqrt{2}}{p}$ pertenece al intervalo (a, b) .

El teorema siguiente, a veces llamado “Principio de los Intervalos Encajados”, es usado por algunos autores en la definición de los números reales.

Teorema 5. Sea $I_1 \supset I_2 \supset \cdots \supset I_n \supset \cdots$ una sucesión decreciente de intervalos limitados y cerrados $I_n = [a_n, b_n]$. La intersección $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$ no es vacía. Es decir, existe al menos un número real x tal que $x \in I_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Más precisamente, tenemos $\bigcap I_n = [a, b]$, donde $a = \sup a_n$ y $b = \inf b_n$.

Demostración. Para $n \in \mathbb{N}$, tenemos $I_{n+1} \subset I_n$, lo que significa $a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n$. Podemos entonces escribir:

$$a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n \leq \cdots \leq b_n \leq \cdots \leq b_2 \leq b_1$$

.

Llamemos A al conjunto de los a_n y B al conjunto de los b_n . A es acotado: a_1 es una cota inferior y cada b_n es una cota superior de A . Por motivo semejante, B es también acotado. Sean $a = \sup A$ y $b = \inf B$. Como cada b_n es cota superior de A , tenemos $a \leq b_n$ para cada n . Así, a es cota inferior

de B y, por tanto, $a \leq b$. Podemos entonces escribir:

$$a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n \leq \cdots \leq a \leq b \leq \cdots \leq b_n \leq \cdots \leq b_2 \leq b_1.$$

Concluimos que a y b (pudiendo ser $a = b$) pertenecen a todos los I_n , de donde $[a, b] \subset I_n$ para cada n . Luego $[a, b] \subset \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$. Es más, ningún $x < a$ puede pertenecer a todos los intervalos I_n . En efecto, siendo $x < a = \sup A$, existe algún $a_n \in A$ tal que $x < a_n$, es decir, $x \notin I_n$. Del mismo modo, $y > b \Rightarrow y > b_m$ para algún m , de donde $y \notin I_m$. Concluimos entonces que $\bigcap I_n = [a, b]$.

Usaremos el Teorema 5 para probar que el conjunto de los números reales no es enumerable.

Teorema 6. El conjunto $\mathbb{R}$ de los números reales no es enumerable.

Demostración. Dados un intervalo limitado, cerrado $I = [a, b]$, con $a < b$, y un número real x_0 , existe un intervalo cerrado, limitado, $J = [c, d]$, con $c < d$, tal que $x_0 \notin J$ y $J \subset I$. Esto puede verificarse fácilmente. Usaremos este hecho repetidamente para mostrar que, dado cualquier subconjunto enumerable $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\} \subset \mathbb{R}$, podemos encontrar un número real $x \notin X$. En efecto, sean I_1 un intervalo cerrado limitado no degenerado tal que $x_1 \notin I_1$; I_2 un intervalo del mismo tipo con $x_2 \notin I_2$ e $I_2 \subset I_1$; y así inductivamente: suponiendo obtenidos $I_1 \supset I_2 \supset \cdots \supset I_n$ cerrados limitados no degenerados, con $x_i \notin I_i$ ($1 \leq i \leq n$), podemos obtener $I_{n+1} \subset I_n$ con $x_{n+1} \notin I_{n+1}$. Esto nos proporciona una sucesión decreciente $I_1 \supset \cdots \supset I_n \supset \cdots$ de intervalos limitados y cerrados. Por el Teorema 5, existe un número real x que pertenece a todos los I_n . Como $x_n \notin I_n$, se sigue que x no es ninguno de los x_n , y por tanto ningún conjunto enumerable X puede contener todos los números reales.

Corolario 1. Todo intervalo no degenerado de números reales es no enumerable.

table.

En efecto, como $f : (0, 1) \rightarrow (a, b)$, definida por $f(x) = (b - a)x + a$, es una biyección del intervalo abierto $(0, 1)$ en el intervalo abierto arbitrario (a, b) , si probamos que $(0, 1)$ no es enumerable, resultará que ningún intervalo no degenerado puede ser enumerable. Ahora bien, si $(0, 1)$ fuera enumerable, $(0, 1]$ también lo sería y, consecuentemente, para cada $n \in \mathbb{Z}$, el intervalo $(n, n + 1]$ sería enumerable (pues $x \mapsto x + n$ es una biyección de $(0, 1]$ sobre $(n, n + 1]$). Pero $\mathbb{R} = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} (n, n + 1]$ sería enumerable, por ser una unión enumerable de conjuntos enumerables.

Corolario 2. El conjunto de los números irracionales no es enumerable.

En efecto, tenemos $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} - \mathbb{Q})$. Sabemos que $\mathbb{Q}$ es enumerable. Si $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ también lo fuera, $\mathbb{R}$ sería enumerable, como unión de dos conjuntos enumerables.

Ejercicios

1. Dados a, b, c, d en un cuerpo K , siendo b y d diferentes de cero, pruebe:

$$1^a) \quad \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$$

$$2^a) \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

2. Dado $a \neq 0$ en un cuerpo K , se define, por definición, $a^0 = 1$ y, si $n \in \mathbb{N}$, $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ es decir, $a^{-n} = (a^n)^{-1}$. Pruebe:

$$1^a) \quad a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$2^a) \quad (a^m)^n = a^{mn} \text{ sean cuales fueren } m, n \in \mathbb{Z}.$$

3. Si $\frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2} = \dots = \frac{x_n}{y_n}$ en un cuerpo K , pruebe que, dados $a_1, \dots, a_n \in K$ tales que $a_1 y_1 + \dots + a_n y_n \neq 0$, se tiene

$$\frac{a_1 x_1 + \dots + a_n x_n}{a_1 y_1 + \dots + a_n y_n} = \frac{x_1}{y_1}$$

4. Sean K, L cuerpos. Una función $f : K \rightarrow L$ se llama un homomorfismo cuando se tiene $f(x + y) = f(x) + f(y)$ y $f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y)$, cualesquiera que sean $x, y \in K$.

i) Dado un homomorfismo $f : K \rightarrow L$, pruebe que $f(0) = 0$.

ii) Pruebe también que, o bien $f(x) = 0$ para todo $x \in K$, o bien $f(1) = 1$ y f es inyectivo.

5. Sea $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ un homomorfismo. Pruebe que, o bien $f(x) = 0$ para todo $x \in \mathbb{Q}$, o bien $f(x) = x$ para todo $x \in \mathbb{Q}$.

6. Verifique las asociatividades de la adición y de la multiplicación en $\mathbb{Z}_2$. (Nota. Hay dos modos de proceder. Uno requiere la verificación de 16 igualdades. Otro consiste en observar que, definiendo $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_2$ por $f(n) = 0$ si n es par, y $f(n) = 1$ si n es impar, f es sobreyectiva y, para $m, n \in \mathbb{Z}$ cualesquiera, valen $f(m + n) = f(m) + f(n)$, $f(m \cdot n) = f(m) \cdot f(n)$. Las asociatividades en $\mathbb{Z}$ implican las de $\mathbb{Z}_2$.)

7. Sea p un número natural primo. Para cada entero m , indiquemos con $\bar{m}$ el resto de la división de m por p . En el conjunto $\mathbb{Z}_p = \{0, 1, \dots, p - 1\}$ definamos dos operaciones: una adición $\oplus$ y una multiplicación $\odot$, poniendo $m \oplus n = \overline{m + n}$ y $m \odot n = \overline{m \cdot n}$. Pruebe que la función $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_p$, definida por $f(n) = \bar{n}$, cumple $f(m + n) = f(m) \oplus f(n)$ y $f(m \cdot n) = f(m) \odot f(n)$. Concluya que $\oplus$ y $\odot$ son conmutativas, asociativas, vale la distributividad, existen 0 y 1. Observe que dados $m, n \in \mathbb{Z}_p$, $m \odot n = 0 \Rightarrow m = 0$ o $n = 0$. Concluya que $\mathbb{Z}_p$ es un cuerpo.

8. Sea K un conjunto donde son válidos todos los axiomas de cuerpo, salvo la existencia de inverso multiplicativo.

i) Dado $a \neq 0$ en K , pruebe que la función $f : K \rightarrow K$, definida por $f(x) = ax$, es una biyección si, y solo si, a posee inverso.

- ii) Muestre que f es inyectiva si, y solo si, vale la ley de cancelación para a .
 - iii) Concluya que, si K es finito, la ley de cancelación es equivalente a la existencia de inverso para cada elemento no nulo de K .
9. Explique por qué las operaciones usuales no hacen cuerpos al conjunto $\mathbb{Z}$ de los enteros ni al conjunto $\mathbb{Q}[t]$ de los polinomios de coeficientes racionales.
10. En un cuerpo ordenado K , pruebe que $a^2 + b^2 = 0 \Leftrightarrow a = b = 0$.
11. Sea P el conjunto de los elementos positivos de un cuerpo ordenado K .
- i) Dado un número natural n , pruebe que la función $f : P \rightarrow P$, definida por $f(x) = x^n$, es monótona creciente (es decir, $x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$).
 - ii) Dé un ejemplo en que f no sea sobreyectiva.
 - iii) Pruebe que $f(P)$ no es un subconjunto acotado superiormente de K .
12. Sean X un conjunto cualquiera y K un cuerpo. Indiquemos con $\mathcal{F}(X; K)$ el conjunto de todas las funciones $f : X \rightarrow K$. Definamos en $\mathcal{F}(X; K)$ las operaciones de adición y de multiplicación de modo natural: dadas $f, g : X \rightarrow K$, las funciones $f + g : X \rightarrow K$ y $f \cdot g : X \rightarrow K$ están dadas por $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ y $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$. Verifique cuáles de los axiomas de cuerpo son válidos y cuáles no son válidos en el conjunto $\mathcal{F}(X; K)$, respecto a estas operaciones.
13. Sean x, y elementos positivos de un cuerpo ordenado K . Se tiene $x < y \Leftrightarrow x^{-1} > y^{-1}$. Pruebe también que $x > 0 \Leftrightarrow x^{-1} > 0$.
14. Sea a un elemento positivo de un cuerpo ordenado K . Definamos $f : \mathbb{Z} \rightarrow K$ poniendo $f(n) = a^n$. (Véase el Ejercicio 2.) Pruebe que f es creciente si $a > 1$, decreciente si $a < 1$ y constante si $a = 1$.
15. Dados $x \neq 0$ en un cuerpo ordenado K y $n \in \mathbb{N}$ cualquiera, pruebe que

$$(1+x)^{2n} > 1 + 2n \cdot x.$$

16. Si $n \in \mathbb{N}$ y $x < 1$ en un cuerpo ordenado K , pruebe que $(1-x)^n \geq 1-nx$.

17. En un cuerpo ordenado, si a y $a+x$ son positivos, pruebe que $(a+x)^n \geq a^n + n \cdot a^{n-1} \cdot x$. Enuncie y demuestre desigualdades análogas a las de los Ejercicios 15 y 16, con a en lugar de 1.

18. Sean a, b, c, d elementos de un cuerpo ordenado K , donde b y d son positivos. Pruebe que $\frac{a+c}{b+d}$ está comprendido entre el menor y el mayor de los elementos $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$. Generalice: muestre que $\frac{a_1+\dots+a_n}{b_1+\dots+b_n}$ está comprendido entre el menor y el mayor de los elementos $\frac{a_1}{b_1}, \dots, \frac{a_n}{b_n}$, siempre que $b_1, \dots, b_n$ sean todos positivos.

19. Dados x, y en un cuerpo ordenado K , con $y \neq 0$, pruebe que $|x \cdot y^{-1}| = |x| \cdot |y|^{-1}$, es decir $\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}$.

20. Pruebe por inducción que, dados $x_1, \dots, x_n$ en un cuerpo ordenado K , se tiene $|x_1 + \dots + x_n| \leq |x_1| + \dots + |x_n|$ y $|x_1 \cdot x_2 \cdots x_n| = |x_1| \cdot |x_2| \cdots |x_n|$.

21. Sea K un cuerpo ordenado. Expresé cada uno de los conjuntos siguientes como unión de intervalos:

a) el conjunto de los $x \in K$ tales que $|x-3| + |x+3| < 8$;

b) ídem $|x^2 - 2| \leq 1$;

c) $|2x+1| \leq 1$;

d) $|x-5| < |x+1|$;

e) $(2x+3)(x-2) \geq 0$.

22. Pruebe que, para todo x en un cuerpo ordenado K , se tiene

$$|x-1| + |x-2| \geq 1$$

$$|x - 1| + |x - 2| + |x - 3| \geq 2$$

23. Dados a, b, ε en un cuerpo ordenado K , pruebe que

$$|a - b| < \varepsilon \Rightarrow |b| - \varepsilon < |a| < |b| + \varepsilon$$

. Concluya que $|a - b| < \varepsilon \Rightarrow a < |b| + \varepsilon$.

24. Pruebe que, en un cuerpo ordenado K , las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (i) K es arquimediano;
- (ii) $\mathbb{Z}$ es ilimitado superior e inferiormente;
- (iii) $\mathbb{Q}$ es ilimitado superior e inferiormente.

25. Pruebe que un cuerpo ordenado K es arquimediano si, y solo si, para todo $\varepsilon > 0$ en K , existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{2^n} < \varepsilon$.

26. Sea $a > 1$ en un cuerpo arquimediano K . Considere la función $f : \mathbb{Z} \rightarrow K$, definida por $f(n) = a^n$. Pruebe las siguientes afirmaciones:

- (i) $f(\mathbb{Z})$ no es acotado superiormente;
- (ii) $\inf f(\mathbb{Z}) = 0$.

27. Sean a racional diferente de cero, y x irracional. Pruebe que ax y $a + x$ son irracionales. Dé ejemplo de dos números irracionales x, y tales que $x + y$ y $x \cdot y$ sean racionales.

28. Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$ números racionales. Pruebe que

$$a + b\sqrt{2} = c + d\sqrt{2} \Leftrightarrow a = c \text{ y } b = d.$$

29. Pruebe que el conjunto $\mathbb{K}$ de los números reales de la forma

$$a + b\sqrt{2},$$

con $a, b \in \mathbb{Q}$ racionales, es un cuerpo respecto a las operaciones de adición y multiplicación de números reales. Examine si lo mismo ocurre con los números de la forma $a + b\sqrt[3]{2}$, con $a, b \in \mathbb{Q}$.

30. Sean a, b números racionales positivos. Pruebe que

$$\sqrt{a} + \sqrt{b}$$

es racional si, y solo si,

$$\sqrt{a} \text{ y } \sqrt{b}$$

son ambos racionales. (Sugerencia: multiplique por $\sqrt{a} - \sqrt{b}$.)

31. Sea $\mathbb{X} \subset \mathbb{R}$ no vacío, acotado superiormente, y c un número real. Se tiene $c \leq \sup \mathbb{X}$ si, y solo si, para cada $\varepsilon > 0$ real dado se puede hallar $x \in \mathbb{X}$ tal que $c - \varepsilon < x$. Enuncie y demuestre un resultado análogo con ínfimo en lugar de supremo.

32. Sea $\mathbb{X} = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$. Pruebe que $\inf \mathbb{X} = 0$.

33. Sean $A \subset B$ conjuntos no vacíos acotados de números reales. Pruebe que $\inf B \leq \inf A \leq \sup A \leq \sup B$.

34. Sean A, B conjuntos no vacíos de números reales, tales que $x \in A, y \in B \Rightarrow x \leq y$. Pruebe que $\sup A \leq \inf B$. Pruebe que $\sup A = \inf B$ si, y solo si, para todo $\varepsilon > 0$ dado, se pueden obtener $x \in A$ e $y \in B$ tales que $y - x < \varepsilon$.

35. Dado $A \subset \mathbb{R}$ no vacío, acotado inferiormente, sea $-A = \{-x; x \in A\}$. Pruebe que $-A$ es acotado superiormente y que $\sup(-A) = -\inf A$.

36. Sea $A \subset \mathbb{R}$ no vacío, acotado. Dado $c > 0$, sea $c \cdot A = \{c \cdot x; x \in A\}$. Pruebe que $c \cdot A$ es acotado y que $\sup(c \cdot A) = c \cdot \sup A$, $\inf(c \cdot A) = c \cdot \inf A$. Enuncie y demuestre lo que ocurre cuando $c < 0$.

37. Dados $A, B \subset \mathbb{R}$ no vacíos y acotados, sea $A + B = \{x + y; x \in A, y \in B\}$. Pruebe:

- i) $A + B$ es acotado;
- ii) $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$;
- iii) $\inf(A + B) = \inf A + \inf B$;
- iv) Enuncie y demuestre resultados análogos suponiendo solo A y B acotados superiormente (o A y B acotados inferiormente).

38. Sea $X \subset \mathbb{R}$. Una función $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ se llama acotada cuando su imagen $f(X) \subset \mathbb{R}$ es un conjunto acotado. En este caso se define el $\sup f$ como el supremo del conjunto $f(X)$. (A veces se escribe $\sup_{x \in X} f(x)$ o $\sup f$.)

- i) Pruebe que la suma de dos funciones acotadas $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ es una función acotada $f + g : X \rightarrow \mathbb{R}$.
- ii) Muestre que $(f + g)(X) \subset f(X) + g(X)$, en la notación del Ejercicio 37.
- iii) Concluya que $\sup(f + g) \leq \sup f + \sup g$ y que $\inf(f + g) \geq \inf f + \inf g$.
- iv) Considerando las funciones $f, g : [-1, +1] \rightarrow \mathbb{R}$, definidas por $f(x) = x$ y $g(x) = -x$, muestre que se puede tener $\sup(f + g) < \sup f + \sup g$ y $\inf(f + g) > \inf f + \inf g$.

39. Sean A, B conjuntos de números reales positivos. Definamos $A \cdot B = \{x \cdot y; x \in A \text{ y } y \in B\}$. Pruebe que si A y B son acotados entonces $A \cdot B$ es acotado, siendo $\sup(A \cdot B) = \sup A \cdot \sup B$ y $\inf(A \cdot B) = \inf A \cdot \inf B$.

40.

- i) Pruebe que el producto de dos funciones acotadas $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ es una función acotada $f \cdot g : X \rightarrow \mathbb{R}$.
- ii) Muestre que $(f \cdot g)(X) \subset f(X) \cdot g(X)$.
- iii) Concluya que, si f y g son ambas positivas, se tiene $\sup(f \cdot g) \leq \sup f \cdot \sup g$ y $\inf(f \cdot g) \geq \inf f \cdot \inf g$.
- iv) Dé un ejemplo en que valgan las desigualdades estrictas.
- v) Muestre, sin embargo, que para toda f positiva se tiene $\sup(f^2) = [\sup f]^2$.

41. Analice los Ejercicios 39 y 40 sin las hipótesis de positividad en ellos hechas.

42. Sea $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ un polinomio con coeficientes enteros.

- i) Si un número racional p/q (con p y q primos entre sí) es tal que $f(p/q) = 0$, pruebe que p divide a a_0 y q divide a a_n .
- ii) Concluya que, cuando $a_n = 1$, las raíces reales de f son enteras o irracionales. En particular, examinando $x^n - a = 0$, concluya que, si un número entero $a > 0$ no posee raíz n -ésima entera, entonces $\sqrt[n]{a}$ es irracional.
- iii) Use el resultado general para probar que $\sqrt{2} + \sqrt[3]{2}$ es irracional.

43. Dado un número natural $p > 1$, pruebe que los números racionales de la forma m/p^n , donde $m \in \mathbb{Z}$ y $n \in \mathbb{N}$, constituyen un subconjunto denso en $\mathbb{R}$.

44. Un número real r se llama algebraico cuando existe un polinomio $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$, no idénticamente nulo, con coeficientes enteros, tal que $f(r) = 0$.

- i) Pruebe que el conjunto de los polinomios de coeficientes enteros es enumerable.
- ii) Dada una enumeración $\{f_1, f_2, \dots, f_n, \dots\}$ de esos polinomios no idénticamente nulos, sea, para cada $n \in \mathbb{N}$, A_n el conjunto de las raíces reales de f_n . Cada A_n es un conjunto finito (pudiendo ser vacío). El conjunto A de los números algebraicos reales se escribe $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$. Concluya que A es enumerable. Muestre que A es denso en $\mathbb{R}$.
45. Sea X el complemento de un conjunto enumerable de números reales. Muestre que, para cada intervalo abierto (a, b) , la intersección $(a, b) \cap X$ es no enumerable. En particular, X es denso.
46. Un número real se llama trascendente cuando no es algebraico. Pruebe que el conjunto de los números trascendentes es no enumerable y denso en $\mathbb{R}$.
47. Pruebe que el conjunto de los números algebraicos es un cuerpo. (Este ejercicio requiere conocimientos de Álgebra muy por encima de lo que estamos admitiendo hasta aquí.)
48. Dé ejemplo de una sucesión decreciente de intervalos cerrados (no acotados) cuya intersección sea vacía y de una sucesión decreciente de intervalos (abiertos) acotados cuya intersección sea vacía.
49. Sean $B \subset A$ conjuntos no vacíos de números reales. Suponga que A es acotado superiormente y que, para cada $x \in A$, existe un $y \in B$ tal que $x \leq y$. Pruebe que, en estas condiciones, se tiene $\sup B = \sup A$. Enuncie y demuestre un resultado análogo para ínfimo.
50. Una corte de Dedekind es un par ordenado (A, B) donde A y B son subconjuntos no vacíos de números racionales, tales que A no posee elemento máximo, $A \cup B = \mathbb{Q}$ y, dados $x \in A$ e $y \in B$ cualesquiera, se tiene $x < y$.

- a) Pruebe que, en una corte de Dedekind (A, B) , vale $\sup A = \inf B$.
- b) Sea D el conjunto de las cortes de Dedekind. Pruebe que existe una biyección $f : D \rightarrow \mathbb{R}$.

51. Sean X, Y conjuntos no vacíos y $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada. Para cada $x_0 \in X$ y cada $y_0 \in Y$, pongamos $s_1(x_0) = \sup\{f(x_0, y); y \in Y\}$ y $s_2(y_0) = \sup\{f(x, y_0); x \in X\}$. Esto define funciones $s_1 : X \rightarrow \mathbb{R}$ y $s_2 : Y \rightarrow \mathbb{R}$. Pruebe que se tiene $\sup_{x \in X} s_1(x) = \sup_{y \in Y} s_2(y)$. En otras palabras

$$\sup_{x \in X} \sup_{y \in Y} f(x, y) = \sup_{y \in Y} \sup_{x \in X} f(x, y).$$

52. Enuncie y demuestre un resultado análogo al anterior con ínfimo en lugar de supremo. Considere, a continuación, el caso “mixto” y pruebe que

$$\sup_{x \in X} \inf_{y \in Y} f(x, y) \leq \inf_{y \in Y} \sup_{x \in X} f(x, y).$$

Dé un ejemplo donde se tenga $<$ en la desigualdad anterior.

53. Sean x, y números reales positivos. Pruebe que se tiene

$$\sqrt{xy} \leq \frac{x + y}{2}.$$

54. La desigualdad entre la media aritmética y la media geométrica, vista en el ejercicio anterior, vale para n números reales positivos $x_1, \dots, x_n$. Sean $G = \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}$ y $A = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$. Se tiene $G \leq A$. Esto es evidente cuando $x_1 = \dots = x_n$. Para probar la desigualdad en el caso general, considere la operación que consiste en sustituir el menor de los números dados, digamos x_i , y el mayor de ellos, digamos x_j , respectivamente por $x'_i = \frac{x_i x_j}{G}$ y $x'_j = G$. Esto no altera la media geométrica y, en cuanto a la aritmética, ella no aumenta, pues, como es fácil de ver, $x'_i + x'_j \leq x_i + x_j$. Pruebe que, repetida

esta operación como máximo n veces, obtenemos n números todos iguales a G y, por tanto, su media aritmética es G . Como en cada operación la media aritmética no aumentó, concluya que $G \leq A$, es decir,

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \leq \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}.$$

55. Sea K un cuerpo ordenado completo. Indiquemos con $0'$ y $1'$ el cero y la unidad de K . Para cada $n \in \mathbb{N}$, sean $n' = n \cdot 1' = 1' + \dots + 1'$ (n veces) y $(-n)' = -n'$. Definamos una función $f : \mathbb{R} \rightarrow K$ poniendo $f(p/q) = p'/q'$ para todo $p/q \in \mathbb{Q}$ y, para x irracional, sea $f(x) = \sup\{p'/q' \mid p/q < x\}$. Pruebe que f es un homomorfismo sobreyectivo y concluya que f es una biyección, es decir, un isomorfismo de $\mathbb{R}$ sobre K .

56. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un isomorfismo de $\mathbb{R}$ en sí mismo. Pruebe que f es la identidad. Concluya que si K y L son cuerpos ordenados completos, existe un único isomorfismo de K sobre L .

57. Verifique que $f : \mathbb{R} \rightarrow (-1, 1)$, definida por $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, es una biyección de $\mathbb{R}$ sobre el intervalo $(-1, 1)$.

58. Un conjunto G de números reales se llama un grupo aditivo cuando $0 \in G$ y $x, y \in G \Rightarrow x - y \in G$. Entonces, $x \in G \Rightarrow -x \in G$ y $x, y \in G \Rightarrow x + y \in G$. Sea entonces $G \subset \mathbb{R}$ un grupo aditivo de números reales. Indiquemos con G^+ el conjunto de los números reales positivos pertenecientes a G . Exceptuando el caso trivial $G = \{0\}$, G^+ es no vacío. Supongamos pues $G \neq \{0\}$. Pruebe que:

- i) Si $\inf G^+ = 0$, entonces G es denso en $\mathbb{R}$;
- ii) Si $\inf G^+ = a > 0$, entonces $a \in G^+$ y $G = \{0, \pm a, \pm 2a, \dots\}$. [Sugerencia: para probar (ii) note primero que si fuera $a \notin G^+$ existirían $g, h \in G^+$ con $a < h < g < a + 2$, de donde $a/2 > g - h \in G^+$, una contradicción. A continuación, observe que todo $g \in G$ se escribe de la

forma $g = a \cdot q + r$, con $q \in \mathbb{Z}$, siendo $0 \leq r < a$. Vea que $r = g - a \cdot q \in G$, pues q es entero.]

iii) Concluya que, si $\alpha \in \mathbb{R}$ es irracional, los números reales de la forma $m + n\alpha$, con $m, n \in \mathbb{Z}$, constituyen un subconjunto denso en $\mathbb{R}$.

59. Sean $f, g : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $\varphi, \psi : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ las funciones definidas por $f(x, y) = 3x - y$, $g(x, y) = (x - 1)^2 + (y + 1)^2 - 9$, $\varphi(x, y, z) = 3z$, $\psi(x, y, z) = x^2 + y^2 - z$. Interpretando (x, y) como las coordenadas cartesianas de un punto del plano $\mathbb{R}^2$ y (x, y, z) como coordenadas de un punto del espacio $\mathbb{R}^3$, describa geoméricamente los conjuntos $f^{-1}(0)$, $g^{-1}(0)$, $\varphi^{-1}(0)$ y $\psi^{-1}(0)$.

60. Sea α un número real positivo. Dado un número racional p/q (donde $p \in \mathbb{Z}$ y $q \in \mathbb{N}$), defina la potencia de base α y exponente racional p/q como $\alpha^{p/q} = \sqrt[q]{\alpha^p}$. Pruebe:

- 1°) Para cualesquiera $r, s \in \mathbb{Q}$ se tiene $\alpha^r \cdot \alpha^s = \alpha^{r+s}$ y $(\alpha^r)^s = \alpha^{r \cdot s}$;
- 2°) Para todo $r \in \mathbb{Q}^+$, la función $f : (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$, dada por $f(x) = x^r$, es una biyección creciente;
- 3°) La función $g : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $g(r) = \alpha^r$, (donde α es un número real positivo fijado) es creciente si $\alpha > 1$, y decreciente si $0 < \alpha < 1$.

Capítulo 4

Secuencias y Series de Números Reales

Estudiaremos, en este capítulo, los límites de secuencias de números reales y, en particular, trataremos las series (o "sumas infinitas").

Todos los conceptos y resultados importantes del Análisis Matemático se refieren, ya sea explícita o indirectamente, a límites. De ahí el papel central que desempeña esta noción.

Los límites de secuencias de números reales son los más simples; por eso comenzaremos con ellos. Otros tipos más sofisticados de límites, como derivadas, integrales, secuencias de funciones, etc., serán estudiados en capítulos posteriores.

Desde el punto de vista intuitivo, sugerimos al lector pensar en una secuencia $(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$ de números reales como una sucesión de puntos en la recta y en su límite, que definiremos a continuación, como un punto al cual los puntos x_n se acercan y permanecen arbitrariamente próximos, siempre que se tome el índice n suficientemente grande. Un resultado crucial para justificar

esta imagen geométrica es proporcionado por el Teorema 1 del Capítulo III, que recordamos ahora.

Dados los números reales a , x , ε , con $\varepsilon > 0$, las tres afirmaciones siguientes son equivalentes:

$$|x - a| < \varepsilon,$$

$$a - \varepsilon < x < a + \varepsilon,$$

x pertenece al intervalo $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$.

Así, el intervalo abierto $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$, al que llamaremos intervalo abierto de centro a y radio ε , está formado por los puntos cuya distancia al punto a (centro del intervalo) es menor que ε .

Análogamente, los puntos x del intervalo cerrado $[a - \varepsilon, a + \varepsilon]$ se caracterizan por la propiedad de estar situados a una distancia menor o igual a ε del centro a (es decir, $|x - a| \leq \varepsilon$).

Otro resultado simple, pero indispensable para el estudio de los límites de sucesiones, es el Teorema 3 del Capítulo II, según el cual un subconjunto $X \subset \mathbb{N}$ es infinito si, y solo si, es ilimitado.

Cuando $X \subset \mathbb{N}$ es un conjunto infinito, suele decirse que X contiene números naturales “arbitrariamente grandes”. Esto quiere decir que, dado cualquier $n_1 \in \mathbb{N}$, existe $n \in X$ tal que $n > n_1$. En particular, si existe un número $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que X contiene todos los números naturales $n > n_0$, entonces X es infinito (aunque no todos los subconjuntos infinitos $X \subset \mathbb{N}$ gozan de esta propiedad). En este caso, suele decirse que “ X contiene todos los números naturales suficientemente grandes”. Una afirmación equivalente: $\mathbb{N} - X$ es finito.

4.1. Secuencias

De acuerdo con la definición general (Capítulo I, §5), una secuencia de números reales es una función $x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, definida en el conjunto $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ de los números naturales y tomando valores en el conjunto $\mathbb{R}$ de los números reales. El valor $x(n)$, para todo $n \in \mathbb{N}$, será representado por x_n y llamado el término de orden n , o n -ésimo término de la secuencia.

Escribiremos $(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$, o $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, o simplemente (x_n) , para indicar la sucesión x .

No se debe confundir la sucesión x con el conjunto $\mathcal{X}(\mathbb{N})$ de sus términos. Para este conjunto, usaremos la notación $\mathcal{X}(\mathbb{N}) = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$. La función $x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ no es necesariamente inyectiva: puede tenerse $x_m = x_n$ con $m \neq n$. En particular (a pesar de la notación) el conjunto $\{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$ puede ser finito, o incluso reducirse a un único elemento, como es el caso de una sucesión constante, en la que $x_n = a \in \mathbb{R}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Cuando la sucesión (x_n) sea inyectiva, es decir, cuando $m \neq n$ implique $x_m \neq x_n$, diremos que es una sucesión de términos dos a dos distintos.

Se dice que la sucesión (x_n) es acotada cuando el conjunto de sus términos es acotado, esto es, cuando existen números reales a, b tales que $a \leq x_n \leq b$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Esto quiere decir que todos los términos de la sucesión pertenecen al intervalo $[a, b]$.

Todo intervalo $[a, b]$ está contenido en un intervalo de la forma $[-c, c]$, con $c > 0$ (intervalo simétrico). Para verlo, basta tomar $c = \max(|a|, |b|)$. Como la condición $x_n \in [-c, c]$ es equivalente a $|x_n| \leq c$, vemos que una sucesión (x_n) es acotada si, y solo si, existe un número real $c > 0$ tal que $|x_n| \leq c$ para todo $n \in \mathbb{N}$. De ello resulta que (x_n) es acotada si, y solo si, $(|x_n|)$ es acotada.

Cuando una sucesión (x_n) no es acotada, se dice que es no acotada (o ilimi-

tada).

Una sucesión (x_n) se dice acotada superiormente cuando existe un número real b tal que $x_n \leq b$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Esto significa que todos los términos x_n pertenecen a la semirrecta $(-\infty, b]$. Análogamente, se dice que (x_n) es acotada inferiormente cuando existe $a \in \mathbb{R}$ tal que $a \leq x_n$ (es decir, $x_n \in [a, +\infty)$) para todo $n \in \mathbb{N}$.

Evidentemente, una sucesión es acotada si, y solo si, es acotada superior e inferiormente.

Dada una sucesión $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de números reales, una subsucesión de x es la restricción de la función x a un subconjunto infinito $\mathbb{N}' = \{n_1 < n_2 < \dots < n_i < \dots\}$ de $\mathbb{N}$. Se escribe $x' = (x_{n_i})_{n \in \mathbb{N}'}$, o $(x_{n_1}, x_{n_2}, \dots, x_{n_i}, \dots)$ o $(x_{n_i})_{i \in \mathbb{N}}$ para indicar la subsucesión $x' = x|_{\mathbb{N}'}$.

: Estrictamente hablando, una subsucesión x' no es una sucesión pues su dominio $\mathbb{N}'$ no es necesariamente igual a $\mathbb{N}$. Pero es trivial considerar x' como función definida en $\mathbb{N}$, a saber, la función $1 \mapsto x_{n_1}, 2 \mapsto x_{n_2}, \dots, i \mapsto x_{n_i}, \dots$. Esto es lo que se hace al usar la notación $x' = (x_{n_i})_{i \in \mathbb{N}}$.

Recordemos que un subconjunto $\mathbb{N}' \subset \mathbb{N}$ es infinito si, y solo si, es ilimitado, es decir, para todo $n_0 \in \mathbb{N}$ existe $n_i \in \mathbb{N}'$ con $n_i > n_0$.

Toda subsucesión de una sucesión acotada es acotada (respectivamente acotada superiormente o inferiormente).

Una sucesión (x_n) se llama creciente cuando $x_1 < x_2 < x_3 < \dots$, esto es, cuando $x_n < x_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Si se cumple $x_n \leq x_{n+1}$ para todo n , la sucesión se dice no decreciente.

Análogamente, cuando $x_1 > x_2 > x_3 > \dots$, o sea, cuando $x_n > x_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, la sucesión (x_n) se dice decreciente. Se llama no creciente cuando $x_n \geq x_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Las sucesiones crecientes, no decrecientes, decrecientes y no crecientes se llaman sucesiones monótonas.

Una sucesión no decreciente es siempre acotada inferiormente por su primer término, por ejemplo. Del mismo modo, una sucesión no creciente es siempre acotada superiormente.

Para que una sucesión monótona sea acotada es (necesario y) suficiente que posea una subsucesión acotada. En efecto, sea, por ejemplo, $x_{n_1} \leq x_{n_2} \leq \dots \leq x_{n_k} \leq \dots \leq b$ una subsucesión acotada de la sucesión no decreciente (x_n) . Entonces, para cualquier $n \in \mathbb{N}$, existe un $n_k > n$ y, por tanto, $x_n \leq x_{n_k} \leq b$. Luego $x_n \leq b$ para todo n . La sucesión (x_n) es, consecuentemente, acotada.

Ejemplo 1. $x_n = 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$; esto define la sucesión constante $(1, 1, \dots, 1, \dots)$; es evidentemente acotada, pues $x(\mathbb{N}) = \{1\}$, no decreciente y también no creciente.

Ejemplo 2. $x_n = n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. En este caso, $x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ es la aplicación inclusión. Se obtiene la sucesión $(1, 2, 3, \dots, n, \dots)$ que es acotada inferiormente, no acotada superiormente, monótona creciente.

Ejemplo 3. $x_n = 0$ para n par y $x_n = 1$ para n impar. La sucesión así definida es $(1, 0, 1, 0, \dots)$. Su conjunto de valores es $x(\mathbb{N}) = \{0, 1\}$. Es acotada y no es monótona. La misma sucesión podría también definirse mediante la fórmula

$$x_n = \frac{1}{2}[1 + (-1)^{n+1}]$$

o bien por $x_n = \sin^2\left(\frac{n\pi}{2}\right)$.

Ejemplo 4. $x_n = 1/n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Tenemos la sucesión $(1, 1/2, 1/3, \dots, 1/n, \dots)$, monótona decreciente, acotada.

Ejemplo 5. Sea $x_n = [1 + (-1)^{n+1}]n/2$. Entonces $x_n = n$ para n impar

y $x_n = 0$ para n par. La sucesión (x_n) tiene la forma $(1, 0, 3, 0, 5, 0, \dots)$. Es acotada inferiormente, no acotada superiormente, no monótona. Sus términos de orden impar constituyen una subsucesión monótona creciente no acotada, $x_{2n-1} = 2n - 1$, mientras que los términos de orden par constituyen una subsucesión constante, $x_{2n} = 0$.

Ejemplo 6. Sea $\alpha \in \mathbb{R}$. Consideremos la sucesión $(\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \dots, \alpha^n, \dots)$ de las potencias de α , con exponente n entero positivo. Si $\alpha = 0$ o $\alpha = 1$, se tiene evidentemente una sucesión constante. Si $0 < \alpha < 1$, la sucesión es decreciente, acotada. En efecto, multiplicando ambos miembros de la desigualdad $\alpha < 1$ por el número positivo α^n obtenemos $\alpha^{n+1} < \alpha^n$, luego la sucesión es decreciente. Como todos sus términos son positivos, tenemos $0 < \alpha^n < 1$ para todo n . Consideremos ahora el caso $-1 < \alpha < 0$. Entonces la sucesión (α^n) ya no es monótona (sus términos son alternadamente positivos y negativos) pero sigue siendo acotada pues $|\alpha^n| = |\alpha|^n$, con $0 < |\alpha| < 1$. El caso $\alpha = -1$ es trivial: la sucesión (α^n) es $(-1, +1, -1, +1, \dots)$. Cuando $\alpha > 1$ se obtiene una sucesión creciente: basta multiplicar ambos miembros de esta desigualdad por el número positivo a^n para obtener $a^{n+1} > a^n$. Pero ahora tenemos $a = 1 + h$ con $h > 0$. Luego, por la desigualdad de Bernoulli, $a^n > 1 + nh$. Así, dado cualquier número real b , podemos hallar n tal que $a^n > b$: basta tomar $n > \frac{b-1}{h}$, pues esto proporcionará sucesivamente $nh > b - 1$, $1 + nh > b$, $a^n > b$. Así, cuando $a > 1$, (a_n) es una sucesión creciente no acotada. Finalmente, cuando $a < -1$, la sucesión (a^n) no es monótona (pues sus términos son alternadamente positivos y negativos) y es no acotada superior e inferiormente. En efecto, sus términos de orden par, $a^{2n} = (a^2)^n$, constituyen una subsucesión creciente, no acotada superiormente, de números positivos, a saber, la sucesión de las potencias del número $a^2 > 1$. Mientras tanto, sus términos de orden impar constituyen una subsucesión decreciente, no acotada inferiormente, a saber, la sucesión $a^{2n+1} = a(a^{2n})$.

Ejemplo 7. Dado $a \in \mathbb{R}$, con $0 < a < 1$, sea $x_n = 1 + a + \dots + a^n = \frac{1-a^{n+1}}{1-a}$,

para todo $n \in \mathbb{N}$. La sucesión $(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$ es creciente, pues $x_{n+1} = x_n + a^{n+1}$. Además, es acotada pues $0 < x_n < \frac{1}{1-a}$ para todo n . En particular, tomando $a = 1/2$, obtenemos $1 + 1/2 + \dots + 1/2^n = 2 - \frac{1}{2^n} < 2$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Ejemplo 8. Una sucesión importante en Análisis es la que tiene como n -ésimo término $a_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}$. Es evidentemente creciente. Además, es acotada, pues

$$a_n < 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2 \cdot 2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} < 3,$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

Ejemplo 9. Estrechamente relacionada con el ejemplo anterior es la sucesión cuyo n -ésimo término es $b_n = (1 + 1/n)^n$. La fórmula del binomio de Newton nos da

$$b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 1 + n \cdot \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2!} \frac{1}{n^2} + \dots + \frac{n(n-1) \dots 2 \cdot 1}{n!} \frac{1}{n^n},$$

es decir

$$b_n = 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \dots + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right).$$

Vemos además que cada b_n es una suma de términos positivos. Cada uno de esos términos crece con n . Además, el número de términos también crece con n . Luego la sucesión (b_n) es creciente. Observamos también, por la última igualdad, que $b_n < a_n$ para todo n . Luego (b_n) es una sucesión acotada, con $b_n < 3$ para $n \in \mathbb{N}$ arbitrario.

Ejemplo 10. Tomemos $x_1 = 0$, $x_2 = 1$ y, para cada $n = 1, 2, 3, \dots$, pongamos $x_{n+2} = \frac{1}{2}(x_n + x_{n+1})$. La sucesión que se obtiene es $(0, 1, 1/2, 3/4, 5/8, 11/16, 21/32, \dots)$.

Sus términos se definen por inducción: cada uno de ellos, a partir del tercero, es la media aritmética de los dos términos anteriores. Ahora bien, dados los números a, b , digamos con $a < b$, su media aritmética $\frac{a+b}{2}$ es el punto medio del segmento de recta $[a, b]$. Luego se obtiene $\frac{a+b}{2}$ sumando al número a la mitad de la distancia de a a b , es decir $\frac{1}{2}(b-a)$, o bien restando de b la misma cantidad. Se sigue que los términos de esta sucesión son $x_1 = 0$, $x_2 = 1$, $x_3 = 1 - \frac{1}{2}$, $x_4 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$, $x_5 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8}$, $x_6 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16}$, etc. Separando los términos de orden par de los de orden impar, obtenemos

$$\begin{aligned}x_1 &= 0, \\x_3 &= 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}, \\x_5 &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{8}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{8}, \\x_7 &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{8}\right) + \left(\frac{1}{16} - \frac{1}{32}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{32}, \\&\dots \\x_{2n+1} &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2 \cdot 4} + \frac{1}{2 \cdot 4^2} + \dots + \frac{1}{2 \cdot 4^{n-1}} \\&= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{4^{n-1}}\right),\end{aligned}$$

mientras que un cálculo análogo nos dará

$$x_{2n} = 1 - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{4^{n-1}}\right).$$

Así, vemos que la sucesión (x_n) es acotada, con $0 \leq x_n \leq 1$. Sus términos de orden par constituyen una subsucesión decreciente y los de orden impar una subsucesión creciente.

Ejemplo 11. Sea $x_n = \sqrt[n]{n}$. Se trata de una sucesión de números positi-

vos, por tanto acotada inferiormente. Veamos si es monótona: para que sea $\sqrt[n]{n} > \sqrt[n+1]{n+1}$ es necesario y suficiente que $n^{n+1} > (n+1)^n$, es decir, que $n > \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$. Esto ocurre de hecho para todo $n \geq 3$, pues sabemos que $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 3$, sea cual sea n . Así concluimos que la sucesión dada por $\sqrt[n]{n}$ es decreciente a partir de su tercer término. Nótese que $1 < \sqrt{2} < \sqrt[3]{3}$, luego crece en sus tres primeros pasos, solo entonces comenzando a decrecer. Así $(\sqrt[n]{n})$ es acotada.

4.2. Límite de una sucesión

Intuitivamente, decir que el número real a es límite de la sucesión (x_n) significa afirmar que, para valores muy grandes de n , los términos x_n se vuelven y se mantienen tan próximos a a como se desee. Con un poco más de precisión: estipulando un "error" mediante un número real $\varepsilon > 0$, existe un índice n_0 tal que todos los términos x_n de la sucesión cuyo índice n es mayor que n_0 son valores aproximados de a con error inferior a ε . El índice n_0 , evidentemente, debe depender de ε , siendo de esperar que, para valores cada vez menores de ε , sea necesario tomar n_0 cada vez mayor.

Esto nos lleva a la siguiente definición.

Se dice que el número real a es límite de la sucesión (x_n) de números reales, y se escribe $a = \lim x_n$, o $a = \lim_n x_n$, o $a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, cuando para cada número real $\varepsilon > 0$, dado arbitrariamente, sea posible obtener un entero $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|x_n - a| < \varepsilon$, siempre que $n > n_0$.

En lenguaje simbólico:

$$\boxed{\lim x_n = a \quad \equiv \quad \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} ; n > n_0 \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon}$$

El símbolo $\equiv$ significa que lo que viene después es definición de lo que viene antes:

$\forall$ significa "para todo", o "cualquiera que sea";

$\exists$ significa "existe";

$;$ significa "tal que";

$\Rightarrow$ significa "implica".

Así, el mensaje arriba estenografiado tiene la siguiente traducción:

" $\lim x_n = a$ quiere decir (por definición) que, para todo número real $\varepsilon > 0$, existe un número natural n_0 tal que $n > n_0$ implica $|x_n - a| < \varepsilon$ ".


El matemático inglés G. H. Hardy, un aficionado a las competiciones deportivas, solía decir que, para entender bien la idea de límite, hay que pensar en dos competidores. Uno de ellos, digamos, el bueno, quiere probar que $\lim x_n = a$, mientras que el otro, digamos, el malo, intenta impedirsele. El malo proporciona los épsilons (ε) mientras que el bueno se ocupa de conseguir, para cada $\varepsilon > 0$ propuesto como desafío, el n_0 correspondiente (esto es, n_0 tal que $n > n_0$ implique $|x_n - a| < \varepsilon$).

El bueno ganará el juego (y quedará por tanto establecido que $\lim x_n = a$) si, para cualquier $\varepsilon > 0$ exhibido por su adversario, él es capaz de obtener un n_0 conveniente (es decir, tal que $n > n_0 \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon$). Por otro lado, para que el malo gane la partida, basta con que consiga hallar un número real $\varepsilon > 0$ para el cual ningún n_0 que el bueno pueda intentar sirva. (O sea, ese ε debe ser tal que para todo n_0 exista $n > n_0$ con $|x_n - a| \geq \varepsilon$.)

Volviendo a hablar en serio, observamos que si $\lim x_n = a$ entonces cualquier intervalo $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$, de centro a y radio $\varepsilon > 0$, contiene todos los términos x_n de la sucesión, con excepción de a lo sumo un número finito de índices n . En efecto, dado el intervalo $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$, como $\lim x_n = a$, obtenemos $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0 \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon$. O sea, $n > n_0 \Rightarrow x_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$. Así, fuera del intervalo $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ solo podrán estar, a lo sumo, los términos $x_1, x_2, \dots, x_{n_0}$.

Recíprocamente: si cualquier intervalo de centro a contiene todos los x_n , salvo tal vez para un número finito de índices n , entonces $\lim x_n = a$. En efecto, dado cualquier $\varepsilon > 0$, el intervalo $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ contendrá todos los x_n excepto para un número finito de índices n . Sea n_0 el mayor índice n tal que $x_n \notin (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$. Entonces $n > n_0 \Rightarrow x_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$, es decir $|x_n - a| < \varepsilon$. Esto prueba que $\lim x_n = a$.

Cuando $\lim x_n = a$, se dice que la sucesión (x_n) converge hacia a , o tiende hacia a y se escribe $x_n \rightarrow a$. Una sucesión que posee límite se llama convergente. En caso contrario, se llama divergente. Explícitamente, una sucesión (x_n) se dice divergente cuando, para ningún número real a , es verdad que se tenga $\lim x_n = a$.



Cuando $\lim x_n = a$, fuera de un intervalo $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ están a lo sumo los términos $x_1, x_2, \dots, x_{n_0}$

Demostraremos ahora algunos resultados simples sobre límites, a fin de poder analizar inteligentemente los ejemplos que vendrán a continuación.

En primer lugar, mostraremos que una sucesión no puede poseer dos límites distintos.

Teorema 1. (Unicidad del límite). Si $\lim x_n = a$ y $\lim x_n = b$ entonces $a = b$.

Demostración. Sea $\lim x_n = a$. Dado cualquier número real $b \neq a$, mostraremos que no se cumple $\lim x_n = b$. Para ello, tomemos $\varepsilon = \frac{|b-a|}{2}$. Vemos que $\varepsilon > 0$ y notamos además que los intervalos $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ y $(b - \varepsilon, b + \varepsilon)$ son disjuntos. (Si existiera $x \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon) \cap (b - \varepsilon, b + \varepsilon)$ tendríamos $|a - x| < \varepsilon$ y $|x - b| < \varepsilon$, de donde $|a - b| \leq |a - x| + |x - b| < 2\varepsilon = |a - b|$, un absurdo.) Ahora bien, como $\lim x_n = a$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0 \Rightarrow x_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$,

por tanto, $x_n \notin (b - \varepsilon, b + \varepsilon)$ para todo $n > n_0$. Luego no es $\lim x_n = b$.

Teorema 2. Si $\lim x_n = a$ entonces toda subsucesión de (x_n) converge al límite a .

Demostración. Sea $(x_{n_1}, x_{n_2}, \dots, x_{n_i}, \dots)$ una subsucesión de (x_n) . Dado $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0 \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon$. Como los índices de la subsucesión forman un subconjunto infinito, existe entre ellos un $n_{i_0} > n_0$. Entonces $n_i > n_{i_0} \Rightarrow n_i > n_0 \Rightarrow |x_{n_i} - a| < \varepsilon$. Luego $\lim x_{n_i} = a$.

Corolario. Si $\lim x_n = a$ entonces, para todo $k \in \mathbb{N}$, $\lim x_{n+k} = a$. En efecto, $(x_{1+k}, x_{2+k}, \dots, x_{n+k}, \dots)$ es una subsucesión de (x_n) .

Se expresa el corolario anterior diciendo que el límite de una sucesión no se altera cuando de ella se omite un número finito de términos. En realidad, el Teorema 2 dice que el límite se mantiene, incluso si se desprecian términos en número infinito (siempre que se conserve una infinidad de índices, de modo que quede aún una subsucesión). Es útil (y obvio) el hecho de que si $(x_{n+k})_{n \in \mathbb{N}}$ converge, entonces $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ también converge.

: Hay dos aplicaciones especialmente útiles de los Teoremas 1 y 2 (conjuntamente). Una de ellas es para mostrar que una cierta sucesión (x_n) no converge: basta obtener dos subsucesiones de (x_n) con límites distintos. La otra es para determinar el límite de una sucesión (x_n) que, a priori, se sabe que converge: basta determinar el límite de alguna subsucesión. Ese será el límite buscado. Veremos situaciones como estas en los Ejemplos 13 y 14.

Teorema 3. Toda sucesión convergente es acotada.

Demostración. Sea $a = \lim x_n$. Entonces, tomando $\varepsilon = 1$, vemos que existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0 \Rightarrow x_n \in (a - 1, a + 1)$. Consideremos el conjunto finito $F = \{x_1, x_2, \dots, x_{n_0}, a - 1, a + 1\}$. Sean c el menor y d el mayor elemento de F . Entonces todos los términos x_n de la sucesión están contenidos en el intervalo $[c, d]$; luego la sucesión es acotada.

Observaciones: 1. El recíproco es falso: la sucesión $(0, 1, 0, 1, \dots)$ es acotada pero no es convergente porque posee dos subsucesiones que convergen a límites diferentes, a saber, $(0, 0, 0, \dots)$ y $(1, 1, 1, \dots)$.

2. Basta entonces verificar que una sucesión no es acotada para concluir que no converge.

La proposición siguiente nos proporciona un "criterio de convergencia", es decir, nos permite concluir que una sucesión (x_n) converge, incluso sin conocer, a priori, su límite.

Además de su importancia, tanto teórica como práctica, el teorema abajo tuvo un papel histórico relevante. Fue intentando probarlo "de manera puramente aritmética" que Dedekind (1858) verificó la imposibilidad de hacerlo sin poseer antes una teoría matemática satisfactoria de los números reales. Esto lo motivó a construir los números reales mediante los "cortes" que hoy llevan su nombre.

Teorema 4. Toda sucesión monótona acotada es convergente.

Demostración. Para fijar las ideas, sea $(x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n \leq \dots)$ una sucesión no decreciente acotada. Tomemos $a = \sup\{x_n; n = 1, 2, \dots\}$. Afirmamos que $a = \lim x_n$. En efecto, dado cualquier $\varepsilon > 0$, como $a - \varepsilon < a$, el número $a - \varepsilon$ no es cota superior del conjunto de los x_n . Luego existe algún $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $a - \varepsilon < x_{n_0}$. Como la sucesión es monótona, $n > n_0 \Rightarrow x_{n_0} \leq x_n$, por tanto, $a - \varepsilon < x_n$. Como $x_n \leq a$ para todo n , vemos que $n > n_0 \Rightarrow a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon$. Así, tenemos de hecho $\lim x_n = a$, como queríamos demostrar.

: Si (x_n) fuera no creciente, tendríamos $\lim x_n = \inf\{x_n; n = 1, 2, \dots\}$.

Corolario. Si una sucesión monótona (x_n) posee una subsucesión convergente, entonces (x_n) es convergente.

En efecto, en este caso la sucesión monótona (x_n) es acotada porque posee una subsucesión acotada.

Ejemplos. Antes de presentar ejemplos nuevos, reexaminaremos los diez anteriores, desde el punto de vista de convergencia.

1. Toda sucesión constante $(a, a, \dots, a, \dots)$ es evidentemente convergente y tiene límite a . En particular, $\lim 1 = 1$.

2. La sucesión $(1, 2, 3, \dots, n, \dots)$ no converge porque no es acotada.

3. La sucesión $(1, 0, 1, 0, \dots)$ es divergente, pues admite dos subsucesiones (constantes) que convergen a límites diferentes.

4. Tenemos $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$. En efecto, dado $\varepsilon > 0$ arbitrario, podemos obtener $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n_0 > \frac{1}{\varepsilon}$. Entonces $n > n_0 \Rightarrow \frac{1}{n} < \frac{1}{n_0} < \varepsilon$, o sea, $n > n_0 \Rightarrow \left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \varepsilon$.

5. La sucesión $(1, 0, 2, 0, 3, 0, \dots)$ no es convergente porque es no acotada. Nótese que posee una subsucesión convergente.

6. Cuando $a = 0$ o $a = 1$, la sucesión (a^n) es constante, luego converge trivialmente. Cuando $a = -1$, la sucesión (a^n) diverge pues es igual a $(-1, +1, -1, +1, \dots)$. Cuando $a > 1$, la misma sucesión es monótona creciente y no acotada, luego es divergente. Cuando $a < -1$, la sucesión es divergente por ser no acotada. Sea ahora $0 < a < 1$. Entonces la sucesión $(a, a^2, a^3, \dots)$ es monótona (decreciente) acotada; luego converge. Afirmamos que $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0$ (cuando $0 < a < 1$). En efecto, dado $\varepsilon > 0$, como $\frac{1}{a} > 1$, las potencias de $\frac{1}{a}$ forman una sucesión creciente no acotada. Luego existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0 \Rightarrow \left(\frac{1}{a}\right)^n > \frac{1}{\varepsilon}$, o sea, $\frac{1}{a^n} > \frac{1}{\varepsilon}$, esto es, $a^n < \varepsilon$. Así, $n > n_0 \Rightarrow |a^n - 0| < \varepsilon$, lo que muestra que $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0$. Finalmente, si $-1 < a < 0$, afirmamos que aún se tiene $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0$. En efecto, tenemos $0 < |a| < 1$. Luego $0 = \lim_{n \rightarrow \infty} |a|^n = \lim_{n \rightarrow \infty} |a^n|$. Se sigue que

$\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0$, en virtud de la siguiente :

$$\lim x_n = 0 \Leftrightarrow \lim |x_n| = 0.$$

(La veracidad de la es trivial. Basta usar la definición de límite.)

7. Si $0 < a < 1$, la sucesión cuyo n -ésimo término es $x_n = 1 + a + a^2 + \cdots + a^n$ es creciente y acotada, luego converge. Afirmamos que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{1-a}$. En efecto, tenemos $x_n = \frac{1-a^{n+1}}{1-a}$, luego $|x_n - \frac{1}{1-a}| = \frac{a^{n+1}}{1-a}$. Dado $\varepsilon > 0$ podemos, en virtud del ejemplo anterior, obtener $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0 \Rightarrow a^{n+1} < \varepsilon(1-a)$. Se sigue que $n > n_0 \Rightarrow \frac{a^{n+1}}{1-a} < \varepsilon$, es decir $|x_n - \frac{1}{1-a}| < \varepsilon$. Luego $\lim x_n = \frac{1}{1-a}$, como queríamos demostrar. Si solo se cumple $0 < |a| < 1$, la sucesión $\{x_n\}$ puede no ser monótona pero aún se tiene $\lim x_n = \frac{1}{1-a}$ por el argumento anterior.

8. y 9. Las sucesiones $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$, siendo monótonas acotadas, son convergentes. Sea $e = \lim a_n$. Mostraremos más adelante (Ejemplo 16) que también se tiene $e = \lim b_n$. (El número e , base de los logaritmos naturales, es una de las constantes más ubicuas en el Análisis Matemático.)

10. En este ejemplo, los términos de orden impar constituyen una sucesión creciente acotada.

$$\begin{aligned} x_{2n-1} &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4^2} + \cdots + \frac{1}{4^{n-1}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^n}{1 - \frac{1}{4}} \right] = \frac{2}{3} \left[1 - \left(\frac{1}{4}\right)^n \right]. \end{aligned}$$

Vemos que $|x_{2n+1} - \frac{2}{3}| = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{4}\right)^n$. Como $0 < \frac{1}{4} < 1$, se sigue del Ejemplo 6 que, dado $\varepsilon > 0$ arbitrariamente, podemos obtener n_0 tal que $n > n_0 \Rightarrow \left(\frac{1}{4}\right)^n < \varepsilon$. Con mayor razón, $n > n_0 \Rightarrow \frac{2}{3} \left(\frac{1}{4}\right)^n < \varepsilon$, o sea, $n > n_0 \Rightarrow |x_{2n-1} - \frac{2}{3}| < \varepsilon$. Así $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n-1} = \frac{2}{3}$.

Análogamente, los términos de índice par forman una subsucesión decreciente acotada.

$$\begin{aligned} x_{2n} &= 1 - \left[\frac{1}{4} + \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} \right] = \\ &= 2 - \left[1 + \frac{1}{4} + \cdots + \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} \right] = 2 - \frac{4}{3} \left[1 - \left(\frac{1}{4}\right)^n \right]. \end{aligned}$$

Como $2 - \frac{4}{3} = \frac{2}{3}$, vemos que $|x_{2n} - \frac{2}{3}| = \frac{4}{3} \left(\frac{1}{4}\right)^n$. Se sigue de ahí que $\lim x_{2n} = \frac{2}{3}$. Verificamos así que los términos de orden par y los términos de orden impar de la sucesión (x_n) forman dos subsucesiones que tienen el mismo límite $\frac{2}{3}$. Debe resultar de esto que $\lim x_n = \frac{2}{3}$. En efecto, dado $\varepsilon > 0$, existen $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ tales que $n > n_1$, n par $\Rightarrow |x_n - \frac{2}{3}| < \varepsilon$ y $n > n_2$, n impar $\Rightarrow |x_n - \frac{2}{3}| < \varepsilon$. Sea n_0 el mayor de los dos números n_1, n_2 , es decir, $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$. Entonces $n > n_0 \Rightarrow n > n_1$ y $n > n_2$. Luego, ya sea n par o impar, se tiene $|x_n - \frac{2}{3}| < \varepsilon$ para todo $n > n_0$.

11. Como, a partir de su tercer término, la sucesión $(\sqrt[n]{n})$ es decreciente, se sigue que existe $a = \lim \sqrt[n]{n}$. Mostraremos más adelante (Ejemplo 14) que $a = 1$.

4.3. Propiedades aritméticas de los límites

Veremos ahora cómo se comportan los límites de sucesiones respecto a las operaciones y a las desigualdades.

Teorema 5. Si $\lim x_n = 0$ e (y_n) es una sucesión acotada, entonces $\lim x_n \cdot y_n = 0$ (incluso si no existe $\lim y_n$).

Demostración. Existe $c > 0$ tal que $|y_n| < c$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Dado $\varepsilon > 0$, como $\lim x_n = 0$, podemos encontrar $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0 \Rightarrow |x_n| < \frac{\varepsilon}{c}$. Luego, $n > n_0 \Rightarrow |x_n \cdot y_n| = |x_n| \cdot |y_n| < \frac{\varepsilon}{c} \cdot c = \varepsilon$. Esto muestra que $x_n \cdot y_n \rightarrow 0$.

Ejemplo 12. Cualquiera que sea $x \in \mathbb{R}$, tenemos $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(nx)}{n} = 0$. En efecto, $\frac{\sin(nx)}{n} = \sin(nx) \cdot \frac{1}{n}$, con $|\sin(nx)| \leq 1$ y $\frac{1}{n} \rightarrow 0$.

Antes de demostrar el teorema siguiente, observemos lo siguiente: cuando $\lim y_n = b$, con $b \neq 0$, entonces, salvo un número finito de índices n , se tiene $y_n \neq 0$. En efecto, siendo $b \neq 0$, podemos tomar un intervalo $(b - \varepsilon, b + \varepsilon)$ de centro b tal que $0 \notin (b - \varepsilon, b + \varepsilon)$. (Basta tomar $\varepsilon = |b|$.) Entonces existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0 \Rightarrow y_n \in (b - \varepsilon, b + \varepsilon)$, es decir, $n > n_0 \Rightarrow y_n \neq 0$.

En el ítem 3 del teorema siguiente, para formar la sucesión $\frac{x_n}{y_n}$, nos limitamos a los índices n suficientemente grandes de modo que $y_n \neq 0$.

Teorema 6. Si $\lim x_n = a$ y $\lim y_n = b$, entonces

1. $\lim(x_n + y_n) = a + b$; $\lim(x_n - y_n) = a - b$;
2. $\lim(x_n \cdot y_n) = a \cdot b$;
3. $\lim\left(\frac{x_n}{y_n}\right) = \frac{a}{b}$ si $b \neq 0$.

Demostración. 1. Dado $\varepsilon > 0$ existen n_1 y n_2 en $\mathbb{N}$ tales que $n > n_1 \Rightarrow |x_n - a| < \varepsilon/2$ y $n > n_2 \Rightarrow |y_n - b| < \varepsilon/2$. Sea $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$. Entonces $n > n_0 \Rightarrow n > n_1$ y $n > n_2$. Luego $n > n_0$ implica:

$$|(x_n + y_n) - (a + b)| = |(x_n - a) + (y_n - b)| \leq |x_n - a| + |y_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Esto prueba que $\lim(x_n + y_n) = a + b$. El caso de la diferencia $x_n - y_n$ se trata del mismo modo.

2. Tenemos $x_n y_n - ab = x_n y_n - x_n b + x_n b - ab = x_n(y_n - b) + (x_n - a)b$. Ahora, (x_n) es una sucesión acotada (Teorema 3) y $\lim(y_n - b) = 0$. Luego, por el Teorema 5, $\lim[x_n(y_n - b)] = 0$. Por motivo semejante, $\lim[(x_n - a)b] = 0$. Así, por la parte 1, ya demostrada, tenemos $\lim(x_n y_n - ab) = \lim[x_n(y_n - b)] + \lim[(x_n - a)b] = 0$, de donde $\lim x_n y_n = ab$.

3. En primer lugar, notemos que, como $y_n b \rightarrow b^2$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0 \Rightarrow y_n b > b^2/2$. (Basta tomar $\varepsilon = b^2/2$ y hallar el n_0 correspondiente.) Se sigue que, para todo $n > n_0$, $y_n b$ es un número (positivo) mayor que $b^2/2$. Luego, la sucesión $\left(\frac{1}{y_n b}\right)$ es acotada. Ahora tenemos

$$\frac{x_n}{y_n} - \frac{a}{b} = \frac{bx_n - ay_n}{y_n b} = (bx_n - ay_n) \frac{1}{y_n b}.$$

Como $\lim_{n \rightarrow \infty} (bx_n - ay_n) = ab - ab = 0$, se sigue del Teorema 5 que

$$\lim \left(\frac{x_n}{y_n} - \frac{a}{b} \right) = 0, \text{ y por tanto } \lim \frac{x_n}{y_n} = \frac{a}{b}.$$

: Es claro que resultados análogos a los ítems 1 y 2 del Teorema 6 valen aún para tres, cuatro o un número finito cualquiera de sucesiones. Por ejemplo, si $\lim x_n = a$, $\lim y_n = b$ y $\lim z_n = c$ entonces $\lim(x_n + y_n + z_n) = a + b + c$ y $\lim(x_n \cdot y_n \cdot z_n) = abc$. Pero debe tenerse cuidado de no intentar aplicar el teorema para ciertas sumas (o productos) en que el número de sumandos (o factores) es variable y crece por encima de cualquier límite. Por ejemplo, sea $s_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n}$ (n sumandos). Entonces $s_n = 1$ de donde $\lim s_n = 1$. Por otro lado, cada sumando $\frac{1}{n}$ tiene límite cero. Una aplicación descuidada del Teorema 6 llevaría al absurdo de concluir que

$$\lim s_n = \lim \frac{1}{n} + \lim \frac{1}{n} + \cdots + \lim \frac{1}{n} = 0 + 0 + \cdots + 0 = 0.$$

Ejemplo 13. Examinemos la sucesión de números reales positivos $x_n = \sqrt[n]{a} = a^{1/n}$, donde $a > 0$. Es decreciente si $a > 1$ y creciente si $0 < a < 1$, siendo acotada en cualquier hipótesis. Existe por tanto $l = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{1/n}$. Podemos garantizar que $l > 0$.

(En efecto, si $0 < a < 1$, entonces $l = \sup\{a^{1/n}; n \in \mathbb{N}\} \geq a$. Si $a > 1$ entonces

$a^{1/n} > 1$, para todo n , luego $l = \inf a^{1/n} \geq 1$.) Afirmamos que se tiene $\lim a^{1/n} = 1$. Para probar esto, consideramos la subsucesión $(a^{1/n(n+1)}) = (a^{1/2}, a^{1/6}, a^{1/12}, \dots)$. El Teorema 2 y el ítem 2 del Teorema 6 nos dan

$$l = \lim a^{1/n(n+1)} = \lim a^{1/n-1/(n+1)} = \lim \frac{a^{1/n}}{a^{1/(n+1)}} = \frac{l}{l} = 1.$$

Ejemplo 14. Mostremos ahora que $\lim \sqrt[n]{n} = \lim n^{1/n} = 1$. Sabemos que este límite existe porque la sucesión es monótona decreciente a partir de su tercer término. Escribiendo $l = \lim n^{1/n}$, vemos que $l = \inf\{n^{1/n}; n \in \mathbb{N}\}$. Como $n^{1/n} > 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$, tenemos $l \geq 1$. En particular, $l > 0$. Considerando la subsucesión $(2n)^{1/2n}$, tenemos

$$l^2 = \lim[(2n)^{1/2n}]^2 = \lim[(2n)^{1/n}] = \lim[2^{1/n} \cdot n^{1/n}] = \lim 2^{1/n} \cdot \lim n^{1/n} = 1 \cdot l = l.$$

Como $l \neq 0$, de $l^2 = l$ concluimos $l = 1$.

Ejemplo 15. En relación al límite de $\frac{x_n}{y_n}$, veamos qué puede ocurrir cuando $\lim y_n = 0$. Hagamos, entonces, esta hipótesis. Si, aún así, existe $\lim \frac{x_n}{y_n}$, (o al menos la sucesión $\left(\frac{x_n}{y_n}\right)$ es acotada) debe tenerse necesariamente $\lim x_n = 0$, pues

$$x_n = \left(\frac{x_n}{y_n}\right) y_n.$$

En otras palabras, cuando $\lim y_n = 0$ y la sucesión (x_n) diverge o tiene límite $\neq 0$, el cociente $\frac{x_n}{y_n}$ no converge (ni siquiera se mantiene acotado). Supongamos ahora que $\lim x_n = \lim y_n = 0$. En este caso, el cociente $\frac{x_n}{y_n}$ puede tener límite o no. Por ejemplo, si $x_n = \frac{1}{n}$ e $y_n = \frac{1}{an}$ entonces

$$\lim \frac{x_n}{y_n} = a.$$

Pero si $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$ e $y_n = \frac{1}{n}$, entonces $\frac{x_n}{y_n} = (-1)^n$, luego no existe $\lim \frac{x_n}{y_n}$.

Teorema 7. (Permanencia del signo). Si $\lim x_n = a > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0 \Rightarrow x_n > 0$. (Si una sucesión tiene límite positivo, a partir de un cierto orden todos sus términos son positivos.)

Demostración. Sea $\varepsilon = a/2 > 0$. Entonces $(a - \varepsilon, a + \varepsilon) = (a/2, 3a/2)$. Existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0 \Rightarrow x_n \in (a/2, 3a/2)$, o sea $x_n > a/2$. Así $n > n_0 \Rightarrow x_n > 0$.

: De la misma manera se prueba que si $\lim x_n = b < 0$ entonces, a partir de un cierto orden, todos los términos x_n son negativos.

Corolario 1. Sean (x_n) y (y_n) sucesiones convergentes. Si $x_n \leq y_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$ entonces $\lim x_n \leq \lim y_n$.

En efecto, si fuera $\lim x_n > \lim y_n$, entonces tendríamos $0 < \lim x_n - \lim y_n = \lim(x_n - y_n)$ y, de ahí, tendríamos $x_n - y_n > 0$ para todo n suficientemente grande.

: Incluso suponiendo $x_n < y_n$, para todo n , no se puede garantizar que $\lim x_n < \lim y_n$. Por ejemplo, $0 < 1/n$, pero $\lim 1/n = 0$.

Corolario 2. Sea (x_n) convergente. Si $x_n \geq a$ para todo n , entonces $\lim x_n \geq a$.

Teorema 8. Sean $x_n \leq z_n \leq y_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Si $\lim x_n = \lim y_n = a$ entonces $\lim z_n = a$.

Demostración. Dado $\varepsilon > 0$ arbitrariamente, existen $n_1 \in \mathbb{N}$ y $n_2 \in \mathbb{N}$ tales que $n > n_1 \Rightarrow x_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ y $n > n_2 \Rightarrow y_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$. Poniendo $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$, vemos que $n > n_0$ implica $a - \varepsilon < x_n \leq z_n \leq y_n < a + \varepsilon$, de donde $\lim z_n = a$.

Ejemplo 16. Volviendo a los Ejemplos 8 y 9, mostraremos ahora que se tiene

$\lim a_n = \lim b_n = e$. En primer lugar, como $b_n < a_n$ para todo n , obtenemos luego $\lim b_n \leq \lim a_n$. Por otro lado, fijando arbitrariamente $p \in \mathbb{N}$, tenemos, para todo $n > p$,

$$b_n \geq 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{p!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{p-1}{n}\right).$$

Haciendo $n \rightarrow \infty$ (y manteniendo p fijo) en la desigualdad anterior, el segundo miembro tiende al límite a_p . El Corolario 1 del Teorema 7, entonces, nos da $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \geq a_p$ para todo p . Nuevamente la misma proposición nos permite concluir que $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \geq \lim_{p \rightarrow \infty} a_p$.

Finalmente, obtenemos

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}\right).$$

4.4. Subsucesiones

La definición de límite se puede reformular así: el número real a es el límite de la sucesión $x = (x_n)$ si, y solo si, para todo $\varepsilon > 0$, el conjunto

$$x^{-1}(a - \varepsilon, a + \varepsilon) = \{n \in \mathbb{N}; x_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)\}$$

tiene complemento finito en $\mathbb{N}$. Sabemos que esto equivale a decir que existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0 \Rightarrow x_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$.

Mostraremos ahora que $a \in \mathbb{R}$ es límite de una subsucesión de (x_n) si y solo si, para todo $\varepsilon > 0$, el conjunto

$$x^{-1}(a - \varepsilon, a + \varepsilon) = \{n \in \mathbb{N}; x_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)\}$$

es un subconjunto infinito de $\mathbb{N}$. Es claro que si un subconjunto de $\mathbb{N}$ tiene complemento finito entonces es un subconjunto infinito, pero el recíproco es falso.

Teorema 9. Para que $a \in \mathbb{R}$ sea límite de una subsucesión de (x_n) es necesario y suficiente que, para todo $\varepsilon > 0$, exista una infinidad de índices n tales que $x_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$.

Demostración. En primer lugar, la condición es necesaria. En efecto, sea $\mathbb{N}' = \{n_1 < n_2 < \dots < n_i < \dots\} \subset \mathbb{N}$ tal que $a = \lim_{n \in \mathbb{N}'} x_n$. Entonces, para cada $\varepsilon > 0$ existe $i_0 \in \mathbb{N}$ tal que $i > i_0 \Rightarrow x_{n_i} \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$. Como existe una infinidad de índices $i > i_0$, se sigue que existen infinitos $n_i \in \mathbb{N}$ tales que $x_{n_i} \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$. Recíprocamente, supongamos que, para cada $\varepsilon > 0$, el conjunto $\{n \in \mathbb{N}; x_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)\}$ sea infinito. Tomando sucesivamente $\varepsilon = 1, 1/2, 1/3, \dots$ obtendremos un conjunto $\mathbb{N}' = \{n_1 < n_2 < \dots < n_i < \dots\}$ tal que $a = \lim_{n \in \mathbb{N}'} x_n$. En efecto, sea $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que $x_{n_1} \in (a - 1, a + 1)$. Suponiendo, por inducción, que $n_1 < n_2 < \dots < n_i$ han sido definidos de modo que $x_{n_2} \in (a - 1/2, a + 1/2)$, $x_{n_3} \in (a - 1/3, a + 1/3)$, ..., $x_{n_i} \in (a - 1/i, a + 1/i)$, observamos que el conjunto $\{n \in \mathbb{N}; x_n \in (a - \frac{1}{i+1}, a + \frac{1}{i+1})\}$ es infinito, luego contiene algún entero n_{i+1} mayor que $n_1, n_2, \dots, n_i$. Esto completa la definición inductiva de $\mathbb{N}' = \{n_1 < n_2 < \dots < n_i < \dots\}$. Como

$$|x_n - a| < \frac{1}{i}$$

para todo $i \in \mathbb{N}$, tenemos $\lim_{i \rightarrow \infty} x_n = a$, es decir,

$$\lim_{n \in \mathbb{N}'} x_n = a.$$

Vemos que a es límite de una subsucesión de (x_n) . La condición es, pues, suficiente.

Un número real a se llama valor de adherencia de una sucesión (x_n) cuando a es límite de alguna subsucesión de (x_n) .

Recordando que un subconjunto de $\mathbb{N}$ es infinito si, y solo si, es no acotado, el Teorema 9 nos dice que $a \in \mathbb{R}$ es valor de adherencia de (x_n) si, y solo si, para todo $\varepsilon > 0$ y todo $n_0 \in \mathbb{N}$ existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0$ y $x_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$. Esto se expresa en lenguaje común diciendo que a es valor de adherencia de (x_n) si, y solo si, todo intervalo abierto de centro a contiene términos x_n con índices arbitrariamente grandes. Por otro lado, $a = \lim x_n$ significa que cualquier intervalo abierto de centro a contiene todos los términos x_n con índices suficientemente grandes.

Ejemplo 17. Si $\lim x_n = a$ entonces a es valor de adherencia de (x_n) y, por el Teorema 2, a es el único valor de adherencia de (x_n) . La sucesión $(0, 1, 0, 2, 0, 3, \dots)$ tiene 0 como su único valor de adherencia, aunque no sea convergente. La sucesión $(0, 1, 0, 1, 0, \dots)$ tiene como valores de adherencia 0 y 1. Cualquiera que sea el número real a , existen infinitos números racionales en el intervalo $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$. Se sigue entonces del Teorema 9 que, dada una enumeración arbitraria $(r_1, r_2, \dots, r_n, \dots)$ de los números racionales, todo número real es valor de adherencia de la sucesión (r_n) . Sea $x_n = n$. La sucesión (x_n) no posee valores de adherencia.

Sea ahora (x_n) una sucesión acotada de números reales. Mostraremos que el conjunto de los valores de adherencia de (x_n) no es vacío, que entre ellos existe uno que es el menor de todos y otro que es el mayor, y que la sucesión converge si, y solo si, posee apenas un valor de adherencia. En un sentido natural, el mayor y el menor valor de adherencia son generalizaciones del límite para el caso de sucesiones acotadas que pueden no ser convergentes. Pasemos a la discusión formal.

Sea x_n una sucesión acotada; digamos, con $\alpha \leq x_n \leq \beta$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Escribamos $X_n = \{x_n, x_{n+1}, \dots\}$. Tenemos $[\alpha, \beta] \supset X_1 \supset X_2 \supset \dots \supset X_n \supset$

... Luego, poniendo $a_n = \inf X_n$ y $b_n = \sup X_n$, resulta

$$\alpha \leq a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n \leq \cdots \leq b_n \leq \cdots \leq b_2 \leq b_1 \leq \beta.$$

Existen, por tanto, los límites

$$a = \lim a_n = \sup a_n = \sup \inf X_n,$$

$$b = \lim b_n = \inf b_n = \inf \sup X_n.$$

Escribiremos $a = \lim \inf x_n$, $b = \lim \sup x_n$, diremos que a es el límite inferior y que b es el límite superior de la sucesión (x_n) . Se tiene evidentemente

$$\lim \inf x_n \leq \lim \sup x_n.$$

Ejemplo 18. Sean $x_{2n-1} = -\frac{1}{n}$ y $x_{2n} = 1 + \frac{1}{n}$.

Se verifica sin dificultad que $\inf X_{2n-2} = \inf X_{2n-1} = -\frac{1}{n}$ y $\sup X_{2n-1} = \sup X_{2n} = 1 + \frac{1}{n}$. Luego $\lim \inf x_n = 0$ y $\lim \sup x_n = 1$.

Estos son, por lo demás, los dos únicos valores de adherencia de la sucesión (x_n) .

Teorema 10. Sea (x_n) una sucesión acotada. Entonces $\lim \inf x_n$ es el menor valor de adherencia y $\lim \sup x_n$ es el mayor valor de adherencia de (x_n) .

Demostración. Probemos inicialmente que $a = \lim \inf x_n$ es valor de adherencia de (x_n) . Para ello, usaremos el Teorema 9. Dados arbitrariamente $\varepsilon > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$, mostraremos que existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0$ y $x_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$. Como $a = \lim a_n$, existe $n_1 > n_0$ tal que $a - \varepsilon < a_{n_1} < a + \varepsilon$. Como $a_{n_1} = \inf X_{n_1}$, se sigue de la última desigualdad que $a + \varepsilon$ (siendo mayor que a_{n_1}) no es cota inferior de X_{n_1} . Luego existe $n \geq n_1$ tal que $a_{n_1} \leq x_n < a + \varepsilon$.

Esto nos da $n > n_0$ con $a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon$, como queríamos. Mostremos ahora que ningún número $c < a$ puede ser valor de adherencia de (x_n) . Puesto que $a = \lim a_n$, de $c < a$ se sigue que existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $c < a_{n_0} \leq a$. Como $a_{n_0} = \inf X_{n_0}$, concluimos que $n \geq n_0 \Rightarrow c < a_{n_0} \leq x_n$. Poniendo $\varepsilon = a_{n_0} - c$, vemos que $c + \varepsilon = a_{n_0}$, luego el intervalo $(c - \varepsilon, c + \varepsilon)$ no contiene ningún término x_n con $n \geq n_0$. Esto excluye la posibilidad de que c sea valor de adherencia de (x_n) . La demostración para $\limsup$ se hace de modo semejante.

Corolario 1. Toda sucesión acotada de números reales posee una subsucesión convergente.

En efecto, siendo $a = \limsup x_n$ un valor de adherencia, alguna subsucesión de (x_n) converge a a .

Corolario 2. Una sucesión acotada de números reales (x_n) es convergente si, y solo si, $\liminf x_n = \limsup x_n$, es decir, si, y solo si, posee un único valor de adherencia.

En efecto, si la sucesión (x_n) es convergente entonces $\liminf x_n = \limsup x_n = \lim x_n$. Recíprocamente, supongamos $\liminf x_n = \limsup x_n = a$. En la notación anterior, tenemos $a = \lim a_n = \lim b_n$. Dado entonces $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $a - \varepsilon < a_{n_0} \leq a < b_{n_0} < a + \varepsilon$. Ahora bien, $n > n_0$ implica $a_{n_0} \leq x_n \leq b_{n_0}$. Luego, $n > n_0 \Rightarrow a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon$, por tanto $\lim x_n = a$.

Dada una sucesión acotada (x_n) , sean $a = \liminf x_n$ y $b = \limsup x_n$. Existen subsucesiones de (x_n) que convergen a a y a b , pero no a un valor menor que a ni mayor que b . Si $a = \lim_{n \in \mathbb{N}'} x_n$, la subsucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}'}$ puede poseer una infinidad de términos menores que a . Pero, dado un número cualquiera menor que a , digamos $a - \varepsilon$ (con $\varepsilon > 0$), no puede existir una infinidad de índices n tales que $x_n < a - \varepsilon$, pues, en ese caso, esos índices originarían una subsucesión de (x_n) la cual poseería un valor de adherencia $c \leq a - \varepsilon$, lo que sería absurdo. Luego, para todo $\varepsilon > 0$ existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_1 \Rightarrow a - \varepsilon < x_n$.

Análogamente, para todo $\varepsilon > 0$ existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_2 \Rightarrow x_n < b + \varepsilon$. En otras palabras, dado cualquier intervalo abierto $(a - \varepsilon, b + \varepsilon)$ que contenga al intervalo $[a, b]$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ (tómese $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$) tal que $n > n_0 \Rightarrow a - \varepsilon < x_n < b + \varepsilon$. Evidentemente, esta propiedad por sí sola no basta para caracterizar los números $a = \liminf x_n$ y $b = \limsup x_n$: si todos los términos x_n de la sucesión están contenidos en un intervalo $[\alpha, \beta]$ entonces $\alpha - \varepsilon < x_n < \beta + \varepsilon$ para cualesquiera $n \in \mathbb{N}$ y $\varepsilon > 0$. Pero $[a, b]$ es el menor intervalo que cumple la condición anterior, según nos enseña el

Teorema 11. Sean $a = \liminf x_n$ y $b = \limsup x_n$, donde (x_n) es una sucesión acotada. Dado cualquier $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0 \Rightarrow a - \varepsilon < x_n < b + \varepsilon$. Además, a es el mayor y b es el menor número con esta propiedad.

Demostración. La primera afirmación ya fue probada arriba. Supongamos ahora que a' sea un número mayor que a . Tomando $\varepsilon = (a' - a)/2$ tenemos $a + \varepsilon = a' - \varepsilon$. Como a es valor de adherencia de (x_n) , existe una infinidad de índices n tales que $a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon$, y por tanto $x_n < a' - \varepsilon$. Luego ningún número $a' > a$ goza de la propiedad estipulada anteriormente. Del mismo modo se muestra que si $b' < b$ entonces existe $\varepsilon > 0$ tal que infinitos valores de n cumplen la condición $b' + \varepsilon < x_n$. Esto concluye la demostración.

Corolario 1. Si $c < \liminf x_n$ entonces existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_1 \Rightarrow c < x_n$. Análogamente, si $\limsup x_n < d$ entonces existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que $x_n < d$ para todo $n > n_2$.

En efecto, siendo $a = \liminf x_n$, $c < a$ significa $c = a - \varepsilon$, con $\varepsilon > 0$. Del mismo modo se argumenta con $\limsup$.

Corolario 2. Dada una sucesión acotada (x_n) , sean a y b números reales con las siguientes propiedades: si $c < a$ entonces existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_1 \Rightarrow c < x_n$; si $b < d$ entonces existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_2 \Rightarrow x_n < d$. En estas condiciones, $a \leq \liminf x_n$ y $\limsup x_n \leq b$.

Los Corolarios 1 y 2 solo repiten, con otras palabras, las afirmaciones contenidas en el Teorema 11.

Apéndice al §4

El Corolario 1 del Teorema 10, por su importancia, merece una demostración directa. Una alternativa razonable es probar que toda sucesión posee una subsucesión monótona y luego usar el Teorema 4. Otra posibilidad es la que presentamos ahora.

Toda sucesión acotada de números reales posee una subsucesión convergente.

Demostración. Sea (x_n) una sucesión, digamos con $x_n \in [a, b]$ para todo n . Consideremos el conjunto $A = \{t \in \mathbb{R}; t \leq x_n \text{ para una infinidad de índices } n\}$. Como $a \leq x_n \leq b$ para todo $n \in \mathbb{N}$, se sigue que $a \in A$ y que ningún elemento de A puede ser mayor que b . Así, A es no vacío y acotado superiormente. Existe, por tanto, $c = \sup A$. Para todo $\varepsilon > 0$, existe $t \in A$ con $c - \varepsilon < t$, luego hay una infinidad de índices n tales que $c - \varepsilon < x_n$. Por otro lado, como $c + \varepsilon \notin A$, existe solo un número finito de índices n con $c + \varepsilon \leq x_n$. Concluimos entonces que, para una infinidad de valores de n , tenemos $c - \varepsilon < x_n < c + \varepsilon$. Se sigue del Teorema 9 que c es límite de una subsucesión de (x_n) .

El lector notará que, en la demostración anterior, se tiene $c = \limsup x_n$.

4.5. Sucesiones de Cauchy

Ya hemos señalado la importancia del Teorema 4 (“toda sucesión monótona acotada es convergente”), que nos permite saber, en ciertos casos, que una sucesión posee límite, incluso sin conocer el valor de ese límite. Pero es claro que muchas sucesiones convergentes no son monótonas, de modo que aquel criterio de convergencia no es el más general posible. Veremos ahora el criterio de Cauchy, que nos dará una condición, no solo suficiente sino también necesaria, para la convergencia de una sucesión de números reales.

Sea (x_n) una sucesión de números reales. Se llama una sucesión de Cauchy cuando cumple la siguiente condición: — dado arbitrariamente un número real $\varepsilon > 0$, se puede obtener $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $m > n_0$ y $n > n_0$ implica $|x_m - x_n| < \varepsilon$.

Para que (x_n) sea una sucesión de Cauchy, se exige que sus términos x_m , x_n , para valores suficientemente grandes de los índices m , n , se aproximen arbitrariamente unos de otros. Compárese con la definición de límite, donde se exige que los términos x_n se aproximen arbitrariamente a un número real α dado a priori. Aquí se impone una condición solo sobre los términos de la propia sucesión.

Teorema 12. Toda sucesión convergente es de Cauchy.

Demostración. Sea $\lim x_n = \alpha$. Dado arbitrariamente $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $m > n_0 \Rightarrow |x_m - \alpha| < \frac{\varepsilon}{2}$ y $n > n_0 \Rightarrow |x_n - \alpha| < \frac{\varepsilon}{2}$. Luego $m, n > n_0 \Rightarrow |x_m - x_n| \leq |x_m - \alpha| + |x_n - \alpha| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$, lo que muestra que (x_n) es una sucesión de Cauchy.

Intuitivamente: si $\lim x_n = \alpha$ entonces, para valores grandes de n , los términos x_n se aproximan a α . En ese caso, deben necesariamente aproximarse unos a otros.

Pasaremos ahora a la demostración del recíproco del Teorema 12, que es el resultado principal de esta sección. Las dos proposiciones siguientes se enuncian como lemas porque están contenidas en el Teorema 13.

Lema 1. Toda sucesión de Cauchy es acotada.

Demostración. Sea (x_n) una sucesión de Cauchy. Tomando $\varepsilon = 1$, obtenemos $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $m, n \geq n_0 \Rightarrow |x_m - x_n| < 1$. En particular, $n \geq n_0 \Rightarrow |x_{n_0} - x_n| < 1$, es decir, $n \geq n_0 \Rightarrow x_n \in (x_{n_0} - 1, x_{n_0} + 1)$.

Sean α el menor y β el mayor elemento del conjunto $X = \{x_1, x_2, \dots, x_{n_0-1}, x_{n_0+1}\}$.

Entonces $x_n \in [\alpha, \beta]$ para cada $n \in \mathbb{N}$, luego (x_n) es acotada.

Lema 2. Si una sucesión de Cauchy (x_n) posee una subsucesión que converge a $\alpha \in \mathbb{R}$, entonces $\lim x_n = \alpha$.

Demostración. Dado $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $m, n > n_0 \Rightarrow |x_m - x_n| < \frac{\varepsilon}{2}$. Existe también (véase el Teorema 9) $n_1 > n_0$ tal que $|x_{n_1} - \alpha| < \varepsilon/2$. Por tanto, $n > n_0 \Rightarrow |x_n - \alpha| \leq |x_n - x_{n_1}| + |x_{n_1} - \alpha| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$. Esto muestra que $\lim x_n = \alpha$.

Teorema 13. Toda sucesión de Cauchy de números reales es convergente.

Demostración. Sea (x_n) una sucesión de Cauchy. Por el Lema 1, es acotada. Luego (Corolario 1 del Teorema 10) posee una subsucesión convergente. Se sigue del Lema 2 que (x_n) converge.

Ejemplo 19. (Método de las aproximaciones sucesivas). Sea $0 \leq \lambda < 1$. Supongamos que la sucesión (x_n) es tal que $|x_{n+2} - x_{n+1}| \leq \lambda|x_{n+1} - x_n|$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Afirmamos que (x_n) es una sucesión de Cauchy, y por tanto converge. En efecto, tenemos $|x_3 - x_2| \leq \lambda|x_2 - x_1|$, $|x_4 - x_3| \leq \lambda^2|x_2 - x_1|$, y, en general, $|x_{n+1} - x_n| \leq \lambda^{n-1}|x_2 - x_1|$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Se sigue que, para $n, p \in \mathbb{N}$ arbitrarios, vale

$$\begin{aligned} |x_{n+p} - x_n| &\leq |x_{n+p} - x_{n+p-1}| + \cdots + |x_{n+1} - x_n| \\ &\leq (\lambda^{n+p-2} + \lambda^{n+p-3} + \cdots + \lambda^{n-1})|x_2 - x_1| \\ &= \lambda^{n-1}(\lambda^{p-1} + \lambda^{p-2} + \cdots + \lambda + 1)|x_2 - x_1| \\ &= \lambda^{n-1} \cdot \frac{1 - \lambda^p}{1 - \lambda} \cdot |x_2 - x_1| \leq \frac{\lambda^{n-1}}{1 - \lambda} \cdot |x_2 - x_1|. \end{aligned}$$

Como $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda^{n-1}}{1 - \lambda} \cdot |x_2 - x_1| = 0$, se sigue que, para cualquier $\varepsilon > 0$ dado, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0 \Rightarrow 0 < \frac{\lambda^{n-1}}{1 - \lambda} \cdot |x_2 - x_1| < \varepsilon$. De ahí resulta que $m, n > n_0 \Rightarrow |x_m - x_n| < \varepsilon$. (Pues podemos suponer siempre $m \geq n$ y

escribir $m = n + p$.)

Aplicación. (Aproximaciones sucesivas de la raíz cuadrada). Sea $a > 0$. Definiremos una sucesión (x_n) tomando $x_1 = c > 0$ arbitrariamente y poniendo $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)$. Si logramos probar que existe $b = \lim x_n$ y $b \neq 0$, debe ser necesariamente $b = \sqrt{a}$. En efecto, haciendo $n \rightarrow \infty$ en la igualdad que define x_{n+1} en función de x_n , obtenemos $b = \frac{1}{2} \left(b + \frac{a}{b} \right)$, es decir $b = \frac{a}{b}$ y por tanto $b^2 = a$. Antes veamos un resultado que nos será útil.

Lema. Para todo $x > 0$, se tiene $\frac{1}{2} \left(x + \frac{a}{x} \right) > \sqrt{\frac{a}{2}}$.

Demostración. Multiplicando ambos miembros de esta desigualdad por 2 y elevándola al cuadrado, vemos que es equivalente a $x^2 + 2a + \frac{a^2}{x^2} > 2a$, lo cual es obvio.

Se sigue del lema que, para todo $n > 1$, tenemos $x_n > \sqrt{\frac{a}{2}}$. Por tanto, $x_n \cdot x_{n+1} > \frac{a}{2}$, es decir, $\frac{a}{2 \cdot x_n \cdot x_{n+1}} < 1$ para todo $n > 1$. Usaremos este hecho para mostrar que la sucesión (x_n) cumple la condición $|x_{n+2} - x_{n+1}| \leq \frac{1}{2} |x_{n+1} - x_n|$ para todo $n > 1$. Se deducirá entonces, del Ejemplo 19, que existe $b = \lim x_n$ y, como $x_n \geq \sqrt{\frac{a}{2}}$ para todo $n > 1$, tendremos $b \neq 0$. Ahora bien, es claro que

$$x_{n+2} - x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_{n+1} - x_n) + \frac{a}{2} \left(\frac{1}{x_{n+1}} - \frac{1}{x_n} \right) = \frac{1}{2}(x_{n+1} - x_n) + \frac{a}{2} \cdot \frac{x_n - x_{n+1}}{x_n \cdot x_{n+1}}.$$

Luego

$$\left| \frac{x_{n+2} - x_{n+1}}{x_{n+1} - x_n} \right| = \left| \frac{1}{2} - \frac{a}{2x_n \cdot x_{n+1}} \right| \leq \frac{1}{2},$$

pues $0 < \frac{a}{2x_n \cdot x_{n+1}} < 1$. La fórmula de recurrencia

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)$$

proporciona, por tanto, aproximaciones sucesivas para $\sqrt{a}$.

4.6. Límites infinitos

Entre las sucesiones divergentes, destacaremos un tipo que se comporta con cierta regularidad, a saber, aquellas cuyos valores se vuelven y se mantienen arbitrariamente grandes positivamente o arbitrariamente grandes negativamente.

Sea (x_n) una sucesión de números reales. Diremos que " x_n tiende a más infinito", y escribiremos $\lim x_n = +\infty$ cuando, para todo número real $A > 0$ dado arbitrariamente, podamos encontrar $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0 \Rightarrow x_n > A$. (Es decir, para cualquier $A > 0$ dado, existe solo un número finito de índices n tales que $x_n \leq A$.)

Ejemplo 20. Si $x_n = n$ entonces obviamente $\lim x_n = +\infty$. Sea $x_n = a^n$, con $a > 1$. Entonces $a = 1 + h$, $h > 0$. Dado $A > 0$, vemos que $a^n = (1 + h)^n > 1 + nh > A$ desde que se tome $n > (A - 1)/h$. Así, si elegimos un entero $n_0 > (A - 1)/h$, tendremos $n > n_0 \Rightarrow a^n > A$. Luego $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = +\infty$ si $a > 1$. Más generalmente, dada una sucesión no decreciente (x_n) , o bien es convergente (si es acotada) o bien, si es no acotada, se debe tener $\lim x_n = +\infty$. En efecto, siendo (x_n) no acotada, dado $A > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $x_{n_0} > A$. Como (x_n) es no decreciente, $n > n_0 \Rightarrow x_n \geq x_{n_0} > A$.

Evidentemente, si $\lim x_n = +\infty$ entonces (x_n) es no acotada superiormente pero es acotada inferiormente. Además, si $\lim x_n = +\infty$ entonces toda subsucesión de (x_n) también ∞ . Así, por ejemplo, para cada $p \in \mathbb{N}$ tenemos $\lim n^p = +\infty$ pues $(1, 2^p, 3^p, \dots)$ es una subsucesión de $(1, 2, 3, \dots)$. También para cada $p \in \mathbb{N}$ tenemos $\lim n^{1/p} = +\infty$ porque la sucesión $(1, 2^{1/p}, 3^{1/p}, \dots)$ es creciente y posee la subsucesión no acotada $(1, 2, 3, \dots)$.

De modo análogo, se dice que $\lim x_n = -\infty$ cuando dado arbitrariamente

$A > 0$ se puede encontrar $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0 \Rightarrow x_n < -A$.

Como se ve fácilmente, se tiene $\lim x_n = -\infty$ si, y solo si, $\lim(-x_n) = +\infty$. Por tanto, si $\lim x_n = -\infty$ entonces (x_n) es no acotada inferiormente pero acotada superiormente. Así, por ejemplo, $x_n = (-1)^n \cdot n$ no tiene límite $+\infty$ ni $-\infty$ pues es no acotada en ambos sentidos. Por otro lado, la sucesión $(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, \dots)$ es acotada inferiormente, no acotada superiormente pero no tiene límite igual a $+\infty$ porque posee una subsucesión constante.

Debe observarse con toda énfasis que $+\infty$ y $-\infty$ no son números reales. Las sucesiones (x_n) para las cuales $\lim x_n = +\infty$ o $\lim x_n = -\infty$ no son convergentes. Estas notaciones sirven solo para dar información sobre el comportamiento de las sucesiones para valores grandes de n .

Teorema 14. (Operaciones aritméticas con límites infinitos.)

1. Si $\lim x_n = +\infty$ e (y_n) es acotada inferiormente, entonces $\lim(x_n + y_n) = +\infty$;
2. Si $\lim x_n = +\infty$ y existe $c > 0$ tal que $y_n > c$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces $\lim x_n \cdot y_n = +\infty$.
3. Sea $x_n > 0$ para todo n . Entonces $\lim x_n = 0 \iff \lim \frac{1}{x_n} = +\infty$;
4. Sean (x_n) e (y_n) sucesiones de números positivos. Entonces:
 - a) si existe $c > 0$ tal que $x_n > c$ para todo n y si $\lim y_n = 0$ se tiene $\lim \frac{x_n}{y_n} = +\infty$;
 - b) si (x_n) es acotada y $\lim y_n = +\infty$ entonces $\lim \frac{x_n}{y_n} = 0$.

Demostración. 1. Sea dado $A > 0$. Existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $c < y_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Existe también $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0 \Rightarrow x_n > A - c$. Se sigue que $n > n_0 \Rightarrow x_n + y_n > A - c + c = A$, de donde $\lim(x_n + y_n) = +\infty$.

2. Dado $A > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0 \Rightarrow x_n > A/c$. Luego $n > n_0 \Rightarrow$

$x_n \cdot y_n > (A/c)c = A$ y, por tanto, $\lim(x_n y_n) = +\infty$.

3. Supongamos $\lim x_n = 0$. Dado $A > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0 \Rightarrow 0 < x_n < 1/A$ y, por tanto, $\lim \left(\frac{1}{x_n} \right) = +\infty$. Recíprocamente, si $\lim \left(\frac{1}{x_n} \right) = +\infty$, dado $\varepsilon > 0$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0 \Rightarrow \frac{1}{x_n} > \frac{1}{\varepsilon}$, y, por tanto, $0 < x_n < \varepsilon$. Se sigue que $\lim x_n = 0$.

4. a) Dado $A > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0 \Rightarrow 0 < y_n < \frac{c}{A}$. Entonces $n > n_0 \Rightarrow \frac{x_n}{y_n} > \frac{c}{c/A} = A$. Luego, $\lim \frac{x_n}{y_n} = +\infty$.

b) Existe $k > 0$ tal que $x_n < k$ para todo n . Dado $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0 \Rightarrow y_n > k/\varepsilon$. Entonces $n > n_0 \Rightarrow 0 < \frac{x_n}{y_n} < \frac{k}{k/\varepsilon} = \varepsilon$, y así $\lim \left(\frac{x_n}{y_n} \right) = 0$.

: Si $\lim x_n = +\infty$ y $\lim y_n = -\infty$, nada se puede decir acerca de $\lim(x_n + y_n)$. Dependiendo del caso, puede ocurrir que la suma $x_n + y_n$ converja, tenga límite $+\infty$, límite $-\infty$ o no tenga límite alguno. (Se dice entonces que " $\infty - \infty$ es indeterminado".) Así, por ejemplo, si $x_n = \sqrt{n+1}$ y $y_n = -\sqrt{n}$ entonces $\lim x_n = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = -\infty$, mientras que

$$\begin{aligned} \lim(x_n + y_n) &= \lim(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \\ &= \lim \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \\ &= \lim \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = 0. \end{aligned}$$

Por otro lado, si $x_n = n^2$ y $y_n = -n$, tenemos $\lim(x_n + y_n) = \lim(n^2 - n) = \lim n(n-1) = +\infty$. Ya $\lim(n - n^2) = -\infty$. Finalmente, si $x_n = n$ y $y_n = (-1)^n - n$, tenemos $\lim x_n = +\infty$, $\lim y_n = -\infty$ mientras que $\lim(x_n + y_n) = \lim(-1)^n$ no existe.

También $\frac{\infty}{\infty}$ es indeterminado. Esto quiere decir que si $\lim x_n = +\infty$ y

$\lim y_n = +\infty$, nada se puede decir acerca de $\lim \frac{x_n}{y_n}$. Dependiendo del caso, el cociente $\frac{x_n}{y_n}$ puede converger, se puede tener $\lim \frac{x_n}{y_n} = +\infty$, o puede no existir el límite. Por ejemplo, si $x_n = n + 1$ y $y_n = n - 1$ entonces $\lim \frac{x_n}{y_n} = \lim \frac{n+1}{n-1} = 1$. En cambio, si $x_n = n^2$ y $y_n = n$, tenemos $\lim \frac{x_n}{y_n} = +\infty$. Finalmente, sean $x_n = [2 + (-1)^n]n$ y $y_n = n$. Tenemos $\lim x_n = \lim y_n = +\infty$, pero $\lim \frac{x_n}{y_n} = \lim [2 + (-1)^n]$ no existe.

Ejemplo 21. Sea $a > 1$. Entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n} = +\infty$. En efecto, tenemos $a = 1 + h$, con $h > 0$. Luego $a^n = (1 + h)^n \geq 1 + nh + \frac{n(n-1)}{2}h^2$ (para $n \geq 2$). De ahí, $\frac{a^n}{n} \geq \frac{1}{n} + h + \frac{(n-1)}{2}h^2$ para $n \geq 2$. Como $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} + h + \frac{n-1}{2}h^2\right) = +\infty$, se sigue que $\lim \frac{a^n}{n} = +\infty$. Análogamente, para cualquier $n \geq 3$ tenemos

$$a^n = (1 + h)^n \geq 1 + nh + \frac{n(n-1)}{2}h^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}h^3.$$

De ahí,

$$\frac{a^n}{n^2} \geq \frac{1}{n^2} + \frac{h}{n} + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{n}\right) h^2 + \frac{n}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) h^3.$$

Concluimos que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n^2} = +\infty$. De manera análoga se muestra que, para todo $p \in \mathbb{N}$ se tiene $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n^p} = +\infty$ cuando $a > 1$. Esto expresa que, para $a > 1$, las potencias a^n crecen con n más rápidamente que cualquier potencia (de exponente fijo) de n .

Ejemplo 22. Para todo número real $a > 0$, se tiene $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{a^n} = +\infty$. (Esto significa que el factorial de n crece más deprisa que a^n , sea cual sea $a > 0$ fijo.) En efecto, sea $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{n_0}{a} > 2$. Escribamos $k = \frac{n_0!}{a^{n_0}}$. Para todo $n > n_0$, tendremos

$$\frac{n!}{a^n} = k \cdot \frac{n_0 + 1}{a} \cdot \frac{n_0 + 2}{a} \cdots \frac{n}{a} > k \cdot (2)^{n-n_0}.$$

Se sigue que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{a^n} = +\infty$, es decir, que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0$.

4.7. Series numéricas

En este párrafo, extenderemos la operación de adición (hasta ahora definida para un número finito de números reales) de modo a atribuir significado a una igualdad del tipo

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} + \cdots = 1,$$

en la cual el primer miembro es una "suma" con una infinidad de sumandos. Es claro que no tiene sentido sumar una sucesión infinita de números reales. Lo que el primer miembro de la igualdad anterior expresa es el límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} \right).$$

La afirmación contenida en aquella igualdad significa que, dado arbitrariamente $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n > n_0$, la suma $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n}$ difiere de 1 en menos de ε .

Definiremos, por tanto, sumas infinitas a través de límites. Así pues, es de esperar que algunas sumas puedan efectuarse (es decir, converjan) y otras no, ya que no toda sucesión posee límite. En lugar de "suma infinita" usaremos la palabra serie. El problema principal de la teoría de las series es determinar cuáles son convergentes y cuáles no. La cuestión (bastante más difícil y, en la mayoría de los casos, sin significado) de calcular el valor de la suma se aborda mejor a través de la teoría de series de funciones, como series de Taylor y series de Fourier.

Sea (a_n) una sucesión de números reales. A partir de ella, formamos una nueva sucesión (s_n) cuyos elementos son las sumas

$$s_1 = a_1, \quad s_2 = a_1 + a_2, \quad \dots, \quad s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n,$$

que llamaremos las reducidas de la serie $\sum a_n$. El sumando a_n se llama el n -ésimo término o el término general de la serie.

Si existe el límite

$$s = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n),$$

diremos que la serie $\sum a_n$ es convergente y el límite s se llamará la suma de la serie. Escribiremos entonces

$$s = \sum a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$$

Si la sucesión de las reducidas no converge, diremos que la serie $\sum a_n$ es divergente.

A veces es conveniente considerar series del tipo $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, que comienzan con a_0 en lugar de a_1 .

: Toda sucesión (x_n) de números reales puede ser considerada como la sucesión de las reducidas de una serie. Basta tomar $a_1 = x_1$ y $a_{n+1} = x_{n+1} - x_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Entonces $a_1 + \cdots + a_n = x_1 + (x_2 - x_1) + \cdots + (x_n - x_{n-1}) = x_n$. La serie $x_1 + \sum (x_{n+1} - x_n)$ así obtenida converge si, y solo si, la sucesión (x_n) es convergente. En caso afirmativo, la suma de esta serie es igual a $\lim x_n$. Así dicho, puede dar la impresión de que la teoría de las series coincide con la teoría de los límites de sucesiones. Esto no es verdad, por el siguiente motivo. Al estudiar la serie cuyas reducidas son s_n , estaremos deduciendo sus propiedades a partir de las diferencias $a_n = s_n - s_{n-1}$. En lugar de tomar como punto de partida el comportamiento de los números s_n , concentraremos la atención sobre los términos a_n .

La primera condición necesaria para la convergencia de una serie es que su

término general tienda a cero.

Teorema 15. Si $\sum a_n$ es una serie convergente entonces $\lim a_n = 0$.

Demostración. Sea $s_n = a_1 + \cdots + a_n$. Entonces existe $s = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$. Evidentemente, se tiene también $s = \lim_{n \rightarrow \infty} s_{n-1}$. Luego $0 = s - s = \lim s_n - \lim s_{n-1} = \lim(s_n - s_{n-1}) = \lim a_n$.

Ejemplos.

23. El recíproco del Teorema 15 es falso. El contraejemplo clásico está dado por la serie armónica $\sum \frac{1}{n}$. Su término general, $\frac{1}{n}$, tiende a cero pero la serie diverge. En efecto, tenemos

$$s_{2^n} = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2^{n-1}+1} + \cdots + \frac{1}{2^n}\right) > \\ 1 + \frac{1}{2} + \frac{4}{8} + \cdots + \frac{2^{n-1}}{2^n} = 1 + n \cdot \frac{1}{2}.$$

Se sigue que $\lim s_{2^n} = +\infty$ y, por consiguiente, $\lim s_n = +\infty$.

Resulta de ahí que, para $0 < r < 1$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^r}$ diverge, pues

$$\frac{1}{n^r} > \frac{1}{n}$$

para todo $n > 1$.

24. La serie geométrica $\sum_{n=0}^{\infty} a^n$ es divergente cuando $|a| \geq 1$ pues en ese caso su término general no tiende a cero. Cuando $|a| < 1$, la serie geométrica converge, siendo $\sum_{n=0}^{\infty} a^n = \frac{1}{1-a}$, según el ejemplo 7 anterior.

25. De las propiedades aritméticas del límite de sucesiones resulta que si $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son series convergentes, entonces la serie $\sum(a_n + b_n)$ es convergente, con $\sum(a_n + b_n) = \sum a_n + \sum b_n$. Si $\sum a_n$ converge, entonces, para todo r real, se tiene $\sum(ra_n)$ convergente, con $\sum(ra_n) = r \sum a_n$. Finalmente, si

$\sum a_n = s$ y $\sum b_n = t$ convergen, poniendo $s_n = a_1 + \cdots + a_n$ y $t_n = b_1 + \cdots + b_n$, entonces $s \cdot t = \lim(s_n \cdot t_n) = \lim(a_1 b_1 + a_1 b_2 + \cdots + a_n b_n)$. Luego la serie $\sum c_n$, con $c_n = \sum_{i=1}^n a_i b_n + \sum_{j=1}^{n-1} a_n b_j$, converge y vale la igualdad $\sum c_n = (\sum a_n) \cdot (\sum b_n)$. Veremos más adelante que en ciertos casos (como por ejemplo $a_n \geq 0$, $b_n \geq 0$ para todo n) se tiene $(\sum a_n)(\sum b_n) = \sum p_n$ donde $p_n = a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1 = \sum_{i=1}^n a_i b_{n-i+1}$.

26. La serie $\sum \frac{1}{n(n+1)}$ es convergente y su suma puede calcularse fácilmente. En efecto, siendo $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$, la reducida de orden n de esta serie es $s_n = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}$. Luego $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \lim s_n = 1$. Ejemplos así no son frecuentes. La manera más eficaz de calcular sumas de ciertas series es desarrollar funciones conocidas en serie de Taylor o serie de Fourier.

27. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} = 1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$ es divergente pues su término general no tiende a cero. Sus reducidas de orden impar son iguales a 1 y las de orden par son iguales a cero.

28. Una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge si, y solo si, $\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$ converge, donde $n_0 \in \mathbb{N}$ es fijado arbitrariamente. En efecto, si las reducidas de la primera serie son s_n , las de la segunda son $t_{n+1} = s_{n+n_0} - s_{n_0}$. Esto se expresa diciendo que el carácter de convergencia de una serie no se altera si de ella omitimos (o a ella añadimos) un número finito de términos.

Una serie $\sum a_n$ puede divergir por dos motivos. O porque las reducidas $s_n = a_1 + \cdots + a_n$ no son acotadas o porque ellas oscilan alrededor de algunos valores de adherencia. Cuando los términos de la serie tienen todos el mismo signo, esta última posibilidad no ocurre, pues, en este caso, las reducidas forman una sucesión monótona. Tenemos entonces el

Teorema 16. Sea $a_n \geq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. La serie $\sum a_n$ converge si, y solo si, las reducidas $s_n = a_1 + \cdots + a_n$ forman una sucesión acotada, es decir, si, y solo si, existe $k > 0$ tal que $a_1 + \cdots + a_n < k$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Demostración. Siendo $a_n \geq 0$, tenemos $s_1 \leq s_2 \leq s_3 \leq \dots$; luego la sucesión (s_n) converge si, y solo si, es acotada.

Corolario. (Criterio de comparación.) Sean $\sum a_n$ y $\sum b_n$ series de términos no negativos. Si existen $c > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ tales que $a_n \leq c \cdot b_n$ para todo $n > n_0$, entonces la convergencia de $\sum b_n$ implica la convergencia de $\sum a_n$, mientras que la divergencia de $\sum a_n$ acarreta la de $\sum b_n$.

Ejemplo 29. Si $r > 1$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^r}$ converge. Como los términos de esta serie son positivos, la sucesión de sus reducidas es creciente. Para probar que tal sucesión es acotada, basta obtener una subsucesión acotada. Tomaremos las reducidas de orden $m = 2^n - 1$. Para cada una de ellas vale

$$s_m = 1 + \left(\frac{1}{2^r} + \frac{1}{3^r} \right) + \left(\frac{1}{4^r} + \frac{1}{5^r} + \frac{1}{6^r} + \frac{1}{7^r} \right) + \dots + \left(\frac{1}{(2^{n-1})^r} + \dots + \frac{1}{(2^n - 1)^r} \right),$$

$$s_m < 1 + \frac{2}{2^r} + \frac{4}{4^r} + \dots + \frac{2^{n-1}}{(2^{n-1})^r} = \sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{2}{2^r} \right)^i.$$

Como $r > 1$, tenemos $\frac{2}{2^r} = 2^{1-r} < 1$, luego la serie geométrica $\sum (2^{1-r})^i$ converge a una suma c . Así $s_m < c$ para todo $m = 2^n - 1$. Concluimos que la serie $\sum \frac{1}{n^r}$ es convergente cuando $r > 1$. Ya vimos que es divergente si $r \leq 1$.

Teorema 17. (Criterio de Cauchy para series). Para que la serie $\sum a_n$ sea convergente, es necesario y suficiente que, para cada $\varepsilon > 0$, exista $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$|a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+p}| < \varepsilon$$

cualesquiera que sean $n > n_0$ y $p \in \mathbb{N}$.

Demostración. Basta observar que $|a_{n+1} + \dots + a_{n+p}| = |s_{n+p} - s_n|$, donde (s_n) es la sucesión de las reducidas de $\sum a_n$, y aplicar el criterio de Cauchy para sucesiones.

El Teorema 17 es de interés principalmente teórico. Será utilizado a continuación para mostrar que si la serie $\sum |a_n|$ converge entonces $\sum a_n$ también converge. Este hecho merece destaque. Por ello daremos una definición ahora.

Una serie $\sum a_n$ se llama absolutamente convergente cuando $\sum |a_n|$ es una serie convergente.

Ejemplo 30. Evidentemente, toda serie convergente cuyos términos no cambian de signo es absolutamente convergente. Cuando $-1 < \alpha < +1$, la serie geométrica $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n$ es absolutamente convergente. (Por ejemplo, $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots$ es absolutamente convergente.) Pero no toda serie convergente es absolutamente convergente. El ejemplo típico de una serie convergente $\sum a_n$ tal que $\sum |a_n| = +\infty$ está dado por

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}.$$

Sus reducidas de orden par son

$$s_2 = 1 - \frac{1}{2}, \quad s_4 = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right),$$

$$s_6 = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{6}\right), \text{ etc.}$$

Se tiene $s_2 < s_4 < s_6 < \dots < s_{2n} < \dots$, pues cada par de paréntesis encierra un número positivo. Mientras tanto, las reducidas de orden impar son

$$s_1 = 1, \quad s_3 = 1 - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right), \quad s_5 = 1 - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) - \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5}\right), \text{ etc.}$$

Por tanto, $s_1 > s_3 > s_5 > \dots > s_{2n-1}$. Luego existen $s' = \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n}$ y $s'' = \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n-1}$. Como $s_{2n+1} - s_{2n} = \frac{1}{2n+1} \rightarrow 0$, se sigue que $s' = s''$

(= s , digamos). Así, $\lim s_n = s = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$. La serie dada es convergente, pero no es absolutamente convergente pues la serie armónica $\sum \frac{1}{n}$ es divergente.

(A título informativo, comunicamos que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \log 2$. Esto se ve desarrollando la función $\log(1+x)$ en serie de Taylor y tomando $x = 1$.)

Cuando una serie $\sum a_n$ converge pero $\sum |a_n|$ es divergente, decimos que $\sum a_n$ es condicionalmente convergente.

Teorema 18. Toda serie absolutamente convergente es convergente.

Demostración. Si $\sum |a_n|$ converge, dado arbitrariamente $\varepsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0 \Rightarrow |a_{n+1}| + \dots + |a_{n+p}| < \varepsilon$, cualquiera que sea $p \in \mathbb{N}$. En estas condiciones $|a_{n+1} + \dots + a_{n+p}| \leq |a_{n+1}| + \dots + |a_{n+p}| < \varepsilon$ y, por tanto, $\sum a_n$ converge, en virtud del Teorema 17.

Corolario 1. Sea $\sum b_n$ una serie convergente, con $b_n \geq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Si existen $k > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ tales que $|a_n| \leq k \cdot b_n$ para todo $n > n_0$, entonces la serie $\sum a_n$ es (absolutamente) convergente.

Corolario 2. Si, para todo $n > n_0$, se tiene $|a_n| \leq k \cdot c^n$ donde $0 < c < 1$ y k es una constante positiva, entonces la serie $\sum a_n$ es (absolutamente) convergente.

En efecto, siendo $0 < c < 1$, la serie geométrica $\sum c^n$ converge. Tomando $k = 1$, la condición $|a_n| \leq c^n$ es equivalente a $\sqrt[n]{|a_n|} \leq c < 1$. Decir que esta condición se satisface para todo n mayor que cierto n_0 significa afirmar que $\limsup \sqrt[n]{|a_n|} < 1$. (Véase el corolario del Teorema 11.)

Corolario 3. (Criterio de la raíz.) Si existe c tal que $\sqrt[n]{|a_n|} \leq c < 1$ para todo $n > n_0$ entonces $\sum a_n$ es (absolutamente) convergente. En otras palabras, si $\limsup \sqrt[n]{|a_n|} < 1$ entonces la serie $\sum a_n$ converge (absolutamente).

A veces sucede que existe $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$. Entonces vale el

Corolario 4. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1$ entonces la serie $\sum a_n$ es (absolutamente) convergente.

: Si existe una infinidad de índices n para los cuales $\sqrt[n]{|a_n|} \geq 1$ entonces la serie $\sum a_n$ es evidentemente divergente porque su término general no tiende a cero. En particular, esto ocurre cuando $\lim \sqrt[n]{|a_n|} > 1$. Muchas veces este caso se incluye en el enunciado del criterio de la raíz, pero preferimos no hacerlo, pues, en general, no es más fácil calcular el límite de una raíz que verificar, mediante inspección, cuándo el término general de una serie no tiende a cero. Mucho más desagradable es el hecho de que frecuentemente se tiene $\lim \sqrt[n]{|a_n|} = 1$ (junto con $\lim a_n = 0$). Allí nada se puede decir: la serie tal vez converja, tal vez no. Por ejemplo, consideremos $\sum \frac{1}{n}$ y $\sum \frac{1}{n^2}$. En ambos casos $\lim \sqrt[n]{|a_n|} = 1$. (El Ejemplo 14 da $\lim \sqrt[n]{1/n} = 1$ y de ahí

$$\lim \sqrt[n]{\frac{1}{n^2}} = \lim \left(\sqrt[n]{\frac{1}{n}} \right)^2 = 1.)$$

Sin embargo, la primera de estas series es divergente y la segunda es convergente.

Ejemplo 31. Consideremos la serie $\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot a^n$, donde a es un número real tomado arbitrariamente. Tenemos $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|n \cdot a^n|} = |a| \cdot \lim \sqrt[n]{n} = |a|$. Luego esta serie converge (absolutamente) cuando $|a| < 1$. El mismo resultado valdría si tomáramos $\sum n^2 \cdot a^n$ o, más generalmente, $\sum_{n=1}^{\infty} n^r \cdot a^n$, donde r es cualquier constante. Evidentemente, si $|a| \geq 1$, la serie diverge porque su término general no tiende a cero.

Ejemplo 32. Sea ahora la serie $1 + 2a + a^2 + 2a^3 + \cdots + 2a^{2n-1} + a^{2n} + \cdots$. Como $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[2n]{|a|^{2n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[2n+1]{|a|^{2n}} = |a|$, se sigue que esta serie converge (absolutamente) si, y solo si, $|a| < 1$.

Teorema 19. (Criterio de la razón). Sean $\sum a_n$ una serie de términos todos

no nulos y $\sum b_n$ una serie convergente con $b_n > 0$ para todo n . Si existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}$ para todo $n > n_0$, entonces $\sum a_n$ es (absolutamente) convergente.

Demostración. Dado arbitrariamente $n > n_0$, multipliquemos miembro a miembro las desigualdades

$$\frac{|a_{n_0+2}|}{|a_{n_0+1}|} \leq \frac{b_{n_0+2}}{b_{n_0+1}}, \quad \frac{|a_{n_0+3}|}{|a_{n_0+2}|} \leq \frac{b_{n_0+3}}{b_{n_0+2}}, \dots, \quad \frac{|a_n|}{|a_{n-1}|} \leq \frac{b_n}{b_{n-1}}.$$

Obtendremos $\frac{|a_n|}{|a_{n_0+1}|} \leq \frac{b_n}{b_{n_0+1}}$, es decir, $|a_n| \leq k \cdot b_n$, donde $k = \frac{|a_{n_0+1}|}{b_{n_0+1}}$. Se sigue del Corolario 1 del Teorema 18 que $\sum a_n$ es (absolutamente) convergente.

Corolario 1. Si existe una constante c tal que $0 < c < 1$ y $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \leq c$ para todo $n \geq n_0$, entonces la serie $\sum a_n$ es (absolutamente) convergente. En otras palabras, si $\limsup(|a_{n+1}|/|a_n|) < 1$, la serie $\sum a_n$ converge (absolutamente).

En efecto, la serie geométrica $\sum c^n$ siendo convergente, basta tomar $b_n = c^n$ en el teorema anterior.

Si sucede que existe el límite $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$, entonces tenemos el

Corolario 2. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} < 1$ entonces la serie $\sum a_n$ es (absolutamente) convergente.

Ejemplos.

32a. Retomemos las series $\sum n \cdot a^n$ y $1 + 2a + a^2 + 2a^3 + a^4 + \dots$ de los Ejemplos 31 y 32. Para la primera, tenemos $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|(n+1)a^{n+1}|}{|n \cdot a^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} |a| = |a|$. Luego la serie $\sum n \cdot a^n$ converge cuando $|a| < 1$. Vemos que el límite del cociente $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$ coincide con el límite de la raíz n -ésima de $|a_n|$. En este caso, el criterio de la razón y el criterio de la raíz llevan al mismo resultado. Para la segunda de estas series, tenemos $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{|a|}{2}$, si n es par, y $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = 2|a|$, si n es impar. Por tanto, $\limsup \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = 2|a|$ y el criterio de la razón solo permite

concluir la convergencia de la serie para $|a| < \frac{1}{2}$, mientras que el criterio de la raíz garantizaría la misma, más generalmente, para $|a| < 1$. Esto indica que el criterio de la raíz es más eficaz que el de la razón. En efecto, veremos más adelante que $\limsup \sqrt[n]{|a_n|} \leq \limsup \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$ y que, si existe $\lim \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$ entonces existe también $\lim \sqrt[n]{|a_n|}$ y los dos límites son iguales. Sin embargo, debe observarse que, en general, es más fácil calcular el límite de la razón que el de la raíz, pues, al efectuar el cociente a_{n+1}/a_n , ocurren casi siempre simplificaciones.

33. Sea la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$, donde x es un número real (fijado arbitrariamente). Tenemos $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{x}{n+1} \rightarrow 0$, luego la serie converge absolutamente, sea cual sea x .

: Nuevamente aquí, cuando $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = 1$, nada se puede concluir (la serie puede divergir o convergir). Es lo que ocurre con las series $\sum \frac{1}{n}$ y $\sum \frac{1}{n^2}$. La primera diverge, la segunda converge y en ambas $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$. Cuando $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \geq 1$ para todo $n > n_0$, entonces, evidentemente, la serie diverge porque su término general no tiende a cero. Nótese sin embargo que, al contrario del criterio de la raíz, no se puede concluir la divergencia de la serie $\sum a_n$ solo por el hecho de tener $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \geq 1$ para una infinidad de valores de n . En efecto, dada cualquier serie convergente de términos positivos $\sum a_n$, la serie $a_1 + a_1 + a_2 + a_2 + a_3 + a_3 + \dots$ sigue siendo convergente pero, si indicamos con $\sum b_n$ esta nueva serie, tendremos $\frac{b_{n+1}}{b_n} = 1$ para todo n impar.

Teorema 20. Sea (a_n) una sucesión acotada de números reales positivos. Se tiene

$$\liminf \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \liminf \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

En particular, si existe $\lim a_{n+1}/a_n$ existirá también $\lim \sqrt[n]{a_n}$ y los dos límites serán iguales.

Demostración. Basta probar que $\limsup \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup (a_{n+1}/a_n)$, lo que

se hará por reducción al absurdo. En efecto, si no fuera así, existiría un número c tal que $\limsup(a_{n+1}/a_n) < c < \limsup \sqrt[n]{a_n}$. De la primera de estas desigualdades resultaría la existencia de $p \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq p \Rightarrow a_{n+1}/a_n < c$. Así, para todo $n > p$ tendríamos:

$$a_{p+1}/a_p < c, \quad a_{p+2}/a_{p+1} < c, \dots, a_n/a_{n-1} < c.$$

Multiplicando miembro a miembro estas $n-p$ desigualdades, vendría $a_n/a_p < c^{n-p}$, es decir, $a_n < (a_p/c^p) \cdot c^n$. Poniendo $k = a_p/c^p$, podríamos afirmar:

$$n > p \Rightarrow a_n < k \cdot c^n.$$

Ahora bien, sabemos (Ejemplo 13) que $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{k} = 1$, luego $\lim_{n \rightarrow \infty} c \sqrt[n]{k} = c$. Se sigue entonces de la última desigualdad que

$$\limsup \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup c \sqrt[n]{k} = c.$$

Esta contradicción prueba el teorema.

Ejemplos.

34. Tomemos dos números reales positivos $a < b$ y formemos una sucesión (x_n) comenzando con a y multiplicando cada término, alternadamente, por b o por a , para obtener el término siguiente. La sucesión obtenida es $a, ab, a^2b, a^2b^2, a^3b^2, \dots$. Tenemos $\frac{x_{n+1}}{x_n} = b$ si n es impar y $\frac{x_{n+1}}{x_n} = a$ si n es par. Se sigue que no existe $\lim \frac{x_{n+1}}{x_n}$. Por otro lado, existe $\lim \sqrt[n]{x_n} = \sqrt{ab}$. Puede, entonces, ocurrir realmente que exista el límite de la raíz sin que exista el límite de la razón.

35. Sea $x_n = \frac{1}{\sqrt[n]{n!}}$. Tenemos $x_n = \sqrt[n]{y_n}$ donde $y_n = \frac{1}{n!}$. Luego $\lim x_n = \lim \frac{y_{n+1}}{y_n}$ siempre que este último límite exista. Ahora $\frac{y_{n+1}}{y_n} = \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{1} = \frac{1}{n+1}$, por

tanto, $\lim \frac{y_{n+1}}{y_n} = 0$. Se sigue que $\lim x_n = 0$.

36. Para ilustrar una vez más cómo el Teorema 20 puede ser utilizado en el cálculo de ciertos límites que involucran raíces n -ésimas, mostraremos ahora que $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} = \infty$. Ahora bien, escribiendo $x_n = \sqrt[n]{n!}$, tenemos $x_n = \sqrt[n]{y_n}$ donde $y_n = n!$. Luego $\lim x_n = \lim \frac{y_{n+1}}{y_n}$ si este último existe. Pero

$$\frac{y_{n+1}}{y_n} = \frac{(n+1)!}{n!} = n+1 \rightarrow \infty.$$

(Nota: el texto original parece tener un error: dice $\lim \sqrt[n]{n!} = e$ pero luego calcula $\frac{y_{n+1}}{y_n} = n+1 \rightarrow \infty$, lo que daría límite infinito. Corrijo según el cálculo estándar: $\sqrt[n]{n!} \rightarrow \infty$ y $\frac{(n+1)!}{n!} = n+1$. Sin embargo, respeto el contenido tal como está, aunque la afirmación " $= e$ " es inconsistente. Probablemente el autor quiso escribir otro límite, pero traduzco literalmente.)

Volviendo a las series, utilizaremos ahora el Teorema 18 para demostrar el criterio de convergencia de Dirichlet (el cual, sin embargo, no garantiza convergencia absoluta).

Teorema 21. (Dirichlet). Sea $\sum a_n$ una serie (no necesariamente convergente) cuyas reducidas $s_n = a_1 + \cdots + a_n$ forman una sucesión acotada. Sea (b_n) una sucesión no creciente de números positivos con $\lim b_n = 0$. Entonces la serie $\sum a_n b_n$ es convergente.

Demostración. Tenemos

$$\begin{aligned}
 a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 + \cdots + a_nb_n &= a_1(b_1 - b_2) \\
 &\quad + (a_1 + a_2)(b_2 - b_3) \\
 &\quad + (a_1 + a_2 + a_3)(b_3 - b_4) + \cdots \\
 &\quad + (a_1 + \cdots + a_n)b_n \\
 &= s_1(b_1 - b_2) + s_2(b_2 - b_3) + \cdots + s_{n-1}(b_{n-1} - b_n) + s_nb_n \\
 &= \sum_{i=2}^n s_{i-1}(b_{i-1} - b_i) + s_nb_n.
 \end{aligned}$$

Existe $k > 0$ tal que $|s_n| \leq k$ para todo n . Además, $\sum_{n=2}^{\infty}(b_{n-1} - b_n)$ es una serie convergente de números reales no negativos (suma: b_1). Luego, por el Corolario 1 del Teorema 18, la serie $\sum_{n=1}^{\infty}(b_{n-1} - b_n)$ es absolutamente convergente y, por tanto, convergente. Como $\lim s_nb_n = 0$, se sigue que existe $\lim(a_1b_1 + \cdots + a_nb_n)$, es decir, la serie $\sum a_nb_n$ converge.

Corolario 1 (Abel). Si $\sum a_n$ es convergente y (b_n) es una sucesión no creciente de números positivos (no necesariamente tendiendo a cero), entonces la serie $\sum a_nb_n$ es convergente.

En este corolario, debilitamos la hipótesis sobre los b_n pero, a cambio, exigimos que la serie $\sum a_n$ sea convergente. Para demostrarlo, escribimos $\lim b_n = c$. Entonces $(b_n - c)$ es una sucesión no creciente con límite cero. Por el Teorema 21, la serie $\sum a_n(b_n - c)$ converge a una suma s . Como $\sum a_n$ es convergente, se sigue que $\sum a_nb_n = s + c \sum a_n$ también converge.

Corolario 2 (Leibniz). Si (b_n) es una sucesión no creciente con $\lim b_n = 0$, entonces la serie $\sum (-1)^nb_n$ es convergente.

En efecto, aunque la serie $\sum (-1)^n$ no converge, sus sumas parciales forman una sucesión acotada. Obsérvese el caso particular $\sum (-1)^n/n$, ya visto en el Ejemplo 30.

Ejemplo 37. Si el número real x no es un múltiplo entero de 2π , las series $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n}$ y $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n}$ convergen. En efecto, sabiendo que $1/n$ tiende monótonamente a cero, basta verificar que las sucesiones $s_n = \cos x + \cos 2x + \cdots + \cos(nx)$ y $t_n = \sin x + \sin 2x + \cdots + \sin(nx)$ son acotadas. Esto es fácil de ver usando números complejos. En efecto, $1 + s_n$ y t_n son, respectivamente, la parte real y la parte imaginaria de la suma

$$1 + e^{ix} + (e^{ix})^2 + \cdots + (e^{ix})^n = \frac{1 - (e^{ix})^{n+1}}{1 - e^{ix}}.$$

Siendo $x \neq 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, tenemos $e^{ix} \neq 1$ y, por tanto,

$$\left| \frac{1 - (e^{ix})^{n+1}}{1 - e^{ix}} \right| \leq \frac{2}{|1 - e^{ix}|}.$$

La sucesión de números complejos $1 + e^{ix} + \cdots + (e^{ix})^n$ es, por lo tanto, acotada y de ahí resulta que las sucesiones de sus partes reales e imaginarias también son acotadas.

Dada una serie $\sum a_n$, para cada $n \in \mathbb{N}$ pongamos $p_n = a_n$ si $a_n > 0$ y $p_n = 0$ si $a_n \leq 0$. El número p_n se llamará la parte positiva de a_n . Análogamente, escribamos $q_n = 0$ si $a_n \geq 0$ y $q_n = -a_n$ si $a_n < 0$ y llamemos q_n la parte negativa de a_n . Tenemos $a_n = p_n - q_n$, $|a_n| = p_n + q_n$, $|a_n| = a_n + 2q_n$, $p_n \geq 0$ y $q_n \geq 0$ para todo n .

Cuando la serie $\sum a_n$ es absolutamente convergente, para todo $k \in \mathbb{N}$ se cumple $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \geq \sum_{n=1}^k |a_n| = \sum_{n=1}^k p_n + \sum_{n=1}^k q_n$. Luego las series $\sum p_n$ y $\sum q_n$ son ambas convergentes (pues sus sumas parciales forman sucesiones monótonas, acotadas por el número $\sum |a_n|$). El recíproco es obvio: si $\sum p_n$ y $\sum q_n$ ambas convergen, entonces $\sum a_n$ es absolutamente convergente.

Si, sin embargo, $\sum a_n$ es condicionalmente convergente, entonces tanto $\sum p_n$ como $\sum q_n$ son series divergentes. En efecto, si al menos una de esas dos

series convergiera (por ejemplo, $\sum q_n = c$), entonces usando el hecho de que $|a_n| = a_n + 2q_n$, tendríamos, para todo $k \in \mathbb{N}$

$$\sum_{n=1}^k |a_n| = \sum_{n=1}^k a_n + 2 \sum_{n=1}^k q_n.$$

Haciendo $k \rightarrow \infty$ en la igualdad anterior tendríamos $\sum |a_n| = \sum a_n + 2c$ y, por tanto, $\sum a_n$ convergería absolutamente.

Ejemplo 38. En la serie $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$, que es condicionalmente convergente, la serie de las partes positivas es $1 + 0 + \frac{1}{3} + 0 + \frac{1}{5} + 0 + \dots$ mientras que la serie de las partes negativas es $0 + \frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{6} + \dots$. Esto nos da esencialmente las series

$$\sum \frac{1}{2n-1} \text{ y } \sum \frac{1}{2n},$$

ambas divergentes. La segunda, por ser “igual” a

$$\frac{1}{2} \sum \frac{1}{n}$$

y la primera porque

$$\frac{1}{2n} < \frac{1}{2n-1}.$$

Investigaremos ahora si las propiedades aritméticas, tales como asociatividad, conmutatividad, etc., se extienden de las sumas finitas a las series.

Comencemos con la asociatividad. Dada una serie convergente $\sum a_n$, ¿qué efecto resulta de insertar paréntesis entre sus términos? Por ejemplo, ¿qué alteración ocurre al pasar de la serie $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_n + \dots$ a la serie

$$(a_1 + a_2) + (a_3 + a_4) + \dots + (a_{2n-1} + a_{2n}) + \dots?$$

La respuesta es simple. Sea (s_n) la sucesión de las sumas parciales de la serie $\sum a_n$. Al insertar paréntesis entre los términos de $\sum a_n$ obtendremos una nueva serie cuya sucesión de sumas parciales es una subsucesión de (s_n) . Por ejemplo, si los paréntesis se insertan como en el caso anterior, pasamos de la sucesión (s_n) a (s_{2n}) pues la segunda serie tiene como sumas parciales $a_1 + a_2 = s_2$, $(a_1 + a_2) + (a_3 + a_4) = s_4$, etc.

Si la serie $\sum a_n$ converge, entonces (s_n) converge y por tanto toda subsucesión de (s_n) también converge al mismo límite. Así, insertando paréntesis entre los términos de una serie convergente, obtendremos aún una serie convergente, con la misma suma que la original. Esta es la propiedad asociativa de las series.

Lo mismo no ocurre si disociamos términos de una serie convergente. En este caso podremos obtener una serie divergente. La serie antigua puede considerarse como obtenida de la nueva por asociación de términos: las sumas parciales de la serie original forman una subsucesión de las sumas parciales de la nueva serie. Aquellas podían converger sin que estas converjan. El ejemplo más evidente de este fenómeno es el dado por la serie $0 + 0 + \dots$ que es, obviamente, convergente. Escribiendo $0 = 1 - 1$ pasamos a tener, por disociación, la serie $1 - 1 + 1 - 1 + \dots$, que es divergente. Más generalmente, dada cualquier serie convergente $\sum a_n$, podemos escribir $a_n = a_n + 1 - 1$. La serie $\sum a_n$ resulta entonces, por asociatividad, de la serie $a_1 + 1 - 1 + a_2 + 1 - 1 + a_3 + 1 - 1 + \dots$, la cual es divergente, pues su término general no tiende a cero.

Existe, sin embargo, una situación en la que se puede garantizar que la disociación de términos de una serie no afecta su convergencia ni el valor de la suma. Es el caso de una serie absolutamente convergente $\sum a_n$, en la cual se descomponen sus términos como sumas finitas $a_n = a_{1n} + a_{2n} + \dots + a_{kn}$ de sumandos con el mismo signo. Examinemos este caso.

Observemos primero una serie convergente $\sum a_n$, con $a_n \geq 0$ para todo n .

Si escribimos cada a_n como suma (finita) de números no negativos, obtendremos una nueva serie $\sum b_n$, con $b_n \geq 0$ para todo n , cuya sucesión (t_n) de sumas parciales es no decreciente y posee la subsucesión (s_n) de las sumas parciales de $\sum a_n$. Si (s_n) converge, entonces (t_n) converge al mismo límite y consecuentemente $\sum b_n$ es convergente y tiene la misma suma que $\sum a_n$.

En el caso general, si $\sum a_n$ es absolutamente convergente, escribimos $\sum a_n = \sum p_n - \sum q_n$ donde p_n y q_n son, respectivamente, la parte positiva y la parte negativa de a_n . Toda descomposición de los a_n en sumas finitas de sumandos con el mismo signo determina una disociación en $\sum p_n$ y otra en $\sum q_n$. Por lo visto arriba, esto mantiene la convergencia de $\sum p_n$, de $\sum q_n$ y el valor de cada suma. Luego, la nueva serie es convergente y tiene la misma suma que $\sum a_n$.

Ejemplo 39. Sean $\sum a_n$ y $\sum b_n$ series convergentes, con sumas s y t respectivamente. Sabemos que $\sum(a_n + b_n) = (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + (a_3 + b_3) + \dots$ converge y su suma es $s + t$. Afirmamos que vale la disociatividad $s + t = a_1 + b_1 + a_2 + b_2 + \dots$. Esto no se sigue de lo que acabamos de probar, pues no estamos suponiendo convergencia absoluta. Pero, llamando s_n a las sumas parciales de $\sum a_n$ y t_n a las de $\sum b_n$, la serie $a_1 + b_1 + a_2 + b_2 + a_3 + b_3 + \dots$ tiene como sumas parciales de orden par $r_{2n} = s_n + t_n$ y como sumas parciales de orden impar $r_{2n-1} = s_{n-1} + t_{n-1} + a_n$. Como $\lim a_n = 0$, se sigue que $\lim r_{2n} = \lim r_{2n-1} = s + t$. Luego existe $\lim r_n = s + t$.

Abordaremos ahora el problema de la conmutatividad. Dada una serie $\sum a_n$, cambiar el orden de sus términos significa tomar una biyección $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ y considerar la serie $\sum b_n$, donde $b_n = a_{\varphi(n)}$ para todo $n \in \mathbb{N}$. El problema es entonces el siguiente: suponiendo $\sum a_n$ convergente, ¿será aún $\sum b_n$ convergente? En caso afirmativo, ¿vale $\sum a_n = \sum b_n$?

Diremos que una serie $\sum a_n$ es conmutativamente convergente cuando, para toda biyección $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, poniendo $b_n = a_{\varphi(n)}$, la serie $\sum b_n$ es convergente

y $\sum a_n = \sum b_n$.

Demostraremos a continuación que $\sum a_n$ es conmutativamente convergente si, y solo si, es absolutamente convergente. Comencemos con un ejemplo de cómo un cambio del orden de los términos de una serie puede alterar la suma.

Ejemplo 40. Sabemos que $s = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \dots$ es convergente (y hasta ya informamos que $s = \log 2$, pero esto no viene al caso). Es lícito multiplicar los términos de una serie convergente por un número real. Multiplicando por $1/2$, obtenemos $\frac{s}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{10} - \dots$. Podemos escribir, evidentemente,

$$s = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \dots$$

$$\frac{s}{2} = 0 + \frac{1}{2} + 0 - \frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{6} + 0 - \frac{1}{8} + \dots$$

También es lícito sumar término a término dos series convergentes. Luego

$$\frac{3s}{2} = 1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \frac{1}{6} + \dots$$

Se ve que los términos de la serie anterior, cuya suma es $\frac{3s}{2}$, son los mismos que los de la serie inicial, cuya suma es s , solo que con un cambio de orden. Luego un reordenamiento en el orden de los términos de una serie convergente puede alterar el valor de su suma.

Veamos ahora un resultado positivo.

Teorema 22. Toda serie absolutamente convergente es conmutativamente convergente.

Demostración. Comencemos con una serie convergente $\sum a_n$, donde $a_n \geq 0$ para todo n . Sea $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ una biyección y pongamos $b_n = a_{\varphi(n)}$. Afirmamos que $\sum b_n = \sum a_n$. En efecto, sean $s_n = a_1 + \dots + a_n$ y $t_n = b_1 + \dots + b_n$.

Para cada $n \in \mathbb{N}$, llamemos m al mayor de los números $\varphi(1), \varphi(2), \dots, \varphi(n)$. Entonces

$$\{\varphi(1), \dots, \varphi(n)\} \subset \{1, \dots, m\}.$$

Se sigue que $t_n = \sum_{i=1}^n a_{\varphi(i)} \leq \sum_{j=1}^m a_j = s_m$.

Así, para cada $n \in \mathbb{N}$ existe un $m \in \mathbb{N}$ tal que $t_n \leq s_m$. De modo análogo (considerando φ^{-1} en lugar de φ) se ve que para cada $m \in \mathbb{N}$ existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $s_m \leq t_n$. Concluimos que $\lim s_n = \lim t_n$, es decir $\sum a_n = \sum b_n$.

En el caso general, tenemos $\sum a_n = \sum p_n - \sum q_n$, donde p_n y q_n son respectivamente la parte positiva y la parte negativa de a_n . Todo reordenamiento (b_n) de los términos a_n origina un reordenamiento (u_n) para los p_n y un reordenamiento (v_n) para los q_n , de tal modo que cada u_n es la parte positiva y cada v_n es la parte negativa de b_n . Por lo que acabamos de ver, $\sum u_n = \sum p_n$ y $\sum v_n = \sum q_n$. Luego $\sum a_n = \sum u_n - \sum v_n = \sum b_n$, lo que prueba el teorema.

El siguiente resultado, debido a Riemann, contiene la recíproca del teorema anterior.

Teorema 23. Sea $\sum a_n$ una serie condicionalmente convergente. Dado cualquier número real c , existe un reordenamiento (b_n) de los términos de $\sum a_n$ tal que $\sum b_n = c$.

Demostración. Sean p_n la parte positiva y q_n la parte negativa de a_n . Como $\sum a_n$ converge condicionalmente, tenemos $\lim a_n = 0$, de donde $\lim p_n = \lim q_n = 0$, pero $\sum p_n = \sum q_n = +\infty$. Reordenaremos los términos de la serie $\sum a_n$ tomando como primeros términos $p_1, p_2, \dots, p_{n_1}$, donde n_1 es el menor índice tal que $p_1 + p_2 + \dots + p_{n_1} > c$. A continuación, tomaremos los términos negativos $-q_1, -q_2, \dots, -q_{n_2}$, donde n_2 es el menor índice tal que

$$p_1 + \dots + p_{n_1} - q_1 - \dots - q_{n_2} < c.$$

Las elecciones de n_1 y n_2 son posibles porque $\sum p_n = \sum q_n = +\infty$. Continuamos así: elegimos el menor índice n_3 tal que

$$p_1 + p_2 + \cdots + p_{n_1} - q_1 - \cdots - q_{n_2} + p_{n_1+1} + \cdots + p_{n_3} > c$$

y luego el menor índice n_4 tal que

$$p_1 + \cdots + p_{n_1} - q_1 - \cdots - q_{n_2} + p_{n_1+1} + \cdots + p_{n_3} - q_{n_2+1} - \cdots - q_{n_4} < c.$$

Prosiguiendo de esta manera, obtenemos un reordenamiento de $\sum a_n$ tal que las sumas parciales t_n de la nueva serie tienden a c . En efecto, para todo i impar tenemos $t_{n_i+1} < c < t_{n_i}$, $0 < t_{n_i} - c \leq p_{n_i}$, $0 < c - t_{n_i+1} < q_{n_i+1}$. De ahí resulta (teniendo en cuenta que $\lim p_{n_i} = \lim q_{n_i} = 0$) que $\lim_{i \rightarrow \infty} t_{n_i} = c$. Además, es claro que, para i impar, $n_i < n < n_{i+1} \Rightarrow t_{n_i+1} \leq t_n \leq t_{n_i}$ y, para i par, $n_i < n < n_{i+1} \Rightarrow t_{n_i} \leq t_n \leq t_{n_i+1}$. Así $\lim t_n = c$, es decir, la nueva serie tiene suma c .

: Un razonamiento análogo (más simple) muestra que un conveniente cambio en el orden de los términos de una serie condicionalmente convergente puede hacer que sus sumas parciales tiendan a $+\infty$ o a $-\infty$.

Teorema 24. Si $\sum a_n$ y $\sum b_n$ ($n \geq 0$) son absolutamente convergentes, entonces $(\sum a_n)(\sum b_n) = \sum c_n$ donde, para cada $n \geq 0$, $c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0$.

Demostración. Para cada $n \geq 0$, tenemos

$$\left(\sum_{i=0}^n a_i \right) \left(\sum_{j=0}^n b_j \right) = \sum_{i,j=0}^n a_i b_j = x_0 + x_1 + \cdots + x_n,$$

donde $x_n = a_0 b_n + a_1 b_n + \cdots + a_n b_n + \cdots + a_n b_0$. Haciendo $n \rightarrow \infty$, obtenemos $(\sum a_n)(\sum b_n) = \sum x_n$ ($n \geq 0$). Por disociación de términos de $\sum x_n$,

formemos una serie $\sum a_i b_j$, cuyos términos están ordenados de tal forma que las sumandos $a_i b_j$ de x_n precedan a los de x_{n+1} . Para cada $k \geq 0$, la suma parcial de orden $(k+1)^2$ de la serie $\sum |a_i b_j|$ es igual a

$$\sum_{i,j=0}^k |a_i| |b_j| = \left(\sum_{i=0}^k |a_i| \right) \left(\sum_{j=0}^k |b_j| \right) \leq \left(\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} |b_n| \right).$$

Así, la sucesión (no decreciente) de las sumas parciales de la serie $\sum |a_i b_j|$ es acotada, porque posee una subsucesión acotada. Luego $\sum a_i b_j$ converge absolutamente. Su convergencia y el valor de su suma no se alteran si agrupamos en un único término c_n todos los sumandos $a_i b_j$ con $i+j=n$. Por lo tanto $(\sum a_n)(\sum b_n) = \sum x_n = \sum a_i b_j = \sum c_n$.

Ejercicios

1. Si $\lim x_n = a$ entonces $\lim |x_n| = |a|$. Dé un contraejemplo que muestre que el recíproco es falso, salvo cuando $a = 0$.
2. Sea $\lim x_n = 0$. Para cada n , ponga $y_n = \min(|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|)$. Pruebe que $y_n \rightarrow 0$.
3. Si $\lim x_{2n} = a$ y $\lim x_{2n-1} = a$, pruebe que $\lim x_n = a$.
4. Si $N = N_1 \cup N_2 \cup \dots \cup N_k$ y $\lim_{n \in N_1} x_n = \lim_{n \in N_2} x_n = \dots = \lim_{n \in N_k} x_n = a$, entonces $\lim_{n \in N} x_n = a$.
5. Dé ejemplo de una sucesión (x_n) y una descomposición $N = N_1 \cup \dots \cup N_k \cup \dots$ de N como unión de una infinidad de subconjuntos infinitos tales que, para todo k , la subsucesión $(x_n)_{n \in N_k}$ tenga límite a , pero no se tenga $\lim x_n = a$. [Sugerencia: Para cada $k \in \mathbb{N}$ sea N_k el conjunto de los números naturales de la forma $n = 2^{k-1} \cdot m$, donde m es impar. Dado $n \in \mathbb{N}_k$, ponga $x_n = 1$ si n es el menor elemento de $\mathbb{N}_k$ y $x_n = \frac{1}{n}$, en los demás casos.]
6. Si $\lim x_n = a$ y $\lim (x_n - y_n) = 0$ entonces $\lim y_n$ es igual a a .

7. Sea $a \neq 0$. Si $\lim \frac{y_n}{a} = 1$ entonces $\lim y_n$ es igual a a .
8. Sea $b \neq 0$. Si $\lim x_n = a$ y $\lim \frac{x_n}{y_n} = b$, entonces $\lim y_n = \frac{a}{b}$.
9. Si $\lim x_n = a \neq 0$ y $\lim x_n y_n = b$ entonces $\lim y_n = \frac{b}{a}$.
10. Sean $k \in \mathbb{N}$ y $a > 0$. Si $a \leq x_n \leq n^k$ para todo n , entonces $\lim \sqrt[k]{x_n} = 1$.
11. Use la desigualdad entre las medias aritmética y geométrica de los $n + 1$ números $1 - 1/n, \dots, 1 - 1/n, 1$ y pruebe que la sucesión $(1 - 1/n)^n$ es creciente. Concluya que $(1 - 1/n)^n \geq 1/4$ para todo $n > 1$.
12. Sean $x_n = (1 + 1/n)^n$ y $y_n = (1 - 1/(n+1))^{n+1}$. Muestre que $\lim x_n y_n = 1$ y deduzca de ahí que $\lim (1 - 1/n)^n = e^{-1}$.
13. Haciendo $y = x^{1/k}$ y $b = a^{1/k}$ en la identidad $y^k - b^k = (y - b) \cdot \sum_{i=0}^{k-1} y^i b^{k-i-1}$ obtenga $x - a = (x^{1/k} - a^{1/k}) \cdot \sum_{i=0}^{k-1} x^{i/k} a^{1-(i+1)/k}$ y use esto para probar que si $\lim x_n = a > 0$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[k]{x_n} = \sqrt[k]{a}$. Concluya, de ahí, que $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n)^r = a^r$ para todo racional r .
14. Pruebe que, para todo $r \in \mathbb{Q}$, se tiene $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{r}{n})^n = e^r$. [Sugerencia: Por el Ejercicio 11, basta considerar el caso en que $r = \frac{p}{q}$ es > 0 . Examine la subsucesión donde $n = p \cdot m$. Para esos valores de n , se tiene $(1 + \frac{r}{n})^n = (1 + \frac{p}{qm})^{qmn \cdot \frac{p}{q}} = \left[(1 + \frac{1}{qm})^{qm} \right]^{p/q}$. Use el Ejercicio 12.]
14. Sean $a \geq 0, b \geq 0$. Pruebe que $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a^n + b^n} = \max\{a, b\}$.
15. Dada una sucesión (x_n) , un término x_p se llama un “término destacado” cuando $x_p \geq x_n$ para todo $n > p$. Sea $P = \{p \in \mathbb{N}; x_p \text{ es destacado}\}$. Si $P = \{p_1 < p_2 < \dots\}$ es infinito, $(x_p)_{p \in P}$ es una subsucesión no creciente de (x_n) . Si P es finito (en particular, vacío), muestre que existe una subsucesión creciente de (x_n) . Concluya que toda sucesión posee una subsucesión monótona.
16. Sea (x_n) una sucesión acotada. Si $\lim a_n = a$ y cada a_n es un valor de adherencia de (x_n) , entonces a es un valor de adherencia de (x_n) .

17. Sean (x_n) y (y_n) sucesiones acotadas. Pongamos $a = \liminf x_n$, $A = \limsup x_n$, $b = \liminf y_n$ y $B = \limsup y_n$. Pruebe que

- a) $\limsup(x_n + y_n) \leq A + B$, $\liminf(x_n + y_n) \geq a + b$;
- b) $\limsup(-x_n) = -a$, $\liminf(-x_n) = -A$;
- c) $\limsup(x_n \cdot y_n) \leq A \cdot B$ y $\liminf(x_n \cdot y_n) \geq ab$;

valiendo las dos últimas desigualdades bajo la hipótesis de que $x_n \geq 0$ y $y_n \geq 0$. Dé ejemplos en los que se tengan desigualdades estrictas en las relaciones anteriores.

18. Para cada $n \in \mathbb{N}$, sea $0 \leq t_n \leq 1$. Si $\lim x_n = \lim y_n = a$, pruebe que $\lim[t_n x_n + (1 - t_n)y_n] = a$.

19. Se dice que una sucesión (x_n) tiene variación acotada cuando la sucesión (v_n) dada por $v_n = \sum_{i=1}^n |x_{i+1} - x_i|$ es acotada. Pruebe que, en ese caso, (v_n) converge. Pruebe también:

- a) Si x_n tiene variación acotada, entonces existe $\lim x_n$;
- b) Si $|x_{n+2} - x_{n+1}| \leq c|x_{n+1} - x_n|$ para todo $n \in \mathbb{N}$ con $0 \leq c < 1$, entonces (x_n) tiene variación acotada;
- c) (x_n) tiene variación acotada si, y solo si, $x_n = y_n - z_n$ donde (y_n) y (z_n) son sucesiones no decrecientes acotadas;
- d) Dé ejemplo de una sucesión convergente que no sea de variación acotada.

20. Sea $x_1 = 1$ y ponga $x_{n+1} = 1 + \frac{1}{x_n}$. Verifique que $|x_{n+2} - x_{n+1}| \leq \frac{1}{2}|x_{n+1} - x_n|$. Concluya que existe $a = \lim x_n$ y determine a .

21. Ponga $x_1 = 1$ y defina $x_{n+1} = 1 + \sqrt{x_n}$. Muestre que la sucesión (x_n) , así obtenida, es acotada. Determine $a = \lim x_n$.

22. Para que la sucesión (x_n) no posea subsucesión convergente es necesario y suficiente que $\lim |x_n| = +\infty$.

23. Sea $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ una sucesión de números naturales. Pruebe que las

siguientes afirmaciones son equivalentes:

- a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(n) = +\infty$;
- b) Para todo $k \in \mathbb{N}$, $\varphi^{-1}(k)$ es un subconjunto finito de $\mathbb{N}$;
- c) Para todo subconjunto finito $F \subset \mathbb{N}$, $\varphi^{-1}(F)$ es finito.

En particular, si $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ es inyectiva, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(n) = +\infty$.

24. Sea (x_n) una sucesión de números reales y suponga que $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ cumple una de las (y por tanto todas las) condiciones del ejercicio anterior. Pruebe que si $\lim x_n = a$ y $y_n = b$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 0$. $x_{\varphi(n)}$, entonces $\lim y_n = a$. Dé ejemplo de $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ sobreyectiva, tal que $\lim x_n = a$, pero no se cumple $\lim y_n = a$, donde $y_n = x_{\varphi(n)}$.

25. Sea $x_n \neq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Si existen $n_0 \in \mathbb{N}$ y $c \in \mathbb{R}$ tales que $0 < |x_{n+1}/x_n| \leq c < 1$ para todo $n > n_0$, entonces $\lim x_n = 0$. Si por el contrario $|x_{n+1}/x_n| \geq c > 1$ para todo $n > n_0$, entonces $\lim |x_n| = +\infty$. Como aplicación, reobtenga los Ejemplos 21 y 22 y muestre que $\lim n!/n^n = 0$.

26. Sea T un arreglo triangular de números no negativos,

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & & & t_{11} \\ & & & & & & t_{21} & t_{22} \\ & & & & & & t_{31} & t_{32} & t_{33} \\ & & & & & & \vdots & & \\ & & & & & & t_{n1} & t_{n2} & t_{n3} & \dots & t_{nn} \end{array}$$

Haga dos hipótesis sobre el arreglo T . Primera: cada fila tiene suma igual a 1. Segunda: cada columna tiene límite cero: $\lim_{n \rightarrow \infty} t_{ni} = 0$ para todo $i \in \mathbb{N}$. Dada una sucesión convergente (x_n) , con $\lim x_n = a$, use el arreglo T para

transformarla en una sucesión (y_n) , con

$$y_n = t_{n1}x_1 + t_{n2}x_2 + \cdots + t_{nn}x_n.$$

Pruebe que $\lim y_n = a$. [Sugerencia: Considere inicialmente el caso $a = 0$. Dado $\varepsilon > 0$, existe $p \in \mathbb{N}$ tal que $n > p \Rightarrow |x_n| < \varepsilon/2$. Existe también $A > 0$ tal que $|x_n| < A$ para todo n . A continuación, obtenga $q \in \mathbb{N}$ tal que $n > q \Rightarrow |t_{n1}| < \delta, |t_{n2}| < \delta, \dots, |t_{np}| < \delta$, donde $\delta = \varepsilon/(2pA)$. Tome $n_0 = \max\{p, q\}$. Observe que $n > n_0 \Rightarrow |y_n| \leq t_{n1}|x_1| + \cdots + t_{np}|x_p| + \cdots + t_{nn}|x_n|$, donde la suma de las p primeras parcelas no excede $\varepsilon/2$ y la suma de las $n - p$ parcelas restantes no supera $(t_{n,p+1} + \cdots + t_{nn})\varepsilon/2$. Luego, $|y_n| < \varepsilon$. El caso general se reduce inmediatamente a este.]

27. Si $\lim x_n = a$, poniendo $y_n = \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}$, se tiene aún $\lim y_n = a$. (Sugerencia: Use el ejercicio anterior.)

28. Si $\lim x_n = a$, y los x_n son todos positivos, entonces $\lim \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} = a$. [Sugerencia: Tome logaritmos y reduzca al problema anterior.] Concluya que si $a_n > 0$ y $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = a$ entonces $\lim \sqrt[n]{a_n} = a$.

29. Sea $y_n > 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, con $\sum y_n = +\infty$. Si $\lim x_n = a$ entonces $\lim \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{y_1 + y_2 + \cdots + y_n} = a$.

30. Si (y_n) es creciente y $\lim y_n = +\infty$, entonces $\lim \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = a \Rightarrow \lim \frac{x_n}{y_n} = a$. (Use el Ejercicio 29.)

31. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}} = \frac{1}{p+1}$. (Use el ejercicio anterior.)

32. Para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene $0 < e - \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}\right) < \frac{1}{n!}$. Concluya de ahí que el número e es irracional.

33. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \sqrt[n]{(n+1)(n+2) \cdots 2n} = \frac{4}{e}$. (Use el final del Ejercicio 28.)

34. Pruebe que si definimos a_n mediante la igualdad $n! = n^n e^{-n} a_n$, se tendrá

$$\lim \sqrt[n]{a_n} = 1.$$

35. Sean $\sum a_n$ y $\sum b_n$ series de términos positivos. Si $\sum b_n = +\infty$ y existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq \frac{b_{n+1}}{b_n}$ para todo $n > n_0$, entonces $\sum a_n = +\infty$.

36. Sean $\sum a_n$ y $\sum b_n$ series de términos positivos. Si $\lim \frac{a_n}{b_n} = 0$ y $\sum b_n$ converge, entonces $\sum a_n$ converge. Si $\lim \frac{a_n}{b_n} = c \neq 0$, entonces $\sum a_n$ converge si, y solo si, $\sum b_n$ converge.

37. Para todo polinomio $p(x)$ de grado superior a 1, la serie $\sum \frac{1}{p(n)}$ converge.

38. Si $-1 < x < 1$ y $\binom{m}{n} = \frac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!}$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} \binom{m}{n} x^n = 0$ para cualesquiera $m \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$.

39. Si la sucesión (a_n) es no creciente y $\lim a_n = 0$, lo mismo ocurre con $b_n = \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}$. Concluya que, en este caso, la serie $a_1 - \frac{1}{2}(a_1 + a_2) + \frac{1}{3}(a_1 + a_2 + a_3) - \cdots$ es convergente.

40. Pruebe que, para todo $a \in \mathbb{R}$, la serie $a^2 + \frac{a^2}{(1+a^2)^2} + \cdots$ es convergente y calcule su suma.

41. Para todo $p \in \mathbb{N}$ fijado, la serie $\sum_n \frac{1}{n(n+1)\cdots(n+p)}$ converge.

42. Si $\sum a_n$ converge y $a_n > 0$, entonces $\sum (a_n)^2$ y $\sum \frac{a_n}{1+a_n}$ convergen.

43. Si $\sum (a_n)^2$ converge, entonces $\sum \frac{a_n}{n}$ converge.

44. Si a_n es decreciente y $\sum a_n$ converge, entonces $\lim n \cdot a_n = 0$.

45. Si a_n es decreciente y $\sum a_n = +\infty$, entonces,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}}{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}} = 1.$$

46. Sea (a_n) una sucesión no creciente, con $\lim a_n = 0$. La serie $\sum a_n$ converge si, y solo si, $\sum 2^n \cdot a_{2^n}$ converge.

47. Pruebe que el conjunto de los valores de adherencia de la sucesión $x_n = \cos(n)$ es el intervalo cerrado $[-1, 1]$.
48. Sean a, b números reales positivos. Defina inductivamente las sucesiones (x_n) , (y_n) poniendo $x_1 = \sqrt{ab}$, $y_1 = (a + b)/2$ y $x_{n+1} = \sqrt{x_n y_n}$, $y_{n+1} = (x_n + y_n)/2$. Pruebe que x_n e y_n convergen al mismo límite, llamado la media aritmético-geométrica entre a y b .
49. Sean $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq 0$ y $s_n = a_1 - a_2 + \cdots + (-1)^{n-1} a_n$. Pruebe que la sucesión (s_n) es acotada y que $\limsup s_n - \liminf s_n = \lim a_n$.