Álgebra I Práctica 1 Resuelta

Por alumnos de Álgebra I Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA

Choose your destiny:

- Notas teóricas
- Ejercicios de la guía:

1.	5.	9.	13.	17.	21.	25.	29.
2.	6.	10.	14.	18.	22.	26.	30.
3.	7.	11.	15.	19.	23.	27 .	
4.	8.	12.	16.	20 .	24 .	28.	

• Ejercicios Extras



Notas teóricas:

Voy a estar usando:

(a)
$$A \cup B = B \cup A \rightarrow \text{Conmuta}$$

(b)
$$A \cap B = B \cap A \to \text{Conmuta}$$

(c)
$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c \to \text{De Morgan } 1$$

(d)
$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c \to \text{De Morgan } 2$$

(e)
$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \rightarrow \text{Distributiva 1}$$

(f)
$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \rightarrow \text{Distributiva } 2$$

(g)
$$A - B = A \cap B^c$$

(h)
$$A \triangle B = \begin{cases} (A - B) \cup (B - A) \\ (A \cup B) \cap (A \cap B)^c \\ (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c) \end{cases}$$

(i)
$$A^c = \{x \in \mathcal{U} \mid x \notin A\}$$

(j)

$x \in A$	$x \in B$	$x \in A^c$	$x \in A \cap B$	$x \in A \cup B$	$x \in \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	$x \in A \triangle B$	A - B
V	V	F	V	V	V	F	F
V	F	F	F	V	F	V	V
F	V	V	F	V	V	V	F
F	F	V	F	F	V	F	F

(k) Cuando para probar $p \Rightarrow q$ se prueba en su lugar $\sim q \Rightarrow \sim p$ se dice que es una demostración por contrarrecíproco, mientras que cuando se prueba en su lugar que suponer que vale $p \land \sim q$ lleva a una contradicción, se dice que es una demostración por reducción al absurdo.

Ejercicios de la guía:

1. Dado el conjunto $A = \{1, 2, 3\}$, determinar cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas

(i)
$$1 \in A$$

(ii)
$$\{1\} \subseteq A$$

(iii)
$$\{2,1\} \subset A$$

(iii)
$$\{2,1\} \subseteq A$$
 (iv) $\{1,3\} \in A$

$$(v) \{2\} \in A$$

 $A = \{1, 2, 3\}$

(i)
$$1 \in A \xrightarrow{\text{respueta}} V$$

(iii)
$$\{2,1\} \subseteq A \xrightarrow{\text{respuesta}} V$$

(v)
$$\{2\} \in A \xrightarrow{\text{respuesta}} F$$

(ii)
$$\{1\} \subseteq A \xrightarrow{\text{respueta}} V$$

(iv)
$$\{1,3\} \in A \xrightarrow{\text{respuesta}} F$$

Dado el conjunto $A = \{1, 2, \{3\}, \{1, 2\}\}\$, determinar cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

(i)
$$3 \in A$$

(iv)
$$\{\{3\}\}\in A$$

(iv)
$$\{\{3\}\}\in A$$
 (vii) $\{\{1,2\}\}\subseteq A$ (x) $\varnothing\subseteq A$

(x)
$$\varnothing \subseteq A$$

(ii)
$$\{3\} \subseteq A$$

(v)
$$\{1, 2\} \in A$$

(v)
$$\{1, 2\} \in A$$
 (viii) $\{\{1, 2\}, 3\} \subseteq A$ (xi) $A \in A$

(xi)
$$A \in A$$

(iii)
$$\{3\} \in A$$

$$(vi) \{1,2\} \subseteq A \qquad (ix) \varnothing \in A \qquad (xii) A \subseteq A$$

(ix)
$$\varnothing \in A$$

(xii)
$$A \subseteq A$$

(i)
$$3 \in A \to F$$

(iv)
$$\{\{3\}\}\in A\to V$$

$$\text{(i)} \ \ 3 \in A \to F \\ \qquad \qquad \text{(iv)} \ \ \{\{3\}\} \in A \to V \\ \qquad \qquad \text{(vii)} \ \ \{\{1,2\}\} \subseteq A \to V \\ \qquad \qquad \text{(x)} \ \ \varnothing \subseteq A \to V \\ \qquad \qquad \text{(x)}$$

(x)
$$\varnothing \subset A \to V$$

(ii)
$$\{3\} \subseteq A \to F$$

(v)
$$\{1, 2\} \in A \to V$$

(ii)
$$\{3\} \subseteq A \to F$$
 (v) $\{1,2\} \in A \to V$ (viii) $\{\{1,2\},3\} \subseteq A \to F$ (xi) $A \in A \to F$

(iii)
$$\{3\} \in A \to V$$

(vi)
$$\{1,2\} \subseteq A \to V$$
 (ix) $\varnothing \in A \to F$ (xii) $A \subseteq A \to V$

(ix)
$$\varnothing \in A \to F$$

(xii)
$$A \subseteq A \to V$$

3. Determinar si $A \subseteq B$ en cada uno de los siguientes casos:

i)
$$A = \{1, 2, 3\}, B = \{5, 4, 3, 2, 1\}$$

ii)
$$A = \{1, 2, 3\}, B = \{1, 2, \{3\}, -3\}$$

iii)
$$A = \{x \in \mathbb{R} \ / \ 2 < |x| < 3\} \ , B = \{x \in \mathbb{R} \ / \ x^2 < 3\}$$

iv)
$$A = \{\emptyset\}, B = \emptyset$$

Inclusión : $\begin{cases} \text{Definición} & A \subseteq B \text{ si } \forall x, x \in A \Rightarrow x \in B \\ \text{Contrarecíproco} & A \not\subseteq B \text{ si } \exists x, x \in A \Rightarrow x \not\in B \end{cases}$

(i)
$$\begin{cases} A = \{1, 2, 3\} \\ B = \{5, 4, 3, 2, 1\} \end{cases} \xrightarrow{\text{respueta}} A \subseteq B$$

(ii)
$$\begin{cases} A = \{1, 2, 3\} \\ B = \{1, 2, \{3\}, -3\} \end{cases} \xrightarrow{\text{respueta}} A \nsubseteq B \xrightarrow{\text{dado}} \{3\} \notin B$$

(iv)
$$\begin{cases} A = \{\emptyset\} \\ B = \emptyset \end{cases}$$

(iv) $\begin{cases} A = \{\varnothing\} \\ B = \varnothing \end{cases}$ respueta $A \nsubseteq B \xrightarrow[\text{que}]{\text{dado}} B$ no tiene ningún elemento, sin embargo A tiene un elemento: \varnothing .

- Dados los subconjuntos: $A = \{1, -2, 7, 3\}, B = \{1, \{3\}, 10\}$ y $C = \{-2, \{1, 2, 3\}, 3\}$ del conjunto referencial: $V = \{1, \{3\}, -2, 7, 10, \{1, 2, 3\}, 3\}$, hallar
 - (i) $A \cap (B \triangle C)$


- (ii) $(A \cap B) \triangle (A \cap C)$
- (iii) $A^c \cap B^c \cap C^c$



Falta hacerlo!


Si querés mandarlo: Telegram $\rightarrow \bigcirc$, o mejor aún si querés subirlo en $\LaTeX \rightarrow \bigcirc$.

- Dados los subconjuntos A,B,C de un conjunto referencial V, describir $(A \cup B \cup C)^c$ en términos de intersecciones y complementos, y $(A \cap B \cap C)^c$ en términos de uniones y complementos
 - $(A \cup B \cup C)^c \stackrel{\text{(c)}}{=} (A \cup B)^c \cap C^c \stackrel{\text{(c)}}{=} A^c \cap B^c \cap C^c \quad \checkmark$
 - $(A \cap B \cap C)^c \stackrel{\text{(d)}}{=} (A \cap B)^c \cup C^c \stackrel{\text{(d)}}{=} A^c \cup B^c \cup C^c \quad \checkmark$
- Sean A,B y C conjuntos. Representar en un diagrama de Venn
 - i) $(A \cup B^c) \cap C$
 - ii) $A\triangle(B\cup C)$
 - iii) $A \cup (B \triangle C)$




i)


i)




ii)




Encontrar fórmulas que describen las partes rayadas de los siguientes diagramas de Venn, utilizando únicamente intersecciones, uniones y complementos.





ii)



iii)

* Falta hacerlo!

Si querés mandarlo: Telegram $\rightarrow \bigcirc$, o mejor aún si querés subirlo en $\LaTeX \rightarrow \bigcirc$.

8. Hallar el conjunto $\mathcal{P}(A)$ de partes de A en los casos.

i)
$$A = \{1\}$$

ii)
$$A = \{a, b\}$$

iii)
$$A = \{1, \{1, 2\}, 3\}$$

Recordando que:

$$\mathcal{P}(A) \to \begin{cases} B \in \mathcal{P}(A) \iff B \subseteq A \\ \mathcal{P}(A) = \{B \mid B \subseteq A\} \end{cases}$$

(i)
$$A = \{1\} \rightarrow \mathcal{P}(A) = \{\emptyset, A\}$$
 \checkmark

(ii)
$$A = \{a, b\} \to \mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, A\} \quad \checkmark$$

(iii)
$$A = \{1, \{1, 2\}, 3\} \rightarrow \mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{\{1, 2\}\}, \{3\}, \{1, \{1, 2\}\}, \{1, 3\}, \{\{1, 2\}, 3\}, A\}$$

9. Sean A y B conjuntos, Probar que $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B) \iff A \subseteq B$

10. Sean p, q proposiciones. Verificar que las siguientes expresiones tienen la misma tabla de verdad para concluir que son equivalentes:

i)
$$p \Rightarrow q$$
, $\sim q \Rightarrow \sim p$,

$$\sim p \vee q$$
 y $\sim (p \wedge \sim q)$.

Esto nos dice que podemos demostrar una afirmación de la forma $p \Rightarrow q$ probando en su lugar $\sim q \Rightarrow \sim p$ (es decir demostrando el contrarrecíproco), o probando $\sim (p \land \sim q)$ (esto es una demostración por reducción al absurdo).

ii)
$$\sim (p \Rightarrow q)$$
 y $\sim q$

i) Sean p, q proposiciones. Verificar que las siguientes expresiones tienen la misma tabla de verdad para concluir que son equivalentes:

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$p \Rightarrow q$	$\sim q \Rightarrow \sim p$	$\sim p \vee q$	$\sim (p \land \sim q)$
V	V	F	F	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F	F	F
F	V	V	F	V	V	V	V
F	F	V	V	V	V	V	V

ii)

p	q	$\sim q$	$p \Rightarrow q$	$\sim (p \Rightarrow q)$	$p \wedge \sim q$
V	V	F	V	F	F
V	F	V	F	V	V
F	V	F	V	F	F
F	F	V	V	F	F

11. Hallar contraejemplos para mostrar que las siguientes proposiciones son falsas:

- i) $\forall a \in \mathbb{N}, \frac{a-1}{a}$ no es un número entero. La proposición es falsa, dado que si $a=1 \Rightarrow \frac{1-1}{1} = \frac{0}{1} = 0 \in \mathbb{Z}$
- ii) $\forall x, y \in \mathbb{R}$ con x, y positivos, $\sqrt{x+y} = \sqrt{x} + \sqrt{y}$. La proposición es falsa, dado que si.

$$\left\{ \begin{array}{l} x = 2. \\ y = 2 \end{array} \right\} \to \sqrt{2+2} = \sqrt{4} = 2 \neq \sqrt{2} + \sqrt{2} = \sqrt{2}$$

iii) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 4 \Rightarrow x > 2$. La proposición es falsa, dado que si x = -3, queda $9 > 4 \Rightarrow -3 > 2$, lo cual es falso.

12.

- i) Decidir si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas, justificando debidamente:
 - a) $\forall n \in \mathbb{N}, n > 5 \lor n < 8.$
 - b) $\exists n \in \mathbb{N} / n \ge 5 \land n \le 8$.
 - c) $\forall n \in \mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{N} / m > n.$
 - d) $\exists n \in \mathbb{N} / \forall m \in \mathbb{N}, m > n$.

- e) $\forall x \in \mathbb{R}, x > 3 \Rightarrow x^2 > 4.$
- f) Si n es un natural terminado en 4, entonces n es par.
- g) Si z es un número real, entonces $z \in \mathbb{C}$.
- ii) Negar las proposiciones anteriores, y en cada caso verificar que la proposición negada tiene el valor de verdad opuesto al de la original.
- iii) Reescribir las proposiciones e) y f) del item i) utilizando las equivalencias del ejercicio 10 i)
- i) (a) $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 5 \lor n \leq 8$. La proposición es verdadera. El conjunto descrito por $\{n \in \mathbb{N} \mid n \leq 8 \lor n \geq 5\} = \mathbb{N}$

¿Se puede justificar con un gráfico?

- (b) $\exists n \in \mathbb{N} \ / \ n \ge 5 \land n \le 8$. La proposición es verdadera, en este caso es cuestión de encontrar solo un valor que cumpla, n=6
- (c) $\forall n \in \mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{N} \ / \ m > n$. La proposición es verdadera, si se elige por ejemplo a m = n + 1


(d) $\exists n \in \mathbb{N} / \forall m \in \mathbb{N}, m > n$.

La proposición es falsa, el único $n \in \mathbb{N}$ que no tiene un número menor estricto es el 1. Pero la condición dice que $\forall m \in \mathbb{N}$ se debe cumplir y si m $1 \nleq 1$

- (e) $\forall x \in \mathbb{R}, x > 3 \Rightarrow x^2 > 4$. La proposición es verdadera. Si $x > 3 \Rightarrow x^2 > 9 \xrightarrow{\text{en}} x^2 > 9 > 4 \Rightarrow x^2 > 4$
- (f) Si n es un natural terminado en 4, entonces n es par.

hacer

- (g) Si z es un número real, entonces $z \in \mathbb{C}$. Están proponiendo que dado $z \in \mathbb{R} \Rightarrow z \in \mathbb{C}$. Dado que $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C} = \{a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R} \mid a + ib\}$, con $i^2 = -1$ Por lo tanto para b = 0, podría generar todo \mathbb{R} .
- ii) (a) $\exists n \in \mathbb{N}, n < 5 \land n > 8$. $A = \{n \in \mathbb{N} \ / \ n < 5 \land n > 8\} = \emptyset \Rightarrow \nexists n \text{ que cumpla lo pedido.}$



(b) $\forall n \in \mathbb{N} / n < 5 \lor n > 8$.

La proposición es falsa, n=6 no cumple estar en ese conjunto.

(c) $\exists n \in \mathbb{N}, \ \forall m \in \mathbb{N} \ / \ m \leq n$.

La proposición es falsa, porque el conjunto $\mathbb N$ no tiene un máximo. n=m+1.

(d) $\forall n \in \mathbb{N} / \exists m \in \mathbb{N}, m \leq n.$

La proposición es verdadera, el único $m \in \mathbb{N}$ que cumple eso es el m = 1.

(e) $\exists x \in \mathbb{R}, x \leq 3 \Rightarrow x^2 \leq 4$.

La proposición es falsa. Dado dos conjunto:

$$\left\{ A = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x \le 3 \right\} B = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x^2 \le 2 \right\} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{c} \bullet \\ -2 \end{array} \right.$$

- (f) hacer
- (g) Si z no es un número real, entonces $z \notin \mathbb{C}$. La proposición es falsa. Están proponiendo que dado $z \notin \mathbb{R} \Rightarrow z$

La proposición es falsa. Están proponiendo que dado $z \notin \mathbb{R} \Rightarrow z \notin \mathbb{C}$. Si z=i, se prueba lo contrario. Dado que $i \notin \mathbb{R}$, pero $i \in \mathbb{C}$

	$p \Rightarrow q$	$\forall x \in \mathbb{R}, x > 3 \Rightarrow x^2 > 4$	-2 2 3	$A \stackrel{?}{\subseteq} B \rightarrow \checkmark$
iii)	$\sim q \Rightarrow \sim p$	$x^2 \le 4 \Rightarrow x \le 3$	← 2 2 3 →	$A \stackrel{?}{\subseteq} B \rightarrow \checkmark$
)	$\sim p \vee q$	$x \le 3 \lor x^2 > 4$	$\begin{array}{ccc} & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & $	$A \cup B \stackrel{?}{=} \mathcal{U} \rightarrow \checkmark$
	$\sim (p \lor \sim q)$	$\sim (x > 3 \land x^2 \le 4)$	 ←	$(A \cap B)^c \stackrel{?}{=} \varnothing^c = \mathcal{U} \to \checkmark$

- 13. Determinar cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cualesquiera sean los subconjuntos A, B y C de un conjunto referencial \mathcal{U} y cuáles no. Para las que sean verdaderas, dar una demostración, para las otras dar un contraejemplo.
 - i) $(A\triangle B) C = (A C)\triangle (B C)$.
- iii) $C \subseteq A \Rightarrow B \cap C \subseteq (A \triangle B)^c$

ii) $(A \cap B) \triangle C = (A \triangle C) \cap (B \triangle C)$

iv) $A\triangle B=\varnothing\iff A=B$

i) $(A\triangle B) - C = (A - C)\triangle (B - C)$. Es verdadera. Pruebo con tabla de verdad.

_								
A	B	C	C^c	A-C	B-C	$A\triangle B$	$(A\triangle B)-C$	$(A-C)\triangle(B-C)$
V	V	V	F	F	F	F	F	F
V	V	F	V	V	V	F	F	F
V	F	V	F	F	F	V	F	F
V	F	F	V	V	F	V	V	V
F	V	V	F	F	F	V	F	F
F	V	F	V	F	V	V	V	V
\overline{F}	F	V	F	F	F	F	F	F
$\mid F \mid$	F	F	V	F	F	F	F	F

Hay distribución entre la resta y una diferencias simétrica.

ii) ***** Falta hacerlo!

Si querés mandarlo: Telegram $\rightarrow \bigcirc$, o mejor aún si querés subirlo en LATEX $\rightarrow \bigcirc$.

- iii) hacer
- iv) hacer

14. Sean A, B y C subconjuntos de un conjunto referencial \mathcal{U} . Probar que:

i)
$$A \cap (B \triangle C) = (A \cap B) \triangle (A \cap C)$$

iv)
$$(A \cap C) - B = (A - B) \cap C$$

ii)
$$A - (B - C) = (A - B) \cup (A \cap C)$$

 $(A - B) \cup (A \cap C) = A \cap [(A \cap B^c) \cup C] =$
 $A \cap [(A \cup C) \cap (B^c \cup C)] =$
 $A \cap (B^c \cup C) = A \cup (B - C)^c = A - (B - C)$

$$v) \ A \subseteq B \Rightarrow A \triangle B = B \cap A^c$$

vi) $A \subseteq C \iff B^c \subseteq A^c$

iii)
$$A \triangle B \subseteq (A \triangle C) \cup (B \triangle C)$$

vii)
$$A \cap C = \emptyset \Rightarrow A \cap (B \triangle C) = A \cap B$$

i) ***** Falta hacerlo!

Si querés mandarlo: Telegram $\to \odot$, o mejor aún si querés subirlo en LATEX $\to \odot$.

- ii) $(A-B)\cup(A\cap C)=A\cap[(A\cap B^c)\cup C]=A\cap[(A\cup C)\cap(B^c\cup C)]=A\cap(B^c\cup C)=A\cup(B-C)^c=A-(B-C)$
- iii) Hacer!
- iv) Hacer!
- v) Hacer!
- vi) Hacer!
- vii) Hacer!
- **15.** Sean $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 3, 5, 7\}$. Hallar $A \times A, A \times B, (A \cap B) \times (A \cup B)$.

- $A \times A = \left\{ \begin{array}{l} \{a \in A, b \in A \ / \ (a,b) \in A \times A\} \rightarrow \text{Comprensión} \\ \{(1,1),(1,2),(1,3),(2,1),(2,2),(2,3),(3,1),(3,2),(3,3)\} \rightarrow \text{Extensión} \end{array} \right.$
- $A \times B = \cdots$

•
$$(A \cap B) \times (A \cup B) =$$

$$\begin{cases}
\{1,3\} \times \{1,2,3,5,7\} = \frac{\times |1| |2| |3| |5| |7|}{1 |(1,1)| \cdots |\cdots |\cdots |(1,7)|} \\
(A \cap B) \times (A \cup B) = \{s \in (A \cap B), t \in (A \cup B) / (s,t) \in (A \cap B) \times (A \cup B)\}
\end{cases}$$

- **16.** Sean A, B y C conjuntos. Probar que:
 - i) $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$
 - ii) $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$
 - iii) $(A B) \times C = (A \times C) (B \times C)$
 - iv) $(A \triangle B) \times C = (A \times C) \triangle (B \times C)$


* Falta hacerlo!

Si querés mandarlo: Telegram $\rightarrow \bigcirc$, o mejor aún si querés subirlo en LATEX $\rightarrow \bigcirc$.

Relaciones Definición de Relación, \mathcal{R} :

Sean A y B conjuntos. Una relación \mathcal{R} de A en B es un subconjunto cualquiera \mathcal{R} del producto cartesiano $A \times B$. Es decir \mathcal{R} de A en B si $\mathcal{R} \in \mathcal{P}(A \times B)$.

- 17. Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{1, 3, 5, 7\}$. Verificar las siguientes relaciones de A y B y en caso afirmativo graficarlas por medio de un diagrama con flechas de A en B y por medio de puntos en el producto cartesiano $A \times B$.
 - i) $\mathcal{R} = \{(1,1), (1,3), (1,7), (3,1), (3,5)\}$



- ii) $\mathcal{R} = \{(1,1), (1,3), (2,7), (3,2), (3,5)\}$ $\rightarrow 3 \mathcal{R} \ 2 \notin \mathcal{P}(A \times B)$
- iii) $\mathcal{R} = \{(1,1), (2,7), (3,7)\}$ Hacer!
- iv) $\mathcal{R} = \{(1,3), (2,1), (3,7)\}$ Hacer!

18. Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{1, 3, 5, 7\}$. Describir por extensión cada una de las siguientes relaciones de A en B:

i) $(a,b) \in \mathcal{R} \iff a \leq b$

iii) $(a,b) \in \mathcal{R} \iff a \cdot b \text{ es par}$

ii) $(a,b) \in \mathcal{R} \iff a > b$

- iv) $(a,b) \in \mathcal{R} \iff a+b > 6$
- i) $(a,b) \in \mathcal{R} \iff a \leq b \to (a,b) \in \mathcal{R} \Leftrightarrow \{(1,1),(1,3),(1,5),(1,7),(2,3),(2,5),(2,7),(3,3),(3,5),(3,7)\}$
- ii) $(a,b) \in \mathcal{R} \iff a > b \to (a,b) \in \mathcal{R} \Leftrightarrow \{(2,1),(3,1)\}$
- iii) $(a,b) \in \mathcal{R} \iff a \cdot b \to (a,b) \in \mathcal{R} \Leftrightarrow \{(2,1),(2,3),(2,5),(2,7)\}$
- iv) $(a,b) \in \mathcal{R} \iff a+b > 6 \to (a,b) \in \mathcal{R} \iff \{(1,7),(2,5),(2,7),(3,5),(3,7)\}$


19. Sea $A = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$. Para cada uno de los siguientes gráficos describit por extensión la relación en A que representa y determinar si es reflexiva, simétrica, antisimétrica o transitiva.

Un poco de la teoría de esto:

1. Reflexiva: $(x,x) \in \mathcal{R} \quad \forall x \in A \text{ o } x \mathcal{R} x. \quad \forall x \in A.$ Gráficamente, cada elemento tiene que tener un

bucle. $x \bullet$

- 2. $Simétrica: (x,y) \in \mathcal{R}$, entonces el par $(y,x) \in \mathcal{R}$, también si $\forall x,y \in A, x \mathcal{R} \ y \Rightarrow y \mathcal{R} \ x$. Gráficamente tiene que haber un ida y vuelta en cada elemento de la relación.
- 3. Antisimétrica: $(x,y) \in \mathcal{R}$, con $x \neq y$ entonces el par $(y,x) \notin \mathcal{R}$, también se puede pensar como $\forall x,y \in A, x \mathcal{R} y$ e $y \mathcal{R} x \Rightarrow x = y$. Gráficamente **no** tiene que haber ningún ida y vuelta en el gráfico. Solo en una dirección.
- 4. Transitiva: Para toda terna $x, y, z \in A$ tales que $(x, y) \in \mathcal{R}$ e $(y, z) \in \mathcal{R}$, se tiene que $(x, z) \in \mathcal{R}$. Otra manera sería si $\forall x, y, z \in A$, $x \mathcal{R} y$ e $y \mathcal{R} z \Rightarrow x \mathcal{R} z$. Gráficamente tiene que haber flecha directa entre las puntas de cualquier camino que vaya por más de dos nodos.



• No es antisimétrica, porque $a \mathcal{R} b y b \mathcal{R} a$ con $a \neq b$.

atajo


• No es transitiva, porque $c \mathcal{R} h y h \mathcal{R} g$, pero $c \mathcal{R} h$.

ii) ***** Falta hacerlo!


Si querés mandarlo: Telegram $\rightarrow \bigcirc$, o mejor aún si querés subirlo en $\LaTeX \rightarrow \bigcirc$.

iii) ***** Falta hacerlo!

Si querés mandarlo: Telegram $\rightarrow \bigcirc$, o mejor aún si querés subirlo en LATEX $\rightarrow \bigcirc$.



- Reflexiva, porque hay bucles en todos los elementos de A.
- Es simétrica, porque hay ida y vuelta en todos los pares de vértices.
- No es antisimétrica, porque $a \mathcal{R} b y b \mathcal{R} a$ con $a \neq b$.
- Es transitiva, porque hay *atajos* en todas las relaciones de ternas.
- **20.** Sea $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Graficar la relación, $\mathcal{R} = (1, 1), (1, 3), (3, 1), (3, 3), (6, 4), (4, 6), (4, 4), (6, 6)$



- No es reflexiva porque no hay bucles ni en 2 ni en 5.
- Es simétrica, porque hay ida y vuelta en todos los pares de vértices.
- No es antisimétrica, porque 1 \mathcal{R} 3 y 3 \mathcal{R} 1 con 1 \neq 3.
- Es transitiva.

Chequear. Caso particula donde no hay ternas de x, y, z distintos. Sí, el que 2 esté ahí solo ni cumple la hipótesis de transitividad.

21. Falta hacerlo!

Si querés mandarlo: Telegram $\to \emptyset$, o mejor aún si querés subirlo en $\LaTeX \to \emptyset$.

- **22.** En cada uno de los siguientes casos determinar si la relación \mathcal{R} en A es reflexiva, simétrica, antisimétrica, transitiva, de equivalencia o de orden.
 - i) $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \mathcal{R} = (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (1, 2), (1, 3), (2, 5), (1, 5)$
 - ii)
 - iii)
 - iv)
 - v)
 - vi) $A = \mathcal{P}(\{n \in \mathbb{N} \mid n \leq 30\}), \ \mathcal{R}$ definida por $X \ \mathcal{R} \ Y \iff 2 \notin X \cap Y^c$
 - vii) $A = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, \mathcal{R} definida por (a, b) \mathcal{R} (c, d) \iff bc es múltiplo de ad.

- 1. Relación de equivalencia: La relación debe ser reflexiva, simétrica y transitiva.
- 2. Relación de orden: La relación debe ser reflexiva, antisimétrica y transitiva.

i)
$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \mathcal{R} = (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (1, 2), (1, 3), (2, 5), (1, 5)\}$$

R: Es reflexiva, porque hay bucles en todos los elementos de A.

S: No es simétrica, dado que existe (1, 5), pero no (5, 1)

AS: Es antisimétrica. No hay ningún par que tenga la vuelta, excepto los casos $x \mathcal{R} x$.

T: Es transitiva. La terna 1, 2, 5 es transitiva.

La relación es R, AS y T, por lo tanto es una relación de orden.

ii) ***** Falta hacerlo!

Si querés mandarlo: Telegram $\rightarrow \bigcirc$, o mejor aún si querés subirlo en \LaTeX

iii) ***** Falta hacerlo!

Si querés mandarlo: Telegram $\rightarrow \bigcirc$, o mejor aún si querés subirlo en $\LaTeX \rightarrow \bigcirc$.

iv) **F**alta hacerlo!

Si querés mandarlo: Telegram $\to \bigcirc 3$, o mejor aún si querés subirlo en $\LaTeX \to \bigcirc 3$.

v) ***** Falta hacerlo!

Si querés mandarlo: Telegram $\rightarrow \bigcirc 3$, o mejor aún si querés subirlo en $\LaTeX \rightarrow \bigcirc 3$.

vi) $A = \mathcal{P}(\{n \in \mathbb{N} \mid n \leq 30\}), \ \mathcal{R} \text{ definida por } X \ \mathcal{R} \ Y \iff 2 \notin X \cap Y^c$

$2 \in X$	$2 \in Y$	$2 \in Y^c$	$2 \in X^c$	$2 \notin X \cap Y^c$	$2 \notin Y \cap X^c$
V	V	F	F	V	V
V	F	V	F	F	V
F	V	F	V	V	F
F	F	V	V	V	V

- R: La relación es reflexiva ya que para que un elemento X esté relacionado con sí mismo debe ocurrir que $X \mathcal{R} X \iff 2 \notin X \cap X^c$, es decir $2 \notin \emptyset$, lo cual es siempre cierto.
- S: La relación no es simétrica. Se puede ver con la segunda y tercera fila de la tabla con un contraejemplo. $X = \{1\}$ y $Y = \{2\}$, $X, Y \subseteq A$, $X \in X$, pero $Y \in X$,
- AS: La relación no es antisimétrica. Se puede ver con la primera o cuarta fila tabla con un contraejempl con un contraejemplo. Si $X = \{1, 2\}$ e $Y = \{2, 3\} \Rightarrow X \mathcal{R} Y$ y además $Y \mathcal{R} X$ con $X \neq Y$.
 - T: Es transitiva. Si bien no es lo más fácil de explicar, se puede ver en la tabla que para tener 2 relaciones en una terna X,Y,Z no se puede llegar nunca al caso de la segunda fila de la tabla, donde se lograría que $X \mathcal{K} Z$
- vii) $A = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, \mathcal{R} definida por (a, b) $\mathcal{R}(c, d) \iff bc$ es múltiplo de ad.

R: $(a,b) \mathcal{R}(a,b) \iff ba = k \cdot ab \text{ con } k = 1$, se concluye que sí es reflexiva.

S:
$$\begin{cases} (a,b) \ \mathcal{R}(c,d) \iff bc^{\bigstar^1} = k \cdot ad \\ (c,d) \ \mathcal{R}(a,b) \iff ad = h \cdot bc^{\bigstar^1} = h \cdot k \cdot ad = k'ad \\ \text{con } k' = 1 \text{ se cumple la igualdad. La relación es simétrica.} \end{cases}$$

AS: Si tomo (a, b) = (4, 2) y (c, d) = (16, 4), tengo que (a, b) \mathcal{R} (c, d) con $(a, b) \neq (c, d)$. Por lo tanto la relación no es antisimétrica.

T:
$$\begin{cases} (a,b) \ \mathcal{R}(c,d) \iff bc^{\bigstar^{1}} = k \cdot ad \\ (c,d) \ \mathcal{R}(e,f) \iff de^{\bigstar^{1}} = h \cdot cf \\ \text{quiero ver que } (a,b) \ \mathcal{R}(e,f) \iff be = k' \cdot af \\ \xrightarrow{\text{multiplico}} \begin{cases} bc^{\bigstar^{1}} = k \cdot ad \\ de^{\bigstar^{1}} = h \cdot cf \end{cases} \end{cases} \xrightarrow{\text{y}} be \cdot \mathscr{A} = k \cdot h \cdot af \cdot \mathscr{A} \rightarrow be \stackrel{\checkmark}{=} k' \cdot af.$$
Se concluye que la relación es transitiva.

Con esos resultados se puede decir que \mathcal{R} en A es de equivalencia.

- 23. Sea A un conjunto. Describir todas las relaciones en A que son a la vez
 - i) simétricas y antisimétricas elementos en bucles sueltos?

ii) de equivalencia y de orden Idem anterior

- i) simétricas y antisimétricas elementos en bucles sueltos?
- ii) de equivalencia y de orden Idem anterior

¿Puede una relación en A no ser ni simétrica ni antisimétrica? 22 (vi)?

24. Sea $A = \{a, b, c, d, e, f\}$. Dada la relación de equivalencia en A:

$$\mathcal{R} = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e), (f, f), (a, b), (b, a), (a, f), (f, a), (b, f), (f, b), (c, e), (e, c)\}$$

Hallar la clase \overline{a} de a, la clase \overline{b} de b, la clase \overline{c} de c, la clase \overline{d} de d, y la partición asociada a \mathcal{R}

$$A \qquad \qquad d \stackrel{\bullet}{\bullet} \qquad \qquad d \stackrel{\bullet}{\bullet$$

La partición asociada a \mathcal{R} : $\{\{d\},\{c,e\},\{a,b,f\}\}=\{\overline{d},\overline{b},\overline{a}\}.$

25. Sea $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Hallar y graficar la relación de equivalencia en A asociada a la partición $\{\{1,3\},\{2,6,7\},\{4,8,9,10\},\{5\}\}$. ¿Cuántas clases de equivalencia distintas tiene? Hallar un representante para cada clase.

Falta hacerlo!

Si querés mandarlo: Telegram $\rightarrow \bigcirc 3$, o mejor aún si querés subirlo en $\LaTeX \rightarrow \bigcirc 3$.

② ¿Errores? Mandanos tu solución, prolija, así lo arreglamos.

26. Sean $P = \mathcal{P}(\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\})$ el conjunto de partes de $\{1, \dots, 10\}$ y \mathcal{R} la relación en Pdefinida por:

$$A \mathcal{R} B \iff (A \triangle B) \iff \cap \{1, 2, 3\} = \emptyset$$

- i) Probar que \mathcal{R} es una relación de equivalencia y decidir si es antisimétrica (Sugerencia: usar adecuadamente el ejercicio 14iii)).
- ii) Hallar la clase de equivalencia de $A = \{1, 2, 3\}$.

😭 Falta hacerlo!

Si querés mandarlo: Telegram $\rightarrow \bigcirc \bigcirc$, o mejor aún si querés subirlo en $\LaTeX \rightarrow \bigcirc$.

- Sean $A=\{n\in\mathbb{N}\ /\ n\leq 92\}$ y $\mathcal{R}\,$ la relación en A definida por $x\ \mathcal{R}\ y\iff x^2-y^2=93x-93y$ 27.
 - i) Probar que \mathcal{R} es una relación de equivalencia. ¿Es antisimétrica?
 - ii) Hallar la clase de equivalencia de cada $x \in A$. Deducir cuántas clases de equivalencia distintas determina la relación \mathcal{R}
 - i) Primero acomodo la condición de la relación:

$$x^{2} - y^{2} = 93x - 93y \xrightarrow{\text{acomodo}} \begin{cases} *^{1} & x = y \\ & \lor \\ *^{2} & x + y = 93 \end{cases}$$


Para ser relación de equivalencia es necesario que:

Para ser relación de equivalencia es necesario que:
$$R : \text{ Reflexiva} \to x \mathcal{R} x \iff x \stackrel{!}{\Longrightarrow} x \checkmark$$

$$S : \text{ Simétrica} \to \begin{cases} x \mathcal{R} y \iff x + y \stackrel{!}{\Longrightarrow} I = 93 \\ y \mathcal{R} x \iff y + x \stackrel{!}{\Longrightarrow} I = 93 \end{cases} \checkmark$$

$$T : \text{ Transitiva} \to \begin{cases} x \mathcal{R} y \iff x \stackrel{!}{\Longrightarrow} I = 93 - y \\ y \mathcal{R} z \iff y \stackrel{!}{\Longrightarrow} I = 93 - z \\ \frac{\text{resto}}{\text{m.a.m}} x - y = -y + z \to x \stackrel{!}{\Longrightarrow} z \iff x \mathcal{R} z \end{cases}$$
La \mathcal{R} no es antisimétrica, como contraciemplo se ve que 1 \mathcal{R} 92 y 92 \mathcal{R} 1 con 1 $\stackrel{!}{\Longrightarrow}$

La \mathcal{R} no es antisimétrica, como contraejemplo se ve que 1 \mathcal{R} 92 y 92 \mathcal{R} 1 con $1 \neq 92$



A priori no sé como encontrar las clases de equivalencia, pero solo buscando la relación del 1 con algún número (excepto el mismo) veo que únicamente se puede relacionar con el 92 por la condición de la relación. De ahí se pueden inferir que todas las clases van a ser así chiquitas.Las clases de

$$\begin{cases} \overline{1} &= \overline{92} &= \{1,92\} \\ \overline{2} &= \overline{91} &= \{2,91\} \\ \vdots &\vdots &\vdots \\ \overline{45} &= \overline{47} &= \{45,47\} \\ \overline{46} &= \{46\} \end{cases}$$

Hay entonces 46 clases. $A = \{\overline{1}, \overline{2}, \dots, \overline{45}, \overline{46}\}\$

28.

- i) Sea $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Consideremos en $\mathcal{P}(A)$ la relación de equivalencia dada por el cardinal (es decir, la cantidad de elementos): Dos subconjuntos de A están relacionados si y solo si tienen la misma cantidad de elementos ¿Cuántas clases de equivalencia **distintas** determina la relación? Hallar un representante par acada clase.
- ii) En el conjunto de todos los subconjuntos finitos de \mathbb{N} , consideremos nuevamente la relación de equivalencia dada por el cardinal: Dos subconjuntos finitos de \mathbb{N} están relacionados si y solo si tienen la misma cantidad de elementos ¿Cuántas clases de equivalencia **distintas** determina la relación? Hallar un representante para cada clase.
- i) $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \cdots, \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}\}$, el conjunto $\mathcal{P}(A)$ tiene un total de $2^{10} = 1024$ elementos. La relación determina 11 clases de equivalencia distintas.

```
 \begin{cases} \text{Conjuntos con 0 elementos:} & \overline{0} & \varnothing \\ \text{Conjuntos con 1 elemento:} & \overline{1} & \{3\} \\ \text{Conjuntos con 2 elementos:} & \overline{2} & \{5,2\} \\ \text{Conjuntos con 3 elementos:} & \overline{3} & \{1,6,3\} \\ \text{Conjuntos con 4 elementos:} & \overline{4} & \{1,8,10,4\} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \text{Conjuntos con 10 elementos:} & \overline{10} & \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\} = A \end{cases}
```

ii) Es parecido al inciso anterior, donde ahora $A = \{1, 2, 3, \dots, N-1, N\}$, donde $\mathcal{P}(\mathbb{N}_N)$ tiene 2^N elementos.

La relación determina N+1 clases de equivalencia distintas.

```
 \begin{cases} \text{Conjuntos con 0 elementos:} & \overline{0} & \varnothing \\ \text{Conjuntos con 1 elemento:} & \overline{1} & \{3\} \\ \text{Conjuntos con 2 elementos:} & \overline{2} & \{5,2\} \\ \text{Conjuntos con 3 elementos:} & \overline{3} & \{1,6,3\} \\ \text{Conjuntos con 4 elementos:} & \overline{4} & \{1,8,10,4\} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \text{Conjuntos con 10 elementos:} & \overline{N} & \{1,2,3,4,\cdots,N-1,N\} \mathbb{N}_N \end{cases}
```

Functiones

Un poco de teoría:

Sean A y B conjuntos, y sea \mathcal{R} de A en B. Se dice que \mathcal{R} es una función cuando todo elemento $x \in A$ está relacionado con algún $y \in B$, y este elemento y es único. Es decir:

 $\{ \forall x \in A, \exists ! y \in B / x \mathcal{R} y \ \forall x \in A, \exists y \in B / x \mathcal{R} y, \text{si } y, z \in B \text{ son tales que } x \mathcal{R} y \text{ y } x \mathcal{R} z \Rightarrow y = z. \}$

- Dada $f: A(dominio) \to B(codominio)$ el conjunto imagen es: $Im(f) = \{y \in B: \exists x \in A / f(x) = y\}$
- - inyectiva: si $\forall x, x' \in A$ tales que f(x) = f(x') se tiene que x = x'
 - sobreyectiva: si $\forall y \in B, \exists x \in A \text{ tal que } f(x) = y. f \text{ es sobreyectiva si } \text{Im}(f) = B$
 - biyectiva: Cuando es inyectiva y sobreyectiva.
- A,B,C conjuntos y $f:A\to B\to C,\,g:B\to C$ funciones. Entonces la composición de f con g, que se nota:

 $g \circ f = g(f(x))$, $\forall x \in A$, resulta ser una función de A en C.

 $\bullet \ f$ es biyectiva cuando: $f^{-1}: B \to A$ es la función que satisface que:

$$\forall y \in B: f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y$$

- **29.** Determinar si \mathcal{R} es una función de A en B en los casos
 - i) $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{a, b, c, d\}$, $\mathcal{R} = \{(1, a), (2, a), (3, a), (4, b), (5, c), (3, d)\}$ No es función, dado que $3 \mathcal{R} a$, $3 \mathcal{R} d$ y $a \neq d$
 - ii) $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{a, b, c, d\}$, $\mathcal{R} = \{(1, a), (2, a), (3, d), (4, b)\}$ No es función, dado que todo elemnto de A tiene que estar relacionado a algún elemento de B, 5 \mathcal{R} y para ninún $y \in B$
 - iii) $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{a, b, c, d\}$, $\mathcal{R} = \{(1, a), (2, a), (3, d), (4, b), (5, c)\}$ Es función.
 - iv) $A = \mathbb{N}, B = \mathbb{R}, \mathcal{R} = \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{R} \mid a = 2b 3\}$ Es función.
 - v) $A = \mathbb{R}, B = \mathbb{N}, \mathcal{R} = \{(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{N} \mid a = 2b 3\}$ No es función, $\sqrt{2} \mathcal{R} b$ para ningún $b \in \mathbb{N}$
 - vi) $A = \mathbb{Z}, B = \mathbb{Z}, \mathcal{R} = \{(a,b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid a+b \text{ es divisible por 5}\}$ No es función, porque $0 \mathcal{R} 5 y 0 \mathcal{R} 10 y$ necesito que $\forall x \in \mathbb{Z}, \exists ! y \in \mathbb{Z}$
- **30.** Determinar si las siguientes funciones son inyectivas, sobreyectivas o biyectivas. Para las que sean biyectivas hallar la inversa y para la que no sean sobreyectivas hallar la imagen.
 - i) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 12x^2 5$ No es inyectiva, f(-1) = f(1). No es sobreyectiva, $\text{Im}(f) = [-5, +\infty)$.
 - ii) ***** Falta hacerlo!

Si querés mandarlo: Telegram $\to \bigcirc$, o mejor aún si querés subirlo en LATEX $\to \bigcirc$.

iii) ***** Falta hacerlo!

Si querés mandarlo: Telegram $\rightarrow \bigcirc$, o mejor aún si querés subirlo en \LaTeX

iv) $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{si } n \text{ es par} \\ n+1 & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$ Es inyectiva y sobreyectiva. $\forall m, m' \in \mathbb{N}$, $\begin{cases} f(2m) = \frac{2m}{2} = m \\ f(2m'-1) = 2m'-1+1 = 2m' \end{cases} \to \text{Si bien } f(8) = f(3)$ la función es sobreyectiva porque genera todo \mathbb{N} tan solo con la parte par de la función.

$$f^{-1}(n) = \begin{cases} 2n & \text{si } n \text{ es par} \\ n-1 & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$$
 Qué onda?



Ejercicios extras:

1. Probar la propiedad distributiva: $X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$

Tengo que hacer una doble inclusión: $\rightarrow \begin{cases} 1) & X \cap (Y \cup Z) \subseteq (X \cap Y) \cup (X \cap Z) \\ 2) & (X \cap Y) \cup (X \cap Z) \subseteq X \cap (Y \cup Z) \end{cases}$

- 1) $x \in X \cap (Y \cup Z)$ quiere decir que $x \in X$ y $\begin{cases} x \in Y \\ \lor \\ x \in Z \end{cases}$. Por lo tanto $\rightarrow \begin{cases} x \in X \cap Y \\ \lor \\ x \in X \cap Z \end{cases}$, lo que equivale a $x \in (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$ \checkmark .
- 2) Ahora hay que probar la vuelta. Uso razonamiento análogo. $x \in (X \cap Y) \cup (X \cap Z)$, por lo que $x \in X \cap Y \xrightarrow{\text{dado que}} x \in X \cap (Y \cup Z)$ $x \in X \cap Z \xrightarrow{\text{dado que}} x \in X \cap (Y \cup Z)$. Lo que quiere decir que $x \in X \cap (Y \cup Z)$

¿Estoy suponiendo cosas que debería demostrar, me estoy salteando pasos? Para que la solución quede más creíble usé que $S \subseteq S \cup T$ fue el dealbreaker.

2. Probar la propiedad $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

Tengo que hacer una doble inclusión $\rightarrow \begin{cases} 1) & (A \cap B)^c \subseteq A^c \cup B^c \\ 2) & A^c \cup B^c \subseteq (A \cap B)^c \end{cases}$

1) Prueba directa: Si $x \in (A \cap B)^c \Rightarrow x \in A^c \cup B^c$ Por hipótesis $x \in (A \cap B)^c \stackrel{\text{def}}{\Longleftrightarrow} x \notin A \lor x \notin B \Rightarrow x \in A^c \lor x \in B^c \Rightarrow x \in A^c \cup B^c$

A	B	$A^c \cup B^c$	$(A \cap B)^c$
V	V	F	F
V	F	V	V
F	V	V	V
F	F	V	V

Uso la tabla para ver la definición $x \in (A \cap B)^c \stackrel{\text{def}}{\Longleftrightarrow} x \notin A \lor x \notin B$

2) Pruebo por absurdo. Si $\forall x \in A^c \cup B^c \Rightarrow x \in (A \cap B)^c$

Supongo que $x \notin (A \cap B)^c \stackrel{\text{def}}{\iff} x \in (A \cap B) \xrightarrow{\text{por}} x \in A^c \cup B^c \to \left\{ \begin{array}{c} x \notin A \\ \lor \\ x \notin B \end{array} \right\}$, por lo que

 $x \notin A \cup B \Rightarrow x \notin A \cap B$ contradiciendo el supuesto, absurdo. Debe ocurrir que $x \in (A \cap B)^c$

A	B	$A \cap B$	$(A \cup B)$	$(A \cap B) \subseteq (A \cup B)$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	V
$\mid F \mid$	V	F	V	V
F	F	F	F	V

△3. Sea

$$\mathcal{F} = \{h : \{1, 2, 3, 4\} \to \{1, 2, \dots, 50\} / h \text{ es inyectiva}\}$$

. Definimos en \mathcal{F} la relación \mathcal{R} como

$$f \mathcal{R} g$$
 si y sólo si $\#(\operatorname{Im}(f) \setminus \operatorname{Im}(g)) = 0$ o 4.

- a) Analizar si \mathcal{R} es una relación reflexiva, simétrica, antisimétrica y/o transitiva.
- b) Sea $f \in \mathcal{F}$ definida como f(x) = x para $1 \le x \le 4$. Calcular cuántas funciones $g \in \mathcal{F}$ satisfacen $f \mathcal{R} g$

Observar que $f \in \mathcal{F}$ es una función que tiene un dominio con solo 4 elementos, es decir

$$\# \operatorname{Dom}(f) = 4 \ \forall f \in \mathcal{F},$$

y dado que f es inyectiva, todos los elementos de la imagen deben ser distintos, por lo tanto

$$\#\operatorname{Im}(f) = 4 \ \forall f \in \mathcal{F}$$

a) Reflexiva: Quiero ver que si $f \mathcal{R} f$. Esto debe ser cierto, ya que $A = \{ \operatorname{Im}(f) \setminus \operatorname{Im}(f) \} = \emptyset$ y $\# \emptyset \stackrel{!}{=} 0 \quad \forall f \in \mathcal{F}$. \mathcal{R} es reflexiva

Simétrica: Quiero ver que si $f \mathcal{R} g \Rightarrow g \mathcal{R} f$.

Si tengo que $f \mathcal{R} g$, sé algo sobre sus conjuntos Im ya que,

$$\begin{cases} \# \{ \operatorname{Im}(f) \setminus \operatorname{Im}(g) \} = 0 & \iff \operatorname{Im}(f) \stackrel{\bigstar}{=} \operatorname{Im}(g) \\ & o \\ \# \{ \operatorname{Im}(f) \setminus \operatorname{Im}(g) \} = 4 & \iff \operatorname{Im}(f) \stackrel{\bigstar^2}{\cap} \operatorname{Im}(g) = \varnothing \end{cases}$$

Entonces los conjuntos $\operatorname{Im}(f)$ y $\operatorname{Im}(g)$ están relacionados por un "=" y un "\cap", dos operadores simétricos por lo tanto $\mathcal R$ es simétrica. \checkmark

Antisimétrica: Quiero ver que si $f \mathcal{R} g \Rightarrow g \mathcal{R} f$, o también a veces está bueno pensarla la antisimetría como si $f \mathcal{R} g y g \mathcal{R} f \Rightarrow f = g$. Bajo la sospecha de que la función no es antisimétrica la segunda forma de pensarlo me ayuda a encontrar un *contra*ejemplo.

$$f \to \begin{cases} f(1) = 1 \\ f(2) = 2 \\ f(3) = 3 \\ f(4) = 4 \end{cases} \quad \text{y} \quad g \to \begin{cases} g(1) = 4 \\ g(2) = 3 \\ g(3) = 2 \\ g(4) = 1 \end{cases}$$

 $\begin{cases} f \mathcal{R} g, \text{ sus imágenes cumplen} \bigstar^1 \\ g \mathcal{R} f, \text{ sus imágenes cumplen} \bigstar^1 \end{cases}, \text{ pero por como están definidas las funciones } f \neq g. \mathcal{R} \text{ no es antisimétrica.}$

Transitiva: Quiero ver que si $f \mathcal{R} g y g \mathcal{R} h \Rightarrow f \mathcal{R} h$.

Acá podemos encontrar un contraejemplo para mostrar que no es transitiva, saco de la galera 3

funciones, $f, g y h \in \mathcal{F}$

$$f \to \left\{ \begin{array}{l} f(1) = 1 \\ f(2) = 2 \\ f(3) = 3 \end{array} \right., \quad g \to \left\{ \begin{array}{l} g(1) = 5 \\ g(2) = 6 \\ g(3) = 7 \end{array} \right. \quad \text{y} \quad h \to \left\{ \begin{array}{l} h(1) = 1 \\ h(2) = 2 \\ h(3) = 9 \\ h(4) = 10 \end{array} \right.$$

 $\begin{cases} f \mathcal{R} g, \text{ sus imágenes cumplen} \bigstar^2 \\ g \mathcal{R} h, \text{ sus imágenes cumplen} \bigstar^2 \end{cases}, \text{ pero } f \mathcal{K} h \text{ dado que:}$

$$\{\operatorname{Im}(f) \ \backslash \ \operatorname{Im}(g)\} = \{3,4\} \Rightarrow \# \left\{\operatorname{Im}(f) \ \backslash \ \operatorname{Im}(g)\right\} = 2 \neq 0 \text{ o } 4.$$

 \mathcal{R} no es transitiva. $\mathbf{2}$

b) Para que f y g se relacionen se debe cumplir con \bigstar^1 o con \bigstar^2 . En otras palabras necesito encontrar funciones $g \in \mathcal{F}$ cuya imagen $\operatorname{Im}(g) = \{1, 2, 3, 4\}$ o su codominio sea $\underbrace{\operatorname{Cod} = \{5, 6, \dots, 49, 50\}}_{\#\operatorname{Cod}=46}$.

Contar cuando $Im(g) = \{1, 2, 3, 4\}$:

Hago la inyecci'on de los 4 valores que puede tomar la funci'on inyectiva g.

$$\begin{cases}
g \to g(1) & g(2) & g(3) & g(4) \\
\downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
\text{opciones} \to \#4 & \#3 & \#2 & \#1
\end{cases}$$

Hay 4! permutaciones ✓

Contar cuando codominio sea $Cod = \{5, 6, \dots, 49, 50\}$

Hago la inyecci'on de los 46 valores que puede tomar la funci\'on inyectiva g.

$$\begin{cases} g \rightarrow g(1) & g(2) & g(3) & g(4) \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ \text{opciones} \rightarrow \#46 & \#45 & \#44 & \#43 \end{cases}$$

Hay $\frac{46!}{42!}$ permutaciones \checkmark

Se concluye que hay un total de $\frac{46!}{42!} + 4!$ funciones $g \in \mathcal{F}/f \mathcal{R} g$

🛂. 🚼 Falta hacerlo!

Si querés mandarlo: Telegram $\rightarrow \bigcirc 3$, o mejor aún si querés subirlo en $\LaTeX \rightarrow \bigcirc 3$.