

Apunte único: Álgebra I - Práctica 2

Por alumnos de Álgebra I
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
UBA

Choose your destiny:

(doubleclick en los ejercicio para saltar)

- [Notas teóricas](#)

- Ejercicios de la guía:

1.	4.	7.	10.	13.	16.	19.	22.
2.	5.	8.	11.	14.	17.	20.	
3.	6.	9.	12.	15.	18.	21.	

- Ejercicios de Parciales

 1.	 2.	 3.	 4.	 5.	 6.	 7.	 ??.
--	--	--	--	--	--	--	---

Disclaimer:

Dirigido para aquél que esté listo para leerlo, o no tanto. Va con onda.

¡Recomendación para sacarle jugo al apunte!

Estudiar con resueltos puede ser un arma de doble filo. Si estás trabado, antes de saltar a la solución que hizo otra persona:

-  **0**₁ Mirar la solución ni bien te trabás, te *condicionas pavlovianamente* a **no** pensar. Necesitás darle tiempo al cerebro para llegar a la solución.
-  **0**₂ Intentá un ejercicio similar, pero **más fácil**.
-  **0**₃ ¿No sale el fácil? Intentá uno **aún más fácil**.
-  **0**₄ Fijate si tenés un ejercicio similar hecho en clase. Y mirá ese, así no quemás el ejercicio de la guía.
-  **0**₅ Tomate 2 minutos para formular una pregunta que realmente sea lo que **no** entendés. Decir '*no me sale*' \neq +. Escribí esa pregunta, vas a dormir mejor.

Ahora sí mirá la solución.

Si no te salen los ejercicios fáciles sin ayuda, no te van a salir los ejercicios más difíciles: **Sentido común**.

¡Los más fáciles van a salir! Son el alimento de nuestra confianza.

Si mirás miles de soluciones a parciales en el afán de tener un ejemplo hecho de todas las variantes, estás apelando demasiado a la suerte de que te toque uno igual, *pero no estás aprendiendo nada*. Hacer un parcial bien lleva entre 3 y 4 horas. Así que si vos en 4 horas "hiciste" 3 o 4 parciales, *algo raro debe haber*. A los parciales se va a **pensar** y eso hay que practicarlo desde el primer día.

Mirá los videos de las teóricas **de Teresa** que son **buenísimos** .

Videos de prácticas de pandemia, complemento extra: **Prácticas Pandemia** .

Los ejercicios que se dan en clase suelen ser similares a los parciales, a veces más difíciles, repasalos siempre **Just Do IT** .

Eh, loco, fatalista, distópico, **relajá un toque** te vas a quedar (más) pelado...  **va a salir todo bien!**

El repo en [github](#)  para descargar las guías con los últimos updates.



<https://github.com/nad-garraz/algebraUno>

La Guía 2 se actualizó por última vez: **17/12/24 @ 10:48**

Guía 2



<https://github.com/nad-garraz/algebraUno/blob/main/2-guia/2-sol.pdf>

Si querés mandar un ejercicio o avisar de algún error, lo más fácil es por

[Telegram](#) .



<https://t.me/+1znt2GV1i8cwMTNh>

Notas teóricas:

✦ Propiedades de la sumatoria y productoria:

$$\blacktriangleright \left(\sum_{k=1}^n a_k \right) + \left(\sum_{k=1}^n b_k \right) = \sum_{k=1}^n (a_k + b_k)$$

▮ Sea c un número dado:

$$\sum_{k=1}^n (c \cdot a_k) = c \cdot \sum_{k=1}^n a_k$$

$$\blacktriangleright \left(\prod_{k=1}^n a_k \right) \cdot \left(\prod_{k=1}^n b_k \right) = \prod_{k=1}^n (a_k b_k)$$

▮ Sea c un número dado:

$$\prod_{k=1}^n (c \cdot a_k) = \left(\prod_{k=1}^n c \right) \cdot \left(\prod_{k=1}^n a_k \right) = c^n \cdot \prod_{k=1}^n a_k$$

✦ Suma de Gauss:

$$\forall n \in \mathbb{N} : \sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + \dots + (n-1) + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Y cuando empieza desde $i = 0$ u otro valor se hace:

$$\sum_{i=0}^n i \stackrel{!}{=} 1 + \sum_{i=1}^n i \stackrel{!}{=} 1 + \frac{n \cdot (n+1)}{2} \quad \checkmark$$

✦ Suma geométrica:

$$\forall n \in \mathbb{N} : \sum_{i=0}^n q^i = 1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1} + q^n = \begin{cases} n+1 & \text{si } q = 1 \\ \frac{q^{n+1}-1}{q-1} & \text{si } q \neq 1 \end{cases}$$

Y cuando empieza desde $i = 1$ u otro valor se hace:

$$\sum_{i=1}^n q^i \stackrel{!}{=} -1 + 1 + \sum_{i=1}^n q^i \stackrel{!}{=} -1 + \sum_{i=0}^n q^i = \begin{cases} -1 + n + 1 = n & \text{si } q = 1 \\ -1 + \frac{q^{n+1}-1}{q-1} = \frac{q^{n+1}-q}{q-1} & \text{si } q \neq 1 \end{cases}$$

✦ Inducción:

Sea $H \subseteq \mathbb{R}$ un conjunto. Se dice que H es un conjunto *inductivo* si se cumplen las dos condiciones siguiente:

- $1 \in H$
- $\forall x, x \in H \Rightarrow x + 1 \in H$

✦ Principio de inducción: **que se usará infinitas veces**

Sea $p(n), n \in \mathbb{N}$, una afirmación sobre los números naturales.

Si $p(n)$ satisface:

✦ Caso Base:

$p(1)$ es Verdadera.

✦ Paso inductivo:

$\forall h \in \mathbb{N}, p(h)$ es Verdadera $\Rightarrow p(h+1)$ también es Verdadera,

entonces $p(n)$ es Verdadera $\forall n \in \mathbb{N}$.

✦ Principio de inducción *corrido*: A los fines prácticos todos los principios corridos y la mar en coche, son iguales... bueh, son muy parecidos de resolver.

Ejercicios de la guía:

1.

i) Reescribir cada una de las siguientes sumas usando el símbolo de sumatoria

a) $1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + 100$

d) $1 + 9 + 25 + 49 + \cdots + 441$

b) $1 + 2 + 4 + 8 + 16 + \cdots + 1024$

e) $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n + 1)$

c) $1 + (-4) + 9 + (-16) + 25 + \cdots + (-144)$

f) $n + 2n + 3n + \cdots + n^2$

ii) Reescribir cada una de los siguientes productos usando el símbolo de productoria y/o de factorial.

¿Cómo resolver este ejercicio?

Lo que queremos hacer es compactar la suma para evitar el uso de puntos suspensivos, la notación ideal para esos casos es el símbolo de sumatoria. El primer paso es fijarse en el comportamiento de cada término de nuestra suma. Por ejemplo, en el punto **b)** notamos que cada término comienza a duplicarse.

i) a) $1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + 100 = \sum_{i=1}^{100} i$

b) $1 + 2 + 4 + 8 + 16 + \cdots + 1024 = \sum_{i=0}^{10} 2^i$

c) $1 + (-4) + 9 + (-16) + 25 + \cdots + (-144) = \sum_{i=1}^{12} i^2 (-1)^{n+1}$

d) $1 + 9 + 25 + 49 + \cdots + 441 = \sum_{i=0}^{10} (1 + 2i)^2$

e) $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n + 1) = \sum_{i=0}^n 2i + 1$

f) $n + 2n + 3n + \cdots + n^2 = \sum_{i=1}^n in$

ii) a) $5 \cdot 6 \cdots 99 \cdot 100 = \prod_{i=5}^{100} i = \frac{100!}{4!}$

b) $1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 16 \cdots 1024 = \prod_{i=0}^{10} 2^i$

c) $n \cdot 2n \cdot 3n \cdots n^2 = \prod_{i=1}^n in = n^n \cdot n!$

2. Escribir los dos primeros y los dos últimos términos de las expresiones siguientes

i) $\sum_{i=6}^n 2(i - 5)$

ii) $\sum_{i=n}^{2n} \frac{1}{i(i+1)}$

iii) $\sum_{i=1}^n \frac{n+i}{2^i}$

iv) $\sum_{i=1}^{n^2} \frac{n}{i}$

v) $\prod_{i=1}^n \frac{n+i}{2i-3}$

Llamo t_1, t_2 a los primeros términos y t_{m-1}, t_m a los últimos

$$\text{i)} \sum_{i=6}^n 2(i-5)$$

$$t_1 = 2(6-5) = 2 \quad t_2 = 2(7-5) = 4$$

$$t_{m-1} = 2((n-1)-5) = 2n-12 \quad t_m = 2(n-5) = 2n-10$$

$$\text{ii)} \sum_{i=n}^{2n} \frac{1}{i(i+1)}$$

$$t_1 = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n^2+n} \quad t_2 = \frac{1}{(n+1)((n+1)+1)} = \frac{1}{n^2+3n+2}$$

$$t_{m-1} = \frac{1}{(2n-1)(2n-1+1)} = \frac{1}{4n^2-2n} \quad t_m = \frac{1}{2n(2n+1)} = \frac{1}{4n^2+2n}$$

$$\text{iii)} \sum_{i=1}^n \frac{n+i}{2i}$$

$$t_1 = \frac{n+1}{2} \quad t_2 = \frac{n+2}{4}$$

$$t_{m-1} = \frac{n+(n-1)}{2(n-1)} = \frac{2n-1}{2n-2} \quad t_m = \frac{n+n}{2n} = \frac{2n}{2n} = 1$$

$$\text{iv)} \sum_{i=1}^{n^2} \frac{n}{i}$$

$$t_1 = n \quad t_2 = \frac{n}{2}$$

$$t_{m-1} = \frac{n}{n^2-1} \quad t_m = \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n}$$

$$\text{v)} \prod_{i=1}^n \frac{n+i}{2i-3}$$

$$t_1 = \frac{n+1}{2-3} = -n-1 \quad t_2 = \frac{n+2}{4-3} = n+2$$

$$t_{m-1} = \frac{n+(n-1)}{2(n-1)-3} = \frac{2n-1}{2n-5} \quad t_m = \frac{n+n}{2n-3} = \frac{2n}{2n-3}$$

Dale las gracias y un poco de amor  a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:

 Gabriel Garcia 

 Nad Garraz 

 Fedemisterio 

3. Calcular

$$\text{i)} \sum_{i=1}^n (4i+1)$$

$$\text{ii)} \sum_{i=6}^n 2(i-5)$$

Para resolver estos ejercicios haremos uso la notas teóricas, en particular \sum y \prod .

$$\text{i)} \sum_{i=1}^n (4i+1) = \left(\sum_{i=1}^n 4i\right) + \left(\sum_{i=1}^n 1\right) = \left(4 \cdot \sum_{i=1}^n i\right) + n = 4 \cdot \frac{n(n+1)}{2} + n = \boxed{2n^2 + 3n}$$

$$\begin{aligned} \text{ii)} \sum_{i=6}^n 2(i-5) &= 2 \cdot \sum_{i=6}^n (i-5) = 2 \cdot \left[\left(\sum_{i=6}^n i\right) - \left(\sum_{i=6}^n 5\right)\right] = 2 \cdot \left[\left(\sum_{i=0}^n i\right) - \left(\sum_{i=0}^5 i\right) - 5(n-5)\right] \\ &= 2 \cdot \left(\frac{n(n+1)}{2} - \frac{5(5+1)}{2} - 5n + 25\right) = 2 \cdot \left(\frac{n(n+1)}{2} - 5n + 10\right) = n(n+1) - 10n + 20 = \boxed{n^2 - 9n + 20} \end{aligned}$$

4. Calcular

i) $\sum_{i=0}^n 2^i$

iii) $\sum_{i=0}^n q^{2i}, \quad q \in \mathbb{R} - \{0\}$

ii) $\sum_{i=1}^n q^i \quad q \in \mathbb{R}$

iv) $\sum_{i=1}^{2n} q^i \quad q \in \mathbb{R}$

i) $\sum_{i=0}^n 2^i = \frac{2^{n+1}-1}{2-1} = 2^{n+1} - 1$

$$\text{ii) } \sum_{i=1}^n q^i = -1 + 1 + \sum_{i=1}^n q^i = -1 + \sum_{i=0}^n q^i = \begin{cases} n+1-1 = n & \text{si } q = 1 \\ \frac{q^{n+1}-1}{q-1} - 1 = \underbrace{\frac{q^{n+1}-q}{q-1}}_{\star^1 \sum_{k=1}^n q^i} & \text{si } q \neq 1 \end{cases}$$

$$\text{iii) } \sum_{i=0}^n q^{2i} \stackrel{!}{=} 1 + \sum_{i=1}^n q^{2i} = \begin{cases} 1 + \underbrace{q^2 + q^4 + \dots + (q^{n-1})^2 + q^{2n}}_{n \text{ elementos}} = n+1 & \text{si } q = \pm 1 \\ 1 + \underbrace{(q^2)^1 + (q^2)^2 + \dots + (q^2)^{n-1} + (q^2)^n}_{n \text{ elementos}} = \frac{(q^2)^{n+1} - q^2}{q^2 - 1} + 1 = \frac{q^{2(n+1)} - 1}{q^2 - 1} & \text{si } q \neq \pm 1 \end{cases}$$

$$\text{iv) } \sum_{i=1}^{2n} q^i \stackrel{?}{=} \begin{cases} 2n & \text{si } q = 1 \\ \frac{q^{2n+1} - q}{q - 1} & \text{si } q \neq 1 \end{cases}$$

Dale las gracias y un poco de amor  a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:

 Nad Garraz 

5. Probar que, $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{i=1}^n (2i - 1) = n^2$:

i) Contando de dos maneras la cantidad total de cuadraditos del diagrama. (**hacer diagrama**)

ii) Usando la suma aritmética (o suma de Gauss).

iii) Usando el principio de inducción.

i)

$$\text{ii) } s = \underbrace{\frac{n(n+1)}{2}}_{\text{Gauss}} = \sum_{i=1}^n i \rightarrow \sum_{i=1}^n 2i - 1 = 2 \sum_{i=1}^n i - \sum_{i=1}^n 1 = 2 \frac{n(n+1)}{2} - n = n^2 + n - n = n^2 \quad \checkmark$$

iii) *Proposición:*

$$p(n) : \sum_{i=1}^n (2i - 1) = n^2 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\text{Caso base : } p(1) : \sum_{i=1}^1 2i - 1 = 1 = 1^2 \Rightarrow p(1) \text{ es verdadera.} \quad \checkmark$$

Paso inductivo: $p(h) : \sum_{i=1}^h 2i - 1 = k^2$ verdadera con $h \in \mathbb{Z} \Rightarrow$ quiero ver que $\sum_{i=1}^{h+1} 2i - 1 \stackrel{?}{=} (h+1)^2$.

$$\sum_{i=1}^{h+1} 2i - 1 = \sum_{i=1}^h (2i - 1) + 2(h+1) - 1 \stackrel{\text{HI}}{=} h^2 + 2h + 1 = (h+1)^2 \quad \checkmark$$

Dado que $p(1)$, $p(h)$, $p(h+1)$ resultaron verdaderas, por criterio de inducción también lo es $p(n) \in \mathbb{N}$

6. (*Suma de cuadrados y de cubos*) Probar que para todo $n \in \mathbb{N}$ se tiene

$$\text{i)} \quad \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\text{ii)} \quad \sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

$$\text{i)} \quad \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Proposición: $p(n) : \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Caso base: $p(1)$ verdadero $\iff \sum_{i=1}^1 i^2 = \frac{1(1+1)(2 \cdot 1 + 1)}{6} \iff 1 = \frac{2 \cdot 3}{6} \iff 1 = 1 \quad \checkmark$

Paso Inductivo: Sea $k \in \mathbb{N}$. Supongo $\underbrace{p(k)}_{\text{HI}}$ verdadero, quiero ver que $p(k+1)$ verdadero.

$$\begin{aligned} p(k+1) \text{ Verdadero} &\iff \sum_{i=1}^{k+1} i^2 = \frac{(k+1)((k+1)+1)(2(k+1)+1)}{6} \\ &\iff \left(\sum_{i=1}^k i^2 \right) + (k+1)^2 = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6} \\ &\stackrel{\text{HI}}{\iff} \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 = \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6} \\ &\iff k(k+1)(2k+1) + 6(k+1)^2 = (k+1)(k+2)(2k+3) \\ &\iff k(2k+1) + 6(k+1) = (k+2)(2k+3) \\ &\iff 2k^2 + 7k + 6 = 2k^2 + 7k + 6 \quad \checkmark \end{aligned}$$

Como se cumple tanto el *caso base* como el *paso inductivo*, por el principio de inducción $p(n)$ es verdadero $\forall n \in \mathbb{N}$.

$$\text{ii)} \quad \sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

$P(n) : \sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Caso Base: $P(1) : \sum_{i=1}^1 i^3 = \frac{1^2(1+1)^2}{4} \iff 1 = \frac{4}{4} \iff 1 = 1 \quad \checkmark$

Paso Inductivo: Sea $k \in \mathbb{N}$. Supongo $\underbrace{P(k)}_{\text{HI}}$ Verdadero, quiero ver que $P(k+1)$ Verdadero.

$$\begin{aligned}
 P(k+1)\text{Verdadero} &\iff \sum_{i=1}^{k+1} i^3 = \frac{(k+1)^2((k+1)+1)^2}{4} \\
 &\iff \left(\sum_{i=1}^k i^3\right) + (k+1)^3 = \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4} \\
 &\stackrel{\text{HI}}{\iff} \frac{k^2(k+1)^2}{4} + (k+1)^3 = \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4} \\
 &\iff k^2(k+1)^2 + 4(k+1)^3 = (k+1)^2(k+2)^2 \\
 &\iff k^2 + 4(k+1) = (k+2)^2 \\
 &\iff k^2 + 4k + 4 = k^2 + 4k + 4 \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

Como se cumple tanto el caso base como el paso inductivo, por el principio de inducción $P(n)$ es verdadero $\forall n \in \mathbb{N}$.

7. Probar que para todo $n \in \mathbb{N}$ se tiene

- i) $\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} i^2 = \frac{(-1)^{n+1} n(n+1)}{2}$
- ii) $\sum_{i=1}^n (2i+1)3^{i-1} = n3^n$
- iii) $\sum_{i=1}^n \frac{i2^i}{(i+1)(i+2)} = \frac{2^{n+1}}{n+2} - 1$
- iv) $\prod_{i=1}^n (1 + a^{2^{i-1}}) = \frac{1-a^{2^n}}{1-a}, a \in \mathbb{R} - \{1\}$
- v) $\prod_{i=1}^n \frac{n+i}{2i-3} = 2^n(1-2n)$

i) *Proposición*:

$$p(n) : \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} i^2 = \frac{(-1)^{n+1} n(n+1)}{2} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Caso base:

$$p(\textcolor{red}{1}) : \sum_{i=1}^{\textcolor{red}{1}} (-1)^{i+1} i^2 = (-1)^2 \cdot 1 = 1 \stackrel{!}{=} \frac{(-1)^{\textcolor{red}{1}+1} \textcolor{red}{1}(\textcolor{red}{1}+1)}{2} = 1 \quad \checkmark$$

$p(1)$ resulta ser verdadera.

Paso inductivo: Asumo que

$$p(\textcolor{blue}{k}) : \underbrace{\sum_{i=1}^{\textcolor{blue}{k}} (-1)^{i+1} i^2}_{\text{hipótesis inductiva}} = (-1)^{\textcolor{blue}{k}+1} \frac{\textcolor{blue}{k}(\textcolor{blue}{k}+1)}{2}$$

es verdadera. Entonces quiero ver que:

$$p(\textcolor{blue}{k}+1) : \sum_{i=1}^{\textcolor{blue}{k}+1} (-1)^{i+1} i^2 = (-1)^{(\textcolor{blue}{k}+1)+1} \frac{(\textcolor{blue}{k}+1)(\textcolor{blue}{k}+1+1)}{2}.$$

también lo sea.

Para probar arranco de $p(k+1)$ y en medio uso la **hipótesis inductiva** para resolver:

$$\sum_{i=1}^{k+1} (-1)^{i+1} i^2 = \sum_{i=1}^k (-1)^{i+1} i^2 + (-1)^{k+2} (k+1)^2 \stackrel{\text{HI}}{=} (-1)^{k+1} \frac{k(k+1)}{2} + (-1)^k (-1)^2 (k+1)^2 \stackrel{\text{!!!}}{=} (-1)^k (k+1) \frac{(k+2)}{2} \quad \checkmark$$

Por lo tanto $p(k+1)$ resulta ser verdadera también.

Si te quedaste ahí pedaleando en el aire en el **!!!** es solo acomodar la expresión, nada raro, algún factor común, $\underbrace{(-1)^2 = 1}_{\oplus}$ y coso... **power!**. Si lo hago yo es puro spoiler y no ganás nada.

Dado que $p(1)$, $p(k)$, $p(k+1)$ resultaron verdaderas, por criterio de inducción también lo es $p(n) \in \mathbb{N}$

ii) *Proposición:*

$$p(n) : \sum_{i=1}^n (2i+1)3^{i-1} = n3^n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Caso base:

$$p(\textcolor{violet}{1}) : \sum_{i=1}^{\textcolor{violet}{1}} (2i+1)3^{i-1} = (2 \cdot \textcolor{violet}{1} + 1) \cdot 3^{\textcolor{violet}{1}-1} = 3 \stackrel{\textcolor{violet}{!}}{=} \textcolor{violet}{1} \cdot 3^{\textcolor{violet}{1}} = 3$$

$p(1)$ resulta ser verdadera

Paso inductivo: Asumo que

$$\underbrace{p(\textcolor{teal}{k}) : \sum_{i=1}^n (2i+1)3^{i-1} = \textcolor{teal}{k}3^{\textcolor{teal}{k}}}_{\text{hipótesis inductiva}}$$

es verdadera. Entonces quiero ver que

$$p(\textcolor{teal}{k}+1) : \sum_{i=1}^{\textcolor{teal}{k}+1} (2i+1)3^{i-1} = (\textcolor{teal}{k}+1)3^{\textcolor{teal}{k}+1}$$

también lo sea.

Muy parecido al ejercicio anterior:

$$\sum_{i=1}^{k+1} (2i+1)3^{i-1} = \sum_{i=1}^k (2i+1)3^{i-1} + (2(k+1)+1)3^{(k+1)-1} \stackrel{\text{HI}}{=} k3^k + 3^k(2k+3) \stackrel{\text{!!!}}{=} (k+1) \cdot 3^{k+1}$$

Y sí, en el **!!!** hay más cuentas. Pero ya a esta altura te vas dando cuenta de que la parte de *inducción* no estaría siendo el desafío, sino que (en estos ejercicios) son las cuentas, por eso mirá fijo las cuentas y dale tiempo a tu 🍷 para que encuentre el factor común etc ¡Curtite, vieja!. Las cuentas son en gran medida lo que complica los parciales, no tanto los temas.

Dado que $p(1)$, $p(k)$ y $p(k+1)$ resultaron verdaderas, por el criterio de inducción también lo es $p(n) \in \mathbb{N}$

iii) *Proposición:* $p(n) : \sum_{i=1}^n \frac{i2^i}{(i+1)(i+2)} = \frac{2^{n+1}}{n+2} - 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Caso base: $p(1) : \sum_{i=1}^1 \frac{i2^i}{(i+1)(i+2)} = \frac{1 \cdot 2^1}{(1+1)(1+2)} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} = \frac{2^2-3}{1+2} \Rightarrow p(1)$ es verdadera \checkmark

Paso inductivo: Asumo $p(n) : \sum_{i=1}^n \frac{i2^i}{(i+1)(i+2)} = \frac{2^{n+1}}{n+2} - 1$ como verdadera.

$\Rightarrow p(n+1)$: quiero ver que $\sum_{i=1}^{n+1} \frac{i2^i}{(i+1)(i+2)} = \frac{2^{(n+1)+1}}{(n+1)+2} - 1$ también lo sea.

$$\sum_{i=1}^{n+1} \frac{i2^i}{(i+1)(i+2)} = \sum_{i=1}^n \frac{i2^i}{(i+1)(i+2)} + \frac{(n+1)2^{n+1}}{((n+1)+1)((n+1)+2)} \stackrel{\text{HI}}{=} \frac{2^{n+1}}{n+2} - 1 + \frac{(n+1)2^{n+1}}{((n+1)+1)((n+1)+2)}$$

Si $\frac{2^{n+1}}{n+2} - 1 + \frac{(n+1)2^{n+1}}{((n+1)+1)((n+1)+2)} = \frac{2^{(n+1)+1}}{(n+1)+2} - 1 \Rightarrow$ sera verdadero

$$\begin{aligned} \frac{2^{n+1}}{n+2} - 1 + \frac{(n+1)2^{n+1}}{(n+2)(n+3)} &= \frac{2^{n+2}}{n+3} - 1 \\ (n+3) \frac{2^{n+1}}{n+2} + \frac{(n+1)2^{n+1}}{(n+2)} &= 2^{n+2} \\ (n+3)2^{n+1} + (n+1)2^{n+1} &= 2^{n+2}(n+2) \\ (n+3) + (n+1) &= 2(n+2) \\ 2n+4 &= 2(n+2) \\ 2n+4 &= 2n+4 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

iv) $\prod_{i=1}^n (1 + a^{2^{i-1}}) = \frac{1-a^{2^n}}{1-a}$

Caso Base:

$$p(1) : \prod_{i=1}^1 (1 + a^{2^{i-1}}) = 1 + a^{2^0} = 1 + a = \frac{1-a^{2^1}}{1-a} = \frac{(1-a)(1+a)}{1-a} = 1 + a \quad \checkmark$$

Por lo cual $p(1)$ resultó ser verdadera.

Paso inductivo :

$$p(k) : \text{Asumo que } \underbrace{\prod_{i=1}^k (1 + a^{2^{i-1}}) = \frac{1-a^{2^k}}{1-a}}_{\text{hipótesis inductiva}} \text{ es verdadera.}$$

Entonces quiero ver que:

$$p(k+1) : \prod_{i=1}^{k+1} (1 + a^{2^{i-1}}) = \frac{1-a^{2^{k+1}}}{1-a}$$

también lo sea.

Arranco de $p(k+1)$ y usando la **hipótesis inductiva** trato de llegar al valor esperado:

$$\prod_{i=1}^{k+1} (1 + a^{2^{i-1}}) \stackrel{!}{=} (1 + a^{2^k}) \cdot \prod_{i=1}^k (1 + a^{2^{i-1}}) \stackrel{\text{HI}}{=} (1 + a^{2^k}) \cdot \frac{1-a^{2^k}}{1-a} \stackrel{!!}{=} \frac{1-(a^{2^k})^2}{1-a} = \frac{1-a^{2 \cdot 2^k}}{1-a} = \frac{1-a^{2^{k+1}}}{1-a} \quad \checkmark$$

Si te quedaste pedaleando en los **!**, pensá en *diferencia de cuadrados*, *propiedades de potencias* y coso 🖐.

Esto muestra que $p(k+1)$ también es verdadera.

Como $p(1)$, $p(k)$ y $p(k+1)$ son verdaderas por el principio de inducción $p(n)$ es verdadera $\forall n \in \mathbb{N}$.

$$v) \prod_{i=1}^n \frac{n+i}{2i-3} = 2^n(1-2n)$$

En este ejercicio conviene abrir la productoria y acomodar los factores. Por inducción:

$$p(n) : \prod_{i=1}^n \frac{n+i}{2i-3} = 2^n(1-2n)$$

Caso Base:

$$p(1) : \prod_{i=1}^1 \frac{1+i}{2i-3} = \frac{1+1}{2 \cdot 1 - 3} = 2^1(1-2 \cdot 1) = -2$$

Paso inductivo:

$$p(k) : \prod_{i=1}^k \frac{k+i}{2i-3} = 2^k(1-2k) \text{ asumo verdadera para algún } k \in \mathbb{N}$$

hipótesis inductiva

$$\xrightarrow[\text{ver que}]{\text{quiero}} p(k+1) : \prod_{i=1}^{k+1} \frac{k+1+i}{2i-3} = 2^{k+1}(1-2(k+1)) \text{ también lo sea para algún } k \in \mathbb{N}.$$

Nota que puede ser de utilidad: Esta productoria tiene a la n en el término general. Cuando pasa esto en el ejercicio, abrir la productoria para acomodar los factores y así formar la HI, suele ser el camino a seguir, **ojo con modificar el término general**.

Fin nota que puede ser de utilidad

$$\prod_{i=1}^k \frac{k+i}{2i-3} = \frac{k+1}{2 \cdot 1 - 3} \cdot \frac{k+2}{2 \cdot 2 - 3} \cdot \frac{k+3}{2 \cdot 3 - 3} \cdots \frac{2k}{2 \cdot k - 3} = 2^k(1-2k)$$

$$\prod_{i=1}^{k+1} \frac{k+1+i}{2i-3} = \frac{k+2}{2 \cdot 1 - 3} \cdot \frac{k+3}{2 \cdot 2 - 3} \cdots \frac{k+1+(k-1)}{2(k-1)-3} \cdot \frac{k+1+k}{2k-3} \cdot \frac{k+1+(k+1)}{2(k+1)-3} \stackrel{\star^1}{=} \frac{1}{2 \cdot 1 - 3} \cdot \frac{k+2}{2 \cdot 2 - 3} \cdot \frac{k+3}{2 \cdot 3 - 3} \cdots \frac{2k}{2k-3} \cdot \frac{2k+1}{2(k+1)-3} \cdot \frac{2k+2}{1}$$

$$\stackrel{\star^2}{=} \underbrace{\frac{k+1}{2 \cdot 1 - 3} \cdot \frac{k+2}{2 \cdot 2 - 3} \cdot \frac{k+3}{2 \cdot 3 - 3} \cdots \frac{2k}{2k-3}}_{\text{hipótesis inductiva}} \cdot \frac{2k+1}{2(k+1)-3} \cdot \frac{2k+2}{k+1} \stackrel{\text{HI}}{=} 2^k(1-2k) \cdot \frac{2k+1}{2(k+1)-3} \cdot \frac{2k+2}{k+1} \stackrel{!}{=} 2^{k+1}(1-2(k+1)) \quad \checkmark$$

En \star^1 Corro los denominadores un lugar hacia la izquierda. Pinto con rojo las fracciones de los bordes solo para ayuda visual.

En \star^2 multiplico por $1 = \frac{k+1}{k+1}$ y lo ubico en los lugares *apropiados* para que me aparezca la hipótesis inductiva.

Si te preguntás qué pasó en $!$, eso son cuentas, *simplificá, factorizá* y yo que sé, que te dejo a vos, por mi parte yo 🙌.

Como $p(1)$, $p(k)$ y $p(k+1)$ son verdaderas por el principio de inducción $p(n)$ es verdadera $\forall n \in \mathbb{N}$.

Dale las gracias y un poco de amor ❤ a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:

👤 Iñaki Frutos 🗨

👤 Nad Garraz 🗨

8. Sea $a, b \in \mathbb{R}$. Probar que para todo $n \in \mathbb{N}$, $a^n - b^n = (a-b) \sum_{i=1}^n a^{i-1} b^{n-i}$. Deducir la fórmula de la serie geométrica: para todo $a \neq 1$, $\sum_{i=0}^n a^i = \frac{a^{n+1}-1}{a-1}$.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Primer paso: } n = 1(a - b) \sum_1^1 a^{i-1} \cdot b^{1-1} = a - b = a^1 - b^1 \quad \checkmark \\ \text{Paso inductivo: } n = ka^k - b^k = (a - b) \sum_{i=1}^k a^{i-1} \cdot b^{k-i} \Rightarrow a^{k+1} - b^{k+1} \stackrel{?}{=} (a - b) \sum_{i=1}^{k+1} a^{i-1} \cdot b^{k+1-i} \\ \left\{ \begin{array}{l} (a - b) \sum_{i=1}^{k+1} a^{i-1} \cdot b^{k+1-i} = (a - b) \sum_{i=1}^k a^{i-1} \cdot \underbrace{b^{k+1-i}}_{b \cdot b^{k-i}} + \underbrace{(a - b)a^k \cdot b^{k+1-(k+1)}}_{k+1\text{-ésimo}} = \\ b \cdot \underbrace{(a - b) \sum_{i=1}^k a^{i-1} \cdot b^{k-i}}_{\text{HI}} + (a - b)a^k \stackrel{\text{HI}}{=} b \cdot a^k - b^k + (a - b)a^k = a^{k+1} - b^{k+1} \quad \checkmark \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Para deducir la fórmula de la serie geométrica $b = 1 \rightarrow (a - 1) \sum_{i=1}^n a^{i-1} = a^n - 1 \rightarrow$

$$\left\{ \begin{array}{l} (a - 1) \sum_1^n a^{i-1} = (a - 1) \cdot (1 + a + a^2 + \dots + a^{n-1}) = a^n - 1 \xrightarrow[\text{divido por } (a - 1) \text{ M.A.M.}]{\text{multiplico por } a \text{ y}} \\ \sum_1^n a^i = a + a^2 + \dots + a^n = \frac{a^{n+1} - a}{a - 1} \xrightarrow[\text{M.A.M.}]{\text{sumo un } 1} \sum_{i=0}^n a^i = 1 + a + a^2 + \dots + a^n = \frac{a^n - a}{a - 1} + 1 \rightarrow \\ \boxed{\frac{a^n + 1}{a - 1} = \sum_{i=0}^n a^i} \end{array} \right.$$

9.

- i) Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de números reales. Probar que $\sum_1^n (a_{i+1} - a_i) = a_{n+1} - a_1$.
- ii) Calcular $\sum_1^n \frac{1}{i(i+1)}$ (Sugerencia: $\frac{1}{i(i+1)} = \frac{1}{i} - \frac{1}{i+1}$).
- iii) Calcular $\sum_1^n \frac{1}{(2i-1)(2i+1)}$ (Sugerencia: calcular $\frac{1}{2i-1} - \frac{1}{2i+1}$).

- i) Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de números reales. Sea $n \in \mathbb{N}$ y

$$P(n) : \sum_1^n (a_{i+1} - a_i) = a_{n+1} - a_1$$

- 1) Caso base, $n = 1$:

$$P(1) : \sum_{i=1}^1 (a_{i+1} - a_i) = a_{1+1} - a_1$$

$$P(1) : a_2 - a_1 = a_2 - a_1$$

$$P(1) : V$$

- 2) Paso inductivo. Sea $n \in \mathbb{N}$:

$$\text{HI. } P(n) : V$$

$$\text{TI. } P(n+1) : \sum_{i=1}^{n+1} (a_{i+1} - a_i) = a_{n+2} - a_1$$

Desarrollo la TI:

$$P(n+1) : \sum_{i=1}^{n+1} (a_{i+1} - a_i) = a_{n+2} - a_{n+1} + \sum_1^n (a_{i+1} - a_i) \stackrel{\text{HI}}{=} a_{n+2} - a_{n+1} + a_{n+1} - a_1$$

$$P(n+1) : \sum_{i=1}^{n+1} (a_{i+1} - a_i) = a_{n+2} - a_1$$

$$P(n+1) : V$$

Tenemos que

$$P(1) : V$$

$$P(n) : V \implies P(n+1) : V$$

y esto implica que $P(n) : V \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} \text{ii)} \quad \sum_1^n \frac{1}{i(i+1)} &= \sum_1^n \left(\frac{1}{i} - \frac{1}{i+1} \right) = - \sum_1^n \left(\frac{1}{i+1} - \frac{1}{i} \right) \stackrel{\text{Aux}}{=} - \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{1} \right) \\ &= - \left(\frac{1-(n+1)}{n+1} \right) = - \left(\frac{-n}{n+1} \right) = \frac{n}{n+1} \end{aligned}$$

Auxiliar

Sea $a_n = \frac{1}{n}$, donde $n \in \mathbb{N}$. Queremos calcular $\sum_1^n \left(\frac{1}{i+1} - \frac{1}{i} \right)$.

$$\sum_1^n \left(\frac{1}{i+1} - \frac{1}{i} \right) = \sum_1^n (a_{i+1} - a_i) \stackrel{9.i)}{=} a_{n+1} - a_1 = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{1}$$

$$\begin{aligned} \text{iii)} \quad \sum_1^n \frac{1}{(2i-1)(2i+1)} &\stackrel{\text{Aux.1}}{=} \sum_1^n \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2i-1} - \frac{1}{2i+1} \right) = \frac{1}{2} \sum_1^n \left(\frac{1}{2i-1} - \frac{1}{2i+1-2+2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_1^n \left(\frac{1}{2i-1} - \frac{1}{2i+2-2+1} \right) = \frac{1}{2} \sum_1^n \left(\frac{1}{2i-1} - \frac{1}{2(i+1)-2+1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_1^n \left(\frac{1}{2i-1} - \frac{1}{2(i+1)-1} \right) = \frac{1}{2} \sum_1^n - \left(\frac{1}{2(i+1)-1} - \frac{1}{2i-1} \right) \\ &= - \frac{1}{2} \sum_1^n \left(\frac{1}{2(i+1)-1} - \frac{1}{2i-1} \right) \stackrel{\text{Aux.2}}{=} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2(n+1)-1} - \frac{1}{2 \cdot 1 - 1} \right) \\ &= - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n+1} - 1 \right) = - \frac{1}{2} \left(\frac{1-(2n+1)}{2n+1} \right) = - \frac{1}{2} \left(\frac{-2n}{2n+1} \right) \\ &= \frac{n}{2n+1} \end{aligned}$$

Auxiliar 1

Calculamos la sugerencia dada

$$\begin{aligned} \frac{1}{2i-1} - \frac{1}{2i+1} &= \frac{2i+1 - (2i-1)}{(2i-1)(2i+1)} = \frac{2i+1 - 2i+1}{(2i-1)(2i+1)} = \frac{2}{(2i-1)(2i+1)} \\ \frac{2}{(2i-1)(2i+1)} &= \frac{1}{2i-1} - \frac{1}{2i+1} \\ \frac{1}{(2i-1)(2i+1)} &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2i-1} - \frac{1}{2i+1} \right) \end{aligned}$$

Auxiliar 2

Sea $a_n = \frac{1}{2n-1}$, donde $n \in \mathbb{N}$. Queremos calcular $\sum_1^n \left(\frac{1}{2(i+1)-1} - \frac{1}{2i-1} \right)$.

$$\sum_1^n \left(\frac{1}{2(i+1)-1} - \frac{1}{2i-1} \right) = \sum_1^n (a_{i+1} - a_i) \stackrel{9i)}{=} a_{n+1} - a_1 = \frac{1}{2(n+1)-1} - \frac{1}{2 \cdot 1 - 1}$$

Dale las gracias y un poco de amor  a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:

 Marcos Zea 

10. Probar que las siguientes desigualdades son verdaderas para todo $n \in \mathbb{N}$

- | | |
|---|--|
| i) $3^n + 5^n \geq 2^{n+2}$ | v) $\sum_{i=1}^{2^n} \frac{1}{2i-1} > \frac{n+3}{4}$ |
| ii) $3^n \leq n^3$ | |
| iii) $\sum_{i=1}^n \frac{n+i}{i+1} \leq 1 + n(n-1)$ | vi) $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i!} \leq 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$ |
| iv) $\sum_{i=n}^{2n} \frac{i}{2^i} \leq n$ | vii) $\prod_{i=1}^n \frac{4i-1}{n+i} \geq 1$ |

i) $P(n) : 3^n + 5^n \geq 2^{n+2}, n \in \mathbb{N}$

1) Caso base, $n = 1$:

$$P(1) : 3^1 + 5^1 \geq 2^{1+2}$$

$$P(1) : 8 \geq 8 \Rightarrow P(1) : V$$

2) Paso inductivo. Sea $n \in \mathbb{N}$:

HI. $P(n) : V$

TI. $P(n+1) : 2^{n+3} \leq 3^{n+1} + 5^{n+1}$

Desarrollemos el lado izquierdo de la desigualdad:

$$2^{n+3} = 2 \cdot 2^{n+2} \stackrel{\text{HI}}{=} 2 \cdot (3^n + 5^n) = 2 \cdot 3^n + 2 \cdot 5^n \leq 3 \cdot 3^n + 5 \cdot 5^n = 3^{n+1} + 5^{n+1}$$

$$2^{n+3} \leq 3^{n+1} + 5^{n+1}$$

$$\Rightarrow P(n+1) : V$$

Hemos probado el caso base y el paso inductivo. Concluimos que $\forall n \in \mathbb{N}, P(n) : V$.

ii) $P(n) : 3^n \geq n^3, n \in \mathbb{N}$.

1) Caso base, $n = 1$:

$$P(1) : 3^1 \geq 1^3$$

$$P(1) : 3 \geq 1 \Rightarrow P(1) : V$$

2) Paso inductivo. Sea $n \in \mathbb{N}$:

HI. $P(n) : V$

TI. $P(n+1) : 3^{n+1} \geq (n+1)^3$

Desarrollemos el lado izquierdo de la desigualdad:

$$\begin{aligned} 3^{n+1} &= 3 \cdot 3^n \stackrel{\text{HI}}{\geq} 3 \cdot n^3 \stackrel{\text{Aux}}{\geq} (n+1)^3, \quad n \geq 3 \\ 3^{n+1} &\geq (n+1)^3, \quad n \geq 3 \\ \Rightarrow P(n+1) : V, \quad n \geq 3 \end{aligned}$$

Hemos probado el caso base y el paso inductivo, este último para los $n \geq 3$. Como solo probamos el paso inductivo para $n \geq 3$, deberíamos ver que $P(2)$ y $P(3)$ son verdaderas.

$$\begin{aligned} P(2) : 3^2 &\geq 2^3 \Rightarrow P(2) : 9 \geq 8 \Rightarrow P(2) : V \\ P(3) : 3^3 &\geq 3^3 \Rightarrow P(3) : V \end{aligned}$$

Tenemos que

$$\begin{aligned} P(1) : V \wedge P(2) : V \wedge P(3) : V \\ \text{si } n \geq 3, \quad P(n) : V \Rightarrow P(n+1) : V \end{aligned}$$

Concluimos que $\forall n \in \mathbb{N}, \quad P(n) : V$.

Auxiliar

$$\begin{aligned} 3n^3 \geq (n+1)^3 &\iff \sqrt[3]{3n^3} \geq \sqrt[3]{(n+1)^3} \iff \sqrt[3]{3}n \geq n+1 \iff \sqrt[3]{3}n - n \geq 1 \\ &\iff n(\sqrt[3]{3} - 1) \geq 1 \iff n \geq \frac{1}{\sqrt[3]{3}-1} \approx 2.6 \iff n \geq 3 \\ \therefore 3n^3 \geq (n+1)^3 &\iff n \geq 3 \end{aligned}$$

$$\text{iii) } P(n) : \sum_{i=1}^n \frac{n+i}{1+i} \leq 1 + n(n-1), \quad n \in \mathbb{N}.$$

1) Caso base, $n = 1$:

$$\begin{aligned} P(1) : \sum_{i=1}^1 \frac{1+i}{1+i} &\leq 1 + 1(1-1) \\ P(1) : \frac{1+1}{1+1} &\leq 1 \Rightarrow P(1) : V \end{aligned}$$

2) Paso inductivo. Sea $n \in \mathbb{N}$:

HI. $P(n) : V$

TI. $\sum_{i=1}^{n+1} \frac{n+1+i}{1+i} \leq 1 + (n+1)n$

Desarrollemos el lado izquierdo de la desigualdad:

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=1}^{n+1} \frac{n+1+i}{1+i} &= \frac{2(n+1)}{n+2} + \sum_{i=1}^n \frac{n+1+i}{1+i} = \frac{2(n+1)}{n+2} + \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{1+i} + \frac{n+i}{1+i} \right) \\
 &= \frac{2(n+1)}{n+2} + \sum_{i=1}^n \frac{1}{1+i} + \sum_{i=1}^n \frac{n+i}{1+i} \stackrel{\text{Aux}}{\leq} \frac{2(n+1)}{(n+1)} + \sum_{i=1}^n 1 + \sum_{i=1}^n \frac{n+i}{1+i} \stackrel{*}{=} \\
 &\stackrel{*}{=} 2 + n + \sum_{i=1}^n \frac{n+i}{1+i} \stackrel{\text{HI}}{\leq} 2 + n + 1 + n(n-1) = 2 + n + 1 + n^2 - n \stackrel{**}{=} \\
 &\stackrel{**}{=} 1 + n^2 + 2 \stackrel{(2 \leq n)}{\leq} 1 + n^2 + n = 1 + (n+1)n \\
 &\Rightarrow \sum_{i=1}^{n+1} \frac{n+1+i}{1+i} \leq 1 + (n+1)n, \text{ si } n \geq 2 \\
 &\Rightarrow P(n+1) : V, \text{ si } n \geq 2
 \end{aligned}$$

Hemos probado el caso base y el paso inductivo, este último para los $n \geq 2$. Como solo probamos el paso inductivo para $n \geq 2$, deberíamos ver que $P(2)$ es verdadera.

$$\begin{aligned}
 P(2) : \sum_{i=1}^2 \frac{2+i}{1+i} &\leq 1 + 2(2-1) \\
 P(2) : \frac{2+1}{1+1} + \frac{2+2}{1+2} &\leq 3 \\
 P(2) : \frac{17}{6} &\leq 3 \Rightarrow P(2) : V
 \end{aligned}$$

Tenemos que

$$P(1) : V \wedge P(2) : V$$

$$\text{si } n \geq 2, P(n) : V \Rightarrow P(n+1) : V$$

Concluimos que $\forall n \in \mathbb{N}, P(n) : V$.

Auxiliar

Acotemos $1/(n+2)$

$$n+1 \leq n+2, \quad \forall n \in \mathbb{N} \iff \frac{1}{n+2} \leq \frac{1}{n+1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Acotemos la sumatoria

$$\frac{1}{1+i} \leq 1, \quad \forall i \in \mathbb{N} \Rightarrow \sum_{i=1}^n \frac{1}{1+i} \leq \sum_{i=1}^n 1$$

$$\text{iv) } P(n) : \sum_{i=n}^{2n} \frac{i}{2^i} \leq n, \quad n \in \mathbb{N}.$$

1) Caso base, $n = 1$:

$$P(1) : \sum_{i=1}^{2 \cdot 1} \frac{i}{2^i} \leq 1$$

$$P(1) : \frac{1}{2} + \frac{2}{4} \leq 1 \Rightarrow P(1) : V$$

2) Paso inductivo. Sea $n \in \mathbb{N}$:

HI. $P(n) : V$

TI. $P(n+1) : \sum_{i=n+1}^{2(n+1)} \frac{i}{2^i} \leq n+1$

Desarrollemos el lado izquierdo de la desigualdad:

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=n+1}^{2(n+1)} \frac{i}{2^i} &= \frac{2n+2}{2^{2n+2}} + \frac{2n+1}{2^{2n+1}} + \sum_{i=n+1}^{2n} \frac{i}{2^i} = \frac{n}{2^n} - \frac{n}{2^n} + \frac{2n+2}{2^{2n+2}} + \frac{2n+1}{2^{2n+1}} + \sum_{i=n+1}^{2n} \frac{i}{2^i} \\
 &= -\frac{n}{2^n} + \frac{2n+2}{2^{2n+2}} + \frac{2n+1}{2^{2n+1}} + \sum_{i=n}^{2n} \frac{i}{2^i} = -\frac{2^{n+2}}{2^{n+2}} \frac{n}{2^n} + \frac{2n+2}{2^{2n+2}} + \frac{2}{2} \frac{2n+1}{2^{2n+1}} + \sum_{i=n}^{2n} \frac{i}{2^i} \\
 &= -\frac{4n2^n}{2^{2n+2}} + \frac{2n+2}{2^{2n+2}} + \frac{4n+2}{2^{2n+2}} + \sum_{i=n}^{2n} \frac{i}{2^i} = \frac{-4n2^n + 6n + 4}{2^{2n+2}} + \sum_{i=n}^{2n} \frac{i}{2^i} \stackrel{\text{HI}}{\leq} \\
 &\stackrel{\text{HI}}{\leq} \frac{-4n2^n + 6n + 4}{2^{2n+2}} + n \stackrel{\text{Aux}}{\leq} 1 + n, \quad n \geq 2 \\
 \Rightarrow \sum_{i=n+1}^{2(n+1)} \frac{i}{2^i} &\leq n+1, \quad n \geq 2 \Rightarrow P(n+1) : V, \quad n \geq 2
 \end{aligned}$$

Hemos probado el caso base y el paso inductivo, este último para los $n \geq 2$. Como solo probamos el paso inductivo para $n \geq 2$, deberíamos ver que $P(2)$ es verdadera.

$$\begin{aligned}
 P(2) : \sum_{i=2}^{2 \cdot 2} \frac{i}{2^i} &\leq 2 \\
 P(2) : \frac{2}{4} + \frac{3}{8} + \frac{4}{16} &\leq 2 \\
 P(2) : \frac{9}{8} &\leq 2 \Rightarrow P(2) : V
 \end{aligned}$$

Tenemos que

$P(1) : V \wedge P(2) : V$

si $n \geq 2$, $P(n) : V \Rightarrow P(n+1) : V$

Concluimos que $\forall n \in \mathbb{N}$, $P(n) : V$.

Auxiliar

Acotemos el termino $-4n2^n$

$$-4n2^n \leq -4n \cdot 2 = -8n \Rightarrow -4n2^n \leq -8n$$

Usemos esto para acotar toda la fracción

$$\frac{-4n2^n + 6n + 4}{2^{2n+2}} \leq \frac{-8n + 6n + 4}{2^{2n+2}} \leq \frac{-2n + 4}{2^{2n+2}} \stackrel{(n \geq 2)}{\leq} \frac{1}{2^{2n+2}} \leq 1$$

Por último, veamos porque $-2n + 4 \leq 1$

$$\begin{aligned}
 -2n + 4 \leq 0 &\iff -2n \leq -4 \iff n \geq \frac{-4}{-2} \iff n \geq 2 \\
 -2n + 4 \leq 0, \text{ si } n \geq 2 &\Rightarrow -2n + 4 \leq 1, \text{ si } n \geq 2
 \end{aligned}$$

v) $P(n) : \sum_{i=1}^{2^n} \frac{1}{2i-1} > \frac{n+3}{4}, n \in \mathbb{N}.$

1) Caso base, $n = 1$:

$$P(1) : \sum_{i=1}^{2^1} \frac{1}{2i-1} > \frac{1+3}{4}$$

$$P(1) : \frac{1}{1} + \frac{1}{3} > 1 \Rightarrow P(1) : V$$

2) Paso inductivo. Sea $n \in \mathbb{N}$:

HI. $P(n) : V$

TI. $P(n+1) : \sum_{i=1}^{2^{n+1}} \frac{1}{2i-1} > \frac{n+4}{4}$

Desarrollemos el lado derecho de la desigualdad:

$$\begin{aligned} \frac{n+4}{4} &= \frac{1}{4} + \frac{n+3}{4} \stackrel{\text{HI}}{<} \frac{1}{4} + \sum_{i=1}^{2^n} \frac{1}{2i-1} = \frac{1}{4} + \sum_{i=2^{n+1}}^{2^{n+1}} \frac{1}{2i-1} - \sum_{i=2^{n+1}}^{2^{n+1}} \frac{1}{2i-1} + \sum_{i=1}^{2^n} \frac{1}{2i-1} \stackrel{*}{=} \\ &\stackrel{*}{=} \frac{1}{4} - \sum_{i=2^{n+1}}^{2^{n+1}} \frac{1}{2i-1} + \sum_{i=1}^{2^{n+1}} \frac{1}{2i-1} \stackrel{\text{Aux.1}}{<} 0 + \sum_{i=1}^{2^{n+1}} \frac{1}{2i-1} = \sum_{i=1}^{2^{n+1}} \frac{1}{2i-1} \\ \Rightarrow \frac{n+4}{4} &< \sum_{i=1}^{2^{n+1}} \frac{1}{2i-1} \Rightarrow P(n+1) : V \end{aligned}$$

Hemos probado el caso base y el paso inductivo. Concluimos que $\forall n \in \mathbb{N}, P(n) : V$.

Auxiliar 1

$$\begin{aligned} \sum_{i=2^{n+1}}^{2^{n+1}} \frac{1}{2i-1} &= \frac{1}{2^{n+1}+1} + \frac{1}{2^{n+1}+3} + \cdots + \frac{1}{2^{n+1}-1} > \frac{1}{2^{n+2}} + \frac{1}{2^{n+2}} + \cdots + \frac{1}{2^{n+2}} \stackrel{*}{=} \\ &\stackrel{*}{=} \sum_{i=2^{n+1}}^{2^{n+1}} \frac{1}{2^{n+2}} = \frac{1}{2^{n+2}} \sum_{i=2^{n+1}}^{2^{n+1}} 1 \stackrel{\text{Aux.2}}{=} \frac{1}{2^{n+2}} 2^n = \frac{2^{\overbrace{n}^1}}{2^{\overbrace{2n}^1}} = \frac{1}{4} \\ \Rightarrow \sum_{i=2^{n+1}}^{2^{n+1}} \frac{1}{2i-1} &> \frac{1}{4} \Rightarrow - \sum_{i=2^{n+1}}^{2^{n+1}} \frac{1}{2i-1} < -\frac{1}{4} \Rightarrow \frac{1}{4} - \sum_{i=2^{n+1}}^{2^{n+1}} \frac{1}{2i-1} < 0 \end{aligned}$$

Auxiliar 2

Cantidad de sumandos en una sumatoria

$$\sum_{i=A}^B a_i = a_A + \cdots + a_B$$

$$\#Elementos = \sum_{i=A}^B 1 = B + 1 - A$$

Calculemos la cantidad de sumandos en $\sum_{i=2^n+1}^{2^{n+1}} \frac{1}{2^{i-1}}$

$$B = 2^{n+1}, A = 2^n + 1 \Rightarrow \#Elementos = B + 1 - A = 2^{n+1} + 1 - (2^n + 1) = 2 \cdot 2^n + 1 - 2^n - 1 \\ \Rightarrow \#Elementos = 2^n$$

vi) $P(n) : \sum_{i=1}^n \frac{1}{i!} \leq 2 - \frac{1}{2^{n-1}}, n \in \mathbb{N}.$

1) Caso base, $n = 1$:

$$P(1) : \sum_{i=1}^1 \frac{1}{i!} \leq 2 - \frac{1}{2^{1-1}} \\ P(1) : \frac{1}{1} \leq 1 \Rightarrow P(1) : V$$

2) Paso inductivo. Sea $n \in \mathbb{N}$:

HI. $P(n) : V$

TI. $P(n+1) : \sum_{i=1}^{n+1} \frac{1}{i!} \leq 2 - \frac{1}{2^n}$

Desarrollemos el lado izquierdo de la desigualdad:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n+1} \frac{1}{i!} &= \frac{1}{(n+1)!} + \sum_{i=1}^n \frac{1}{i!} \stackrel{\text{HI}}{\leq} \frac{1}{(n+1)!} + 2 - \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{1}{(n+1)!} + 2 - \frac{2}{2^n} \stackrel{*}{=} \\ &\stackrel{*}{=} 2 - \frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^n} + \frac{1}{(n+1)!} \stackrel{\text{Aux}}{\leq} 2 - \frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} = 2 - \frac{1}{2^n} \\ &\Rightarrow \sum_{i=1}^{n+1} \frac{1}{i!} \leq 2 - \frac{1}{2^n} \Rightarrow P(n+1) : V \end{aligned}$$

Hemos probado el caso base y el paso inductivo. Concluimos que $\forall n \in \mathbb{N}, P(n) : V$.

Auxiliar

$$\frac{1}{(n+1)!} \leq \frac{1}{2^n} \iff 2^n \leq (n+1)!$$

Probemos esto último usando inducción. Sea $Q(n) : 2^n \leq (n+1)!, n \in \mathbb{N}$.

1) Caso base, $n = 1$:

$$Q(1) : 2^1 \leq (1+1)! \\ Q(1) : 2 \leq 2 \Rightarrow Q(1) : V$$

2) Paso inductivo. Sea $n \in \mathbb{N}$:

HI. $Q(n) : V$

TI. $Q(n+1) : 2^{n+1} \leq (n+2)!$

Desarrollemos el lado izquierdo de la desigualdad:

$$\begin{aligned} 2^{n+1} &= 2 \cdot 2^n \stackrel{\text{HI}}{\leq} 2(n+1)! \stackrel{(2 \leq n+2)}{\leq} (n+2)(n+1)! = (n+2)! \\ \Rightarrow 2^{n+1} &\leq (n+2)! \Rightarrow Q(n+1) : V \end{aligned}$$

Hemos probado el caso base y el paso inductivo. Concluimos que $\forall n \in \mathbb{N}, Q(n) : V$.

vii) $P(n) : \prod_{i=1}^n \frac{4i-1}{n+i} \geq 1, n \in \mathbb{N}.$

1) Caso base, $n = 1$:

$$\begin{aligned} P(1) : \prod_{i=1}^1 \frac{4i-1}{1+i} &\geq 1 \\ P(1) : \frac{3}{2} &\geq 1 \Rightarrow P(1) : V \end{aligned}$$

2) Paso inductivo. Sea $n \in \mathbb{N}$:

HI. $P(n) : V$

TI. $P(n+1) : \prod_{i=1}^{n+1} \frac{4i-1}{n+1+i} \geq 1$

Desarrollemos el lado derecho de la desigualdad:

$$\begin{aligned} 1 &\stackrel{\text{HI}}{\leq} \prod_{i=1}^n \frac{4i-1}{n+i} = \frac{4(n+1)-1}{4(n+1)-1} \cdot \frac{n+(n+1)}{n+(n+1)} \cdot \prod_{i=1}^n \frac{4i-1}{n+i} \stackrel{*}{=} \\ &\stackrel{*}{=} \frac{n+(n+1)}{4(n+1)-1} \cdot \frac{4(n+1)-1}{n+(n+1)} \cdot \prod_{i=1}^n \frac{4i-1}{n+i} = \frac{n+(n+1)}{4(n+1)-1} \cdot \prod_{i=1}^{n+1} \frac{4i-1}{n+i} \stackrel{**}{=} \\ &\stackrel{**}{=} \frac{2n+1}{4n+3} \cdot \prod_{i=1}^{n+1} \frac{4i-1}{n+i} \cdot \frac{n+1+i}{n+1+i} = \frac{2n+1}{4n+3} \cdot \prod_{i=1}^{n+1} \frac{4i-1}{n+1+i} \cdot \frac{n+1+i}{n+i} \stackrel{***}{=} \\ &\stackrel{***}{=} \frac{2n+1}{4n+3} \cdot \prod_{i=1}^{n+1} \frac{4i-1}{n+1+i} \prod_{i=1}^{n+1} \frac{n+1+i_{\text{Aux.1}}}{n+i} \stackrel{=}{=} \frac{2n+1}{4n+3} \cdot \prod_{i=1}^{n+1} \frac{4i-1}{n+1+i} \cdot 2 = \\ &= 2 \cdot \frac{2n+1}{4n+3} \cdot \prod_{i=1}^{n+1} \frac{4i-1}{n+1+i} = \frac{4n+2}{4n+3} \cdot \prod_{i=1}^{n+1} \frac{4i-1}{n+1+i} \stackrel{\text{Aux.2}}{\leq} 1 \cdot \prod_{i=1}^{n+1} \frac{4i-1}{n+1+i} \\ \Rightarrow 1 &\leq \prod_{i=1}^{n+1} \frac{4i-1}{n+1+i} \Rightarrow P(n+1) : V \end{aligned}$$

Hemos probado el caso base y el paso inductivo. Concluimos que $\forall n \in \mathbb{N}, Q(n) : V$.

Auxiliar 1

Recordemos la formula del factorial de n

$$n! = \prod_{i=1}^n i = 1 \cdot 2 \dots n$$

Veamos que pasa si sumamos una constante $k \in \mathbb{N}$ a la parte de la productoria


$$\begin{aligned}\prod_{i=1}^n (k+i) &= (k+1) \cdot (k+2) \dots (k+n) = \frac{1 \cdot 2 \dots k}{1 \cdot 2 \dots k} (k+1) \cdot (k+2) \dots (k+n) \\ &= \frac{1 \cdot 2 \dots k \cdot (k+1) \cdot (k+2) \dots (k+n)}{1 \cdot 2 \dots k} = \frac{(k+n)!}{k!} \\ \prod_{i=1}^n (k+i) &= \frac{(k+n)!}{k!}\end{aligned}$$

Calculemos $\prod_{i=1}^{n+1} \frac{n+1+i}{n+i}$

$$\begin{aligned}\prod_{i=1}^{n+1} \frac{n+1+i}{n+i} &= \frac{\prod_{i=1}^{n+1} n+1+i}{\prod_{i=1}^{n+1} n+i} = \frac{\frac{(n+1+n+1)!}{(n+1)!}}{\frac{(n+n+1)!}{n!}} = \frac{\frac{(2n+2)!}{(n+1)!}}{\frac{(2n+1)!}{n!}} \\ &= \frac{(2n+2)!}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{(2n+1)!} = \frac{(2n+2)!}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{(2n+1)!} \\ &= \frac{(2n+2)(2n+1)!}{(n+1)n!} \cdot \frac{n!}{(2n+1)!} = \frac{2(n+1)(2n+1)!}{(n+1)n!} \cdot \frac{n!}{(2n+1)!} \\ &= 2 \frac{(n+1)(2n+1)!n!}{(n+1)(2n+1)!n!} = 2 \\ \Rightarrow \prod_{i=1}^{n+1} \frac{n+1+i}{n+i} &= 2\end{aligned}$$

Auxiliar 2

$$2 \leq 3 \Rightarrow 4n+2 \leq 4n+3 \Rightarrow \frac{4n+2}{4n+3} \leq 1$$

Dale las gracias y un poco de amor  a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:

 Marcos Zea 

11.

- i) Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de números reales todos del mismo signo y tales que $a_n > -1$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Probar que

$$\prod_{i=1}^n (1+a_i) \geq 1 + \sum_{i=1}^n a_i$$

¿En qué paso de la demostración se usa que $a_n > -1$ para todo $n \in \mathbb{N}$? ¿Y que todos los términos de la sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tienen el mismo signo?

- ii) Deducir que si $a \in \mathbb{R}$ tal que $a > -1$, entonces $(1+a)^n \geq 1+na$.

i) Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sucesión de números reales tales que

$$sg(a_n) = sg(a_1), \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (1)$$

$$a_n > -1, \quad \forall n \in \mathbb{N} \iff 1 + a_n > 0, \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (2)$$

donde $sg(x)$ es la función signo de x

$$sg(x) = \begin{cases} -1, & \text{si } x < 0 \\ 1, & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Definamos nuestra proposición $P(n)$

$$P(n) : \prod_{i=1}^n (1 + a_i) \geq 1 + \sum_{i=1}^n a_i, \quad n \in \mathbb{N}$$

Caso Base, $n = 1$:

$$P(1) : \prod_{i=1}^1 (1 + a_i) \geq 1 + \sum_{i=1}^1 a_i$$

$$P(1) : 1 + a_1 \geq 1 + a_1 \Rightarrow P(1) : V$$

Paso inductivo. Sea $n \in \mathbb{N}$:

HI. $P(n) : V$

$$\text{TI. } P(n+1) : \prod_{i=1}^{n+1} (1 + a_i) \geq 1 + \sum_{i=1}^{n+1} a_i$$

Desarrollemos el lado izquierdo de la desigualdad

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^{n+1} (1 + a_i) &= (1 + a_{n+1}) \prod_{i=1}^n (1 + a_i) \stackrel{\text{HI}}{\geq} (1 + a_{n+1}) \left(1 + \sum_{i=1}^n a_i \right) = 1 + \sum_{i=1}^n a_i + a_{n+1} + a_{n+1} \sum_{i=1}^n a_i \stackrel{*}{=} \\ &\stackrel{*}{=} 1 + \sum_{i=1}^{n+1} a_i + a_{n+1} \sum_{i=1}^n a_i \stackrel{\text{Aux}}{\geq} 1 + \sum_{i=1}^{n+1} a_i \Rightarrow P(n+1) : V \end{aligned}$$

Hemos probado el caso base y el paso inductivo, entonces $P(n) : V, \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Auxiliar Queremos ver que $a_{n+1} \sum_{i=1}^n a_i > 0$. La Ec.(1) nos dice que a_n nunca cambia de signo mientras que la Ec.(2) nos dice que a_n puede ser positiva o negativa. Entonces

$$sg(a_n) < 0 \vee sg(a_n) > 0$$

Caso $sg(a_n) < 0$

$$sg(a_n) < 0 \stackrel{(1)}{\implies} sg(a_{n+1}) < 0 \quad (3)$$

$$sg(a_n) < 0 \stackrel{(1)}{\implies} \sum_{i=1}^n a_i < 0 \quad (4)$$

Por la Ec.(3) y la Ec.(4), tenemos que

$$a_{n+1} \sum_{i=1}^n a_i > 0$$

Caso $sg(a_n) > 0$

$$sg(a_n) > 0 \stackrel{(1)}{\implies} sg(a_{n+1}) > 0 \quad (5)$$

$$sg(a_n) > 0 \stackrel{(1)}{\implies} \sum_{i=1}^n a_i > 0 \quad (6)$$

Por la Ec.(5) y la Ec.(6), tenemos que


$$a_{n+1} \sum_{i=1}^n a_i > 0$$

¿En qué paso de la demostración se usa que $a_n > -1$ para todo $n \in \mathbb{N}$? En la misma parte donde utilizamos la HI, pues la desigualdad de la HI sigue siendo válida solo si multiplicamos a ambos lados por un número positivo. Ese número positivo está en la Ec.(2).

¿Y que todos los términos de la sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tienen el mismo signo? En la parte donde utilizamos el cálculo auxiliar.

- ii) Como $a > -1$ y $a \in \mathbb{R}$, cumple con las condiciones impuestas sobre $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en el punto (i). Tomamos $a_n = a, \forall n \in \mathbb{N}$. Como $P(n)$ es verdadera

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^n (1+a) &\geq 1 + \sum_{i=1}^n a \\ (1+a)^n &\geq 1 + a \sum_{i=1}^n 1 \\ (1+a)^n &\geq 1 + na \end{aligned}$$

Dale las gracias y un poco de amor  a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:

 Marcos Zea 

12. Probar que

- i) $n! \geq 3^{n-1}, \quad \forall n \geq 5$
- ii) $3^n - 2^n > n^3, \quad \forall n \geq 4$
- iii) $\sum_{i=1}^n \frac{3^i}{i!} < 6n - 5, \quad \forall n \geq 3$

- i) $P(n) : n! \geq 3^{n-1}, \quad \forall n \geq 5$

Caso Base, $n = 5$:

$$P(5) : 5! \geq 3^{5-1}$$

$$P(5) : 120 \geq 81 \Rightarrow P(5) : V$$

Paso inductivo. Sean ≥ 5 :

$$\text{HI. } P(n) : V$$

$$\text{TI. } P(n+1) : (n+1)! \geq 3^n$$

Desarrollemos el lado izquierdo de la desigualdad en la TI

$$(n+1)! = (n+1)n! \stackrel{\text{HI}}{\geq} (n+1)3^{n-1} \stackrel{\text{Aux}}{\geq} 3 \cdot 3^{n-1} = 3^n \Rightarrow P(n+1) : V$$

Hemos probado el caso base y el paso inductivo. Entonces $P(n) : V, \forall n \geq 5$.

Auxiliar $n \geq 5 \Rightarrow n \geq 3 \Rightarrow (n+1) \geq 3$

$$\text{ii) } P(n) : 3^n - 2^n > n^3, \forall n \geq 4$$

Caso Base, $n = 4$:

$$P(4) : 3^4 - 2^4 > 4^3$$

$$P(4) : 65 > 64 \Rightarrow P(5) : V$$

Paso inductivo. Sean ≥ 4 :

$$\text{HI. } P(n) : V$$

$$\text{TI. } P(n+1) : 3^{n+1} - 2^{n+1} > (n+1)^3$$

Desarrollemos el lado izquierdo de la desigualdad en la TI

$$3^{n+1} - 2^{n+1} = 3 \cdot 3^n - 2 \cdot 2^n \geq 3 \cdot 3^n - 3 \cdot 2^n = 3(3^n - 2^n) \stackrel{\text{HI}}{>} 3n^3 \stackrel{\text{Aux}}{>} (n+1)^3 \Rightarrow P(n+1) : V$$

Hemos probado el caso base y el paso inductivo. Entonces $P(n) : V, \forall n \geq 4$.

$$\textbf{Auxiliar} \quad 3n^3 > (n+1)^3 \iff \sqrt[3]{3n^3} > \sqrt[3]{(n+1)^3} \stackrel{\text{Aux}}{\iff} \sqrt[3]{3}n > n+1 \stackrel{*}{\iff}$$

$$\stackrel{*}{\iff} \sqrt[3]{3}n - n > 1 \iff n(\sqrt[3]{3} - 1) > 1 \iff n > \frac{1}{\sqrt[3]{3}-1} \simeq 2.3 \Rightarrow 3n^3 > (n+1)^3, \forall n \geq 4$$

$$\text{iii) } P(n) : \sum_{i=1}^n \frac{3^i}{i!} < 6n - 5, \forall n \geq 3$$

Caso Base, $n = 3$:

$$P(3) : \sum_{i=1}^3 \frac{3^i}{i!} < 6 \cdot 3 - 5$$

$$P(4) : \frac{3^1}{1!} + \frac{3^2}{2!} + \frac{3^3}{3!} > 13$$

$$P(4) : 12 < 13 \Rightarrow P(5) : V$$

Paso inductivo. Sea $n \geq 3$:

HI. $P(n) : V$

TI. $\sum_{i=1}^{n+1} \frac{3^i}{i!} < 6(n+1) - 5$

Desarrollemos el lado izquierdo de la desigualdad en la TI

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n+1} \frac{3^i}{i!} &= \frac{3^{n+1}}{(n+1)!} + \sum_{i=1}^n \frac{3^i}{i!} \stackrel{\text{HI}}{<} \frac{3^{n+1}}{(n+1)!} + 6n - 5 \stackrel{\text{Aux}}{<} 6 + 6n - 5 = 6(n+1) - 5, \quad n \geq 5 \\ \sum_{i=1}^{n+1} \frac{3^i}{i!} &< 6(n+1) - 5, \quad n \geq 5 \\ &\Rightarrow P(n+1) : V, \quad n \geq 5 \end{aligned}$$

Hemos probado el caso base y el paso inductivo, este último para los $n \geq 5$. Como solo probamos el paso inductivo para $n \geq 5$, deberíamos ver que $P(4)$ y $P(5)$ son verdaderas.

$$\begin{aligned} P(4) : \sum_{i=1}^4 \frac{3^i}{i!} &< 6 \cdot 4 - 5 \Rightarrow P(4) : 15.75 < 19 \Rightarrow P(4) : V \\ P(5) : \sum_{i=1}^5 \frac{3^i}{i!} &< 6 \cdot 5 - 5 \Rightarrow P(5) : 17.4 < 25 \Rightarrow P(5) : V \end{aligned}$$

Tenemos

$$\begin{aligned} P(3) : V \wedge P(4) : V \wedge P(5) : V \\ \forall n \geq 5, P(n) : V \Rightarrow P(n+1) : V \end{aligned}$$

Entonces $P(n) : V, \quad \forall n \geq 3$.

Auxiliar Por el punto (i), si $n \geq 5$ tenemos que $3^{n-1} \leq n! \Rightarrow 3^n \leq (n+1)! \stackrel{*}{\Rightarrow} \frac{3^n}{(n+1)!} \leq 1 \Rightarrow 3 \frac{3^n}{(n+1)!} \leq 3 \Rightarrow \frac{3^{n+1}}{(n+1)!} \leq 3 \stackrel{(3 < 6)}{\Rightarrow} \frac{3^{n+1}}{(n+1)!} < 6$
Llegamos a que $\frac{3^{n+1}}{(n+1)!} < 6$, si $n \geq 5$.

13. Hallar todos los valores de $n \in \mathbb{N}$ tales que $n^2 + 1 < 2^n$.

Pruebo algunos valores de n :

- $n = 1 \rightarrow 1^2 + 1 = 2 \not< 2$
- $n = 2 \rightarrow 2^2 + 1 = 5 \not< 4$
- $n = 3 \rightarrow 3^2 + 1 = 10 \not< 8$
- $n = 4 \rightarrow 4^2 + 1 = 17 \not< 16$
- $n = 5 \rightarrow 5^2 + 1 = 26 < 32 \quad \checkmark$

Parece ser que se cumple para los $n \geq 5$. Lo pruebo por inducción corrida.

$$P(n) : "n^2 + 1 < 2^n" \quad \forall n \in \mathbb{N}_{\geq 5}$$

Caso Base:

$$P(5) \text{ Verdadero} \iff 5^2 + 1 < 2^5 \iff 26 < 32 \quad \checkmark$$

Paso Inductivo: Sea $k \in \mathbb{N}_{\geq 5}$. Supongo $\underbrace{P(k)}_{\text{HI}}$ Verdadero, quiero ver que $P(k+1)$ Verdadero.

$$\begin{aligned} P(k+1) \text{ Verdadero} &\iff (k+1)^2 + 1 < 2^{k+1} \\ &\iff (k+1)^2 + 1 < 2^k \cdot 2 \end{aligned}$$

y como $(k^2 + 1) \cdot 2 < 2^k \cdot 2$ por HI, si $(k+1)^2 + 1 \leq (k^2 + 1) \cdot 2 \Rightarrow (k+1)^2 + 1 < 2^k \cdot 2$ como se quiere ver.

$$\begin{aligned} (k+1)^2 + 1 \leq (k^2 + 1) \cdot 2 &\iff k^2 + 2k + 2 \leq 2k^2 + 2 \\ &\iff 2k \leq k^2 \\ &\iff_{k>0} 2 \leq k \quad \checkmark \text{ (Pues } k \geq 5 \text{ por HI)} \end{aligned}$$

Así, $(k+1)^2 + 1 < 2^k \cdot 2$ y $\therefore P(k+1)$ Verdadero.


Como se cumple tanto el caso base como el paso inductivo, por el principio de inducción $P(n)$ es verdadero $\forall n \in \mathbb{N}$.

14. Probar que para todo $n \geq 3$ vale que

- la cantidad de diagonales de un polígono de n lados es $\frac{n(n-3)}{2}$.
- la suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados es $\pi(n-2)$.

i) La cantidad de diagonales de un polígono de n lados es $\frac{n(n-3)}{2}$.

Ejercicio donde hay que encontrar una fórmula a partir de algún método *creativo* para luego probar por inducción.



Se desprende del gráfico el siguiente razonamiento: En el polígono **cyan** de n lados voy a tener una cantidad de diagonales dada por la sucesión d_n . El polígono **rojo** me genera polígono que tiene un lado menos y un lado menos, cantidad que viene determinada por d_{n-1} . Las líneas punteadas son las diagonales de d_n que no estarán en d_{n-1} . Ahora voy a encontrar una relación entre ambas sucesiones. Al sacan un lado pierdo las **diagonales** desde 2 hasta $n-2$ que serían $n-3$ en total y además pierdo la **diagonal** que conectan el vértice 1 con el $n-1$: $d_n = d_{n-1} + 1 + n - 2 = d_{n-1} + n - 1$

$$\rightarrow d_n = d_{n-1} + n - 1$$


Ahora inducción:

$$p(n) : d_n = \frac{n(n-3)}{2} \quad \forall n \geq 3$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Caso Base: } p(3) \text{ verdadera? } \rightarrow \frac{3(3-3)}{2} = 0, \text{ lo cual es verdad para el triángulo. } \checkmark \\ \text{Paso inductivo: } p(k) \text{ es verdadero para algún } k \in \mathbb{Z}_{\geq 3} \Rightarrow p(k+1) \text{ verdadera?} \\ \text{Hipótesis Inductiva: } d_k = \frac{k(k-3)}{2} \Rightarrow d_{k+1} = \frac{(k+1)(k-2)}{2} \\ d = k+1 \stackrel{\text{def}}{=} d_k + k - 1 \stackrel{\text{HI}}{=} \frac{k(k-3)}{2} + k - 1 = \frac{k^2 - k - 2}{2} = \frac{(k-2)(k+1)}{2} \quad \checkmark \end{array} \right.$$

Como $p(3)$ y $p(k)$ y $p(k+1)$ resultaron verdaderas, por el principio de inducción $p(n)$ es verdadera $\forall n \in \mathbb{N}_{\geq 3}$

ii) la suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados es $\pi(n-2)$.



En este caso estoy generando la suma de los ángulos internos de 2 polígonos, uno con α_n de n lados y otro con $n-1$, α_{n-1} . Es más claro en este caso que al sacarle un lado, estoy robando un triángulo que tiene como suma de sus ángulos internos π , entonces afirmo $\alpha_{n+1} = \alpha_n + \pi$. Ahora pruebo por inducción lo pedido. $p(n) : \alpha_n = \pi(n-2) \quad \forall n \geq 3$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Caso Base: } p(3) : \pi(3-2) = \pi, \text{ lo cual es verdad para el triángulo. } \checkmark \\ \text{Paso inductivo: } p(k) \text{ es verdadero para algún } k \in \mathbb{Z}_{\geq 3} \Rightarrow p(k+1) \text{ verdadera?} \\ \text{Hipótesis Inductiva: } \alpha_k = \pi(k-2) \Rightarrow \alpha_{k+1} = \pi(k-1) \\ \left\{ \begin{array}{l} \alpha_k \stackrel{\text{def}}{=} \alpha_{k+1} - \pi \\ \alpha_k \stackrel{\text{HI}}{=} \pi(k-2) \end{array} \right\} \rightarrow \alpha_{k+1} = \pi(k-2) + \pi = \pi(k-1) \quad \checkmark \end{array} \right.$$

Como $p(3)$, $p(k)$ y $p(k+1)$ resultaron verdaderas, por el principio de inducción $p(n)$ es verdadera $\forall n \in \mathbb{N}_{\geq 3}$

Recurrencia

15.

i) Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la sucesión de números reales definida recursivamente por

$$a_1 = 2 \quad \text{y} \quad a_{n+1} = 2na_n + 2^{n+1}n!, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Probar que $a_n = 2^n n!$.

ii) Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la sucesión de números reales definida recursivamente por

$$a_1 = 0 \quad \text{y} \quad a_{n+1} = a_n + n(3n+1), \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Probar que $a_n = n^2(n-1)$.

i) Inducción. *Proposición:*

$$p(n) : a_n = 2^n n! \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Caso base:

$$p(1) : \begin{cases} a_1 \stackrel{\text{def}}{=} 2 = 2^1 \cdot 1! & \checkmark \\ a_{1+1} = a_2 \stackrel{\text{def}}{=} 2 \cdot 1 \cdot a_1 + 2^{1+1} 1! = 8 \stackrel{!}{=} 2^2 \cdot 2 & \checkmark. \end{cases}$$

Resulta que $p(1)$ es verdadera.

Paso inductivo:

$$p(k) : \underbrace{a_k = 2^k k!}_{\text{hipótesis inductiva}}$$

asumo verdadera para algún $k \in \mathbb{Z}$ entonces quiero que

$$p(k+1) : a_{k+1} = 2^{k+1} (k+1)!$$

también lo sea.

$$a_{k+1} \stackrel{\text{def}}{=} 2k \cdot a_k + 2^{k+1} k! \stackrel{\text{HI}}{=} 2k \cdot 2^k k! + 2^{k+1} k! = 2^{k+1} k! (k+1) \stackrel{!}{=} 2^{k+1} (k+1)! \quad \checkmark$$

Resulta que $p(k+1)$ también es verdadera.

Como $p(1), p(k)$ y $p(k+1)$ son verdaderas, por el principio de inducción también lo es $p(n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$

ii) Inducción. *Proposición:*

$$p(n) : a_n = n^2 (n-1) \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Caso base:

$$p(1) : \begin{cases} a_1 \stackrel{\text{def}}{=} 0 = 1^2 \cdot (1-1) & \checkmark \\ a_{1+1} = a_2 \stackrel{\text{def}}{=} a_1 + 1(3 \cdot 1 + 1) = 4 = 2^2 \cdot (2-1) & \checkmark. \end{cases}$$

Resulta que $p(1)$ es verdadera.

Paso inductivo:

$$p(k) : \underbrace{a_k = k^2 (k-1)}_{\text{hipótesis inductiva}}$$

asumo verdadera para algún $k \in \mathbb{Z} \Rightarrow$, entonceos quiero ver que

$$p(k+1) : a_{k+1} = (k+1)^2 (k+1-1) = k(k+1)^2$$

también lo sea.

$$a_{k+1} \stackrel{\text{def}}{=} a_k + k(3k+1) \stackrel{\text{HI}}{=} k^2 (k-1) + 3k^2 + k = k^3 + 2k^2 + k \stackrel{!}{=} k(k+1)^2 \quad \checkmark$$

Resulta que $p(k+1)$ también es verdadera.

Como $p(1), p(k)$ y $p(k+1)$ son verdaderas, por el principio de inducción también lo es $p(n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$

16. Hallar la fórmula para el término general de las sucesiones $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$

👁... hay que hacerlo! 🧐

Si querés mandarlo: Telegram \rightarrow 📧, o mejor aún si querés subirlo en L^AT_EX \rightarrow 🌐.

📧 ¿Errores? Avisá así se corrige y ganamos todos.

Ir a índice \uparrow
17/12/24 @ 10:48

17. 🤖... hay que hacerlo! 🤖

Si querés mandarlo: Telegram → 📩, o mejor aún si querés subirlo en \LaTeX → 🐙.

18. 🤖... hay que hacerlo! 🤖

Si querés mandarlo: Telegram → 📩, o mejor aún si querés subirlo en \LaTeX → 🐙.

19. 🤖... hay que hacerlo! 🤖

Si querés mandarlo: Telegram → 📩, o mejor aún si querés subirlo en \LaTeX → 🐙.

20. 🤖... hay que hacerlo! 🤖

Si querés mandarlo: Telegram → 📩, o mejor aún si querés subirlo en \LaTeX → 🐙.


21. 🤖... hay que hacerlo! 🤖

Si querés mandarlo: Telegram → 📩, o mejor aún si querés subirlo en \LaTeX → 🐙.

22. 🤖... hay que hacerlo! 🤖

Si querés mandarlo: Telegram → 📩, o mejor aún si querés subirlo en \LaTeX → 🐙.

Ejercicios de parciales:

 1. Probar para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple la siguiente desigualdad:

$$\frac{(2n)!}{(n!)^2} \leq (n+1)!$$

Se prueba usando el principio de inducción $\in \mathbb{N}$.

Proposición:

$$p(n) : \frac{(2n)!}{(n!)^2} \leq (n+1)!$$

Caso base: Evalúo en $n = 1$.

$$p(1) : \frac{(2 \cdot 1)!}{1!^2} = 2 \leq (1+1)! \quad \checkmark$$

Se concluye que $p(1)$ es verdadera.

Paso inductivo:

$$p(k) : \underbrace{\frac{(2k)!}{(k!)^2}}_{\text{HI}} \leq (k+1)!$$


la supongo verdadera.

Quiero probar que:

$$p(k+1) : \frac{(2(k+1))!}{(k+1)!^2} \leq (k+1+1)!$$

también lo es.

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{(2k+2)!}{(k+1)!^2} \leq (k+2)! \xleftrightarrow[\text{factorial}]{\text{abrir}} \\ \frac{(2k+2) \cdot (2k+1) \cdot \underbrace{(2k)!}_{\text{HI}}}{(k+1)^2 \cdot \underbrace{(k!)^2}_{\text{HI}}} \leq \frac{(2k+2) \cdot (2k+1)}{(k+1)^2} \cdot \underbrace{(k+1)!}_{\text{HI}} = \frac{4 \cdot \underbrace{(k+\frac{1}{2})}_{\text{★}^1} \cdot \underbrace{(k+\frac{1}{2})}_{\text{★}^2}}{(k+1)^2} \cdot (k+1)! \leq \underbrace{(k+2)}_{\text{★}^3} (k+1)! = (k+2)! \\ \boxed{\frac{(2(k+1))!}{(k+1)!^2} \leq (k+2)!} \end{array} \right.$$

★¹ se prueba fácil en 2 cuentas, queda como ejercicio para vos . Es así que $p(1), p(k)$, y $p(k+1)$ resultaron verdaderas y por el principio de inducción $p(n)$ también lo será $\forall n \in \mathbb{N}$.

 2. Probar que, para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{3}{n+k} \leq \frac{5}{2}.$$

Inducción: $p(n) : \sum_{k=1}^{n+1} \frac{3}{n+k} \leq \frac{5}{2} \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Caso base: $p(1)$:

$$\sum_{k=1}^{1+1} \frac{3}{1+k} = \frac{3}{2} + \frac{3}{3} = \frac{5}{2} \stackrel{\checkmark}{\leq} \frac{5}{2} \rightarrow p(1) \text{ Verdadera} \quad \checkmark$$

Paso inductivo:

$p(j) : \sum_{k=1}^{j+1} \frac{3}{j+k} \leq \frac{5}{2}$ Verdadera \Rightarrow quiero probar que $p(j+1) : \sum_{k=1}^{j+1+1} \frac{3}{j+1+k} \leq \frac{5}{2}$ Verdadera

En los ejercicios donde la n aparece adentro de la sumatoria, conviene abrirla para encontrar la *hipótesis*

inductiva: $\sum_{k=1}^{j+1} \frac{3}{j+k} \leq \frac{5}{2}$

$$\sum_{k=1}^{j+1} \frac{3}{j+k} = \frac{3}{j+1} + \frac{3}{j+2} + \frac{3}{j+3} + \frac{3}{j+4} + \cdots + \frac{3}{2j} + \frac{3}{2j+1} \quad \checkmark$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{j+1+1} \frac{3}{j+1+k} &= \sum_{k=1}^{j+2} \frac{3}{j+1+k} = \frac{3}{j+1+1} + \frac{3}{j+1+2} + \frac{3}{j+1+3} + \cdots + \frac{3}{j+1+j-1} + \frac{3}{j+1+j} + \frac{3}{j+1+j+1} + \frac{3}{j+1+j+2} = \\ &= \frac{3}{j+2} + \frac{3}{j+3} + \frac{3}{j+4} + \cdots + \frac{3}{2j} + \frac{3}{2j+1} + \frac{3}{2j+2} + \frac{3}{2j+3} = \underbrace{-\frac{3}{j+1} + \frac{3}{j+1}}_{\leq 0} + \underbrace{\frac{3}{j+2} + \frac{3}{j+3} + \frac{3}{j+4} + \cdots + \frac{3}{2j} + \frac{3}{2j+1}}_{\geq 0} + \frac{3}{2j+2} + \frac{3}{2j+3} \\ &= \sum_{k=1}^{j+1} \frac{3}{j+k} - \frac{3}{j+1} + \frac{3}{2j+2} + \frac{3}{2j+3} = \sum_{k=1}^{j+1} \frac{3}{j+k} - \underbrace{\frac{3}{2k+2} + \frac{3}{2j+3}}_{\leq 0} \stackrel{HI}{\leq} \frac{5}{2} - \underbrace{\frac{3}{(2k+2)(2k+3)}}_{\geq 0} \leq \frac{5}{2} \Rightarrow \sum_{k=1}^{j+2} \frac{3}{j+1+k} \leq \frac{5}{2} \text{ Verdadera} \quad \checkmark \end{aligned}$$

Dado que $p(1), p(j), p(j+1)$ resultaron verdaderas por principio de inducción también lo es $p(n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

 3. Probar que

$$\sum_{k=1}^n (2k-1)^2 \geq \frac{(2n-1)^3}{6} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Ejercicio de inducción. Voy a probar que la proposición $p(n) : \sum_{k=1}^n (2k-1)^2 \geq \frac{(2n-1)^3}{6}$ sea verdadera para todos los naturales.

Caso base: $p(1) : \sum_{k=1}^1 (2k-1)^2 = (2 \cdot 1 - 1)^2 = 1 \geq \frac{(2 \cdot 1 - 1)^3}{6} = \frac{1}{6}$. por lo tanto $p(1)$ es verdadera \checkmark

Paso inductivo:

Asumo $p(h)$ verdadera, entonces quiero probar que $p(h+1)$ también lo sea. En este caso:

$$p(h) : \sum_{k=1}^h (2k-1)^2 \geq \frac{(2h-1)^3}{6}$$

para algún $h \in \mathbb{Z}$. Ésta será nuestra *hipótesis inductiva*: HI.


Quiero probar que:

$$\sum_{k=1}^{h+1} (2k-1)^2 \geq \frac{(2(h+1)-1)^3}{6} = \frac{(2h+1)^3}{6},$$

sea verdadera para algún $h \in \mathbb{Z}$.

$$\sum_{k=1}^{h+1} (2k-1)^2 = \sum_{k=1}^h (2k-1)^2 + (2(h+1)-1)^2 = \sum_{k=1}^h (2k-1)^2 + (2h+1)^2$$

Nota innecesaria pero que quizás aporta:

Lo que acabamos de hacer recién nos deja la HI regalada. Pero atento que esto solo suele funcionar cuando no tenemos a la 'n' en el término principal de la sumatoria. Después de hacerte éste, mirá el .

Fin nota innecesaria pero que quizás aporta.

$$\sum_{k=1}^{h+1} (2k-1)^2 = \sum_{k=1}^h (2k-1)^2 + (2h+1)^2 \stackrel{HI}{\geq} \underbrace{\frac{(2h-1)^3}{6} + (2h+1)^2}_{\text{Si ocurre esto, } p(h+1) \text{ será verdadera}} \geq \frac{(2h+1)^3}{6} \stackrel{\times 6}{\iff} (2h-1)^3 + 6(2h+1)^2 \geq (2h+1)^3$$

$$\begin{aligned} &\xleftrightarrow[\text{a morir}]{\text{distribuyo}} 8h^3 + 12h^2 + 30h + 5 \geq 8h^3 + 12h^2 + 6h + 1 \Leftrightarrow 24h + 4 \geq 0 \quad \forall h \in \mathbb{N} \\ &\Rightarrow \sum_{k=1}^{h+1} (2k-1)^2 \geq \frac{(2h+1-1)^3}{6}, \text{ concluyéndose que } p(h+1) \text{ también es verdadera.} \end{aligned}$$

Como tanto $p(1)$, $p(h)$ y $p(h+1)$ resultaron verdaderas, por el principio de inducción se tiene que $p(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{N}$.

🔥 4. Hallar una fórmula cerrada para

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!}.$$

Probar su validez usando inducción.

Probando números viendo de encontrar un patrón:

$$\left\{ \begin{array}{l} n = 1 \rightarrow \sum_{k=1}^1 \frac{k}{(k+1)!} = \frac{1}{2} \\ n = 2 \rightarrow \sum_{k=1}^2 \frac{k}{(k+1)!} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6} \\ n = 3 \rightarrow \sum_{k=1}^3 \frac{k}{(k+1)!} = \frac{5}{6} + \frac{1}{8} = \frac{23}{24} \\ n = 4 \rightarrow \sum_{k=1}^4 \frac{k}{(k+1)!} = \frac{23}{24} + \frac{1}{30} = \frac{119}{120} \end{array} \right.$$

Es notable que una potencial fórmula cerrada sería:

$$(a_n)_{n \geq 1} = \frac{(n+1)! - 1}{(n+1)!}.$$

Inducción para probar la fórmula.

$$p(n) : \sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!} = \frac{(n+1)! - 1}{(n+1)!} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Caso base:

$$p(1) : \sum_{k=1}^1 \frac{k}{(k+1)!} = \frac{1}{2} = \frac{(1+1)! - 1}{(1+1)!} = \frac{1}{2} \quad \checkmark$$

$p(1)$ es verdadera.

Paso inductivo:

$$\text{asumo que } p(j) : \overbrace{\sum_{k=1}^j \frac{k}{(k+1)!}}^{\text{hipótesis inductiva}} = \frac{(j+1)! - 1}{(j+1)!} \quad \text{para algún } j \in \mathbb{N}, \text{ es verdadera.}$$

entonces, quiero ver que

$$p(j+1) : \sum_{k=1}^{j+1} \frac{k}{(k+1)!} = \frac{(j+1+1)! - 1}{(j+1+1)!} \quad \text{también es verdadera.}$$

$$\sum_{k=1}^{j+1} \frac{k}{(k+1)!} \stackrel{!}{=} \sum_{k=1}^j \frac{k}{(k+1)!} + \frac{j+1}{(j+2)!} \stackrel{\text{HI}}{=} \frac{(j+1)!-1}{(j+1)!} + \frac{j+1}{(j+2)!} \stackrel{\text{!!!}}{=} \frac{(j+2)!-(j+2)+j+1}{(j+2)!} = \frac{(j+2)!-1}{(j+2)!}.$$

Por lo tanto $p(j+1)$ es verdadera.

Si te quedaste pedaleando en el **!!!**, multipliqué y dividí por *algo* en el primer término, para tener mismo denominador y bla, bla, listo 🏁.

Dado que $p(1), p(j)$ y $p(j+1)$ son verdaderas por el principio de inducción, $p(n)$ también lo es para todo $n \in \mathbb{N}$.

🔥5. Probar que para todo $n \in \mathbb{N}$

$$\prod_{i=1}^n \frac{i!}{i+n} \geq \frac{1}{10}.$$

Ejercicio de inducción que tiene una productoria o sumatoria y una n en el término general. Si hiciste los ejercicios anteriores, sabes que hay que atacar el problema *abriendo la productoria*.

Proposición:

$$p(n) : \prod_{i=1}^n \frac{i!}{i+n} \geq \frac{1}{10} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Caso base

$$p(1) : \prod_{i=1}^1 \frac{i!}{i+1} = \frac{1}{2} \geq \frac{1}{10} \quad \checkmark$$

El caso $p(1)$ resulta verdadero.

Paso inductivo:

Asumo que

$$p(\underbrace{k}_{\text{hipótesis inductiva}}) : \prod_{i=1}^k \frac{i!}{i+k} \geq \frac{1}{10} \quad \checkmark$$

es verdadero para algún $k \in \mathbb{Z}$. Y quiero probar que:

$$p(\underbrace{k+1}_{\text{hipótesis inductiva}}) : \prod_{i=1}^{k+1} \frac{i!}{i+k+1} \geq \frac{1}{10}$$

también lo sea.

Empiezo abriendo las productorias para estudiar los factores, uno por uno:

$$\prod_{i=1}^k \frac{i!}{i+k} = \frac{1!}{k+1} \cdot \frac{2!}{k+2} \cdots \frac{(k-2)!}{2k-2} \cdot \frac{(k-1)!}{2k-1} \cdot \frac{k!}{2k}$$

$$\prod_{i=1}^{k+1} \frac{i!}{i+k+1} = \frac{1!}{k+2} \cdot \frac{2!}{k+3} \cdots \frac{(k-2)!}{2k-1} \cdot \frac{(k-1)!}{2k} \cdot \frac{k!}{2k+1} \cdot \frac{(k+1)!}{2k+2}$$

Con esos resultados hay que ver que todos los factores *corridos* de la productoria hasta k están ahí escondidos en la productoria de $k+1$. Tomate un tiempo para acomodar y hacer aparecer la **hipótesis inductiva**.

Queda como corriendo los numeradores un lugar a la izquierda, no?

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^{k+1} \frac{i!}{i+k+1} &= \overbrace{\frac{k+1}{k+1} \cdot \frac{1!}{k+2} \cdot \frac{2!}{k+3} \cdots \frac{(k-2)!}{2k-1} \cdot \frac{(k-1)!}{2k} \cdot \frac{k!}{2k+1} \cdot \frac{(k+1)!}{2k+2}}^1 = \\ &\stackrel{!}{=} \frac{1!}{k+1} \cdot \frac{2!}{k+2} \cdot \frac{3!}{k+3} \cdots \frac{(k-2)!}{2k-2} \cdot \frac{(k-1)!}{2k-1} \cdot \frac{k!}{2k} \cdot \frac{(k+1)!}{2k+1} \cdot \frac{k+1}{2k+2} \end{aligned}$$

Oka, mismo truco viejo de siempre. Acomodar y multiplicar por un 1 disfrazado de cosas útiles. Ahora nos sacamos un montón de términos con la **hipótesis inductiva** y luego acotamos.

$$\prod_{i=1}^{k+1} \frac{i!}{i+k+1} \stackrel{\text{HI}}{\geq} \frac{1}{10} \cdot \frac{(k+1)!}{2k+1} \cdot \frac{k+1}{2k+2} = \frac{1}{20} \cdot \frac{(k+1)!}{2k+1} \stackrel{!}{\geq} \frac{1}{20} \cdot \frac{(k+1)!}{2k+2} = \frac{1}{40} \cdot k! \stackrel{!}{\geq} \frac{1}{10} \quad \forall k \in \mathbb{N}_{>2}$$

$$\prod_{i=1}^{k+1} \frac{i!}{i+k+1} \geq \frac{1}{10} \quad \forall k \in \mathbb{N}_{>2}$$

Y dado que

$$p(2) : \prod_{i=1}^2 \frac{i!}{i+2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6} \geq \frac{1}{10} \quad \checkmark$$

es verdadera la acotación que hicimos nos sirve.

Es así que $p(1), p(2), p(k)$, y $p(k+1)$ resultaron verdaderas y por el principio de inducción $p(n)$ también lo será $\forall n \in \mathbb{N}$.

6. Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la sucesión de números reales definida por $a_1 = 3, a_2 = 6$, y para $n \geq 1$,

$$a_{n+2} = \frac{2n+3}{7}(a_{n+1} + 2a_n)$$

Probar que $a_n > 2^n \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Sucesiones definidas por recurrencia e inducción.

Proposición: Quiero probar que

$$p(n) : a_n > 2^n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Casos base:

$$\begin{aligned} p(1) : a_1 = 3 &> 2^1 = 2 \rightarrow a_1 > 2^1 \\ p(2) : a_2 = 6 &> 2^2 = 4 \rightarrow a_2 > 2^2 \end{aligned}$$

Los casos base $p(1), p(2)$ resultaron verdaderos.

Paso inductivo: Asumo como verdadero para algún $k \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} p(k) : a_k &> 2^k \\ p(k+1) : a_{k+1} &> 2^{k+1} \end{aligned}$$

hipótesis inductiva
hipótesis inductiva

Entonces quiero probar que:

$$p(k+2) : a_{k+2} > 2^{k+2}$$

también lo sea.

Usando la definición:

$$a_{k+2} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{2k+3}{7} \cdot (a_{k+1} + 2 \cdot a_k) \stackrel{\text{HI}}{>} \frac{2k+3}{7} \cdot (2^{k+1} + 2 \cdot 2^k) = \frac{2k+3}{7} \cdot (2^{k+2})$$

Por lo tanto se tiene que:

$$a_{k+2} > \frac{2k+3}{7} \cdot (2^{k+2}) \geq 2^{k+2} \quad \forall k \in \mathbb{N}_{\geq 2}$$

Es así que se cumple $p(k+2) \quad \forall k \in \mathbb{N}_{\geq 2}$

El caso que faltaría es con $k = 1$


$$p(3) : a_{1+2} = a_3 \stackrel{\text{def}}{=} \frac{5}{7}(6+6) = \frac{60}{7} > 2^3 = 8 \rightarrow a_3 > 2^3$$

también se cumple.

Dado que $p(1), p(2), p(3), p(k), p(k+1)$ y $p(k+2)$ son todas verdaderas, por principio de inducción $p(n)$ es verdadera $\forall n \in \mathbb{N}$.

 7. Probar que, para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{i=1}^n (n-i)2^{i-1} = 2^n - n - 1.$$

Ejercicio de inducción .

Queremos probar nuestra proposición $p(n)$:

$$p(n) : \sum_{i=1}^n (n-i)2^{i-1} = 2^n - n - 1 \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

Caso base ¿ $p(1)$ es verdadera?:

$$p(1) : \sum_{i=1}^1 (1-i)2^{i-1} = 0 = 2^1 - 1 - 1$$

Por lo tanto $p(1)$ resulta verdadera.

Paso inductivo:

Se asume que para algún $k \in \mathbb{Z}$

$$p(k) : \underbrace{\sum_{i=1}^k (k-i)2^{i-1} = 2^k - k - 1}_{\text{hipótesis inductiva}}$$

es verdadera. Y queremos probar que:

$$p(k+1) : \sum_{i=1}^{k+1} (k+1-i)2^{i-1} = 2^{k+1} - (k+1) - 1 = 2^{k+1} - k - 2$$

también lo sea.

Empezando con $p(k+1)$. Acomodamos y vemos de hacer aparecer la **hipótesis inductiva**:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{k+1} (k+1-i)2^{i-1} &\stackrel{!!}{=} \sum_{i=1}^k (k-i)2^{i-1} + \sum_{i=1}^k 2^{i-1} + 0 \\ &\stackrel{\text{HI}}{=} 2^k - k - 1 + \sum_{i=1}^k 2^{i-1} \end{aligned}$$

En el !! saqué el término $k + 1$ y después agrupé de manera conveniente para separar las sumatorias. Nos queda ahora esa sumatoria que no es otra cosa que una querida y odiada *serie geométrica*, esa que no te acordás, que si empieza en 0 o en 1, pero [acá tenés la fórmulita y coso en la teoría](#).

$$\sum_{i=1}^k 2^{i-1} \stackrel{!}{=} \frac{1}{2} \cdot \sum_{i=1}^k 2^i = \frac{1}{2} \cdot \frac{2^{k+1} - 2}{2 - 1} \stackrel{!}{=} 2^k - 1$$

Por lo tanto con ese resultado:

$$\sum_{i=1}^{k+1} (k+1-i)2^{i-1} \stackrel{!!}{=} 2^k - k - 1 + 2^k - 1 = 2^{k+1} - k - 2$$

Por lo tanto $p(k+1)$ también es verdadera.

Se demostró que $p(1), p(k)$ y $p(k+1)$ son verdaderas y por el principio de inducción $p(n)$ también lo es $\forall n \in \mathbb{N}$.

Dale las gracias y un poco de amor  a los que contribuyeron! Gracias por tu aporte:

 Nad Garraz 

 Ale Teran 