

Chapitre XVII

Fonctions Trigonométriques

I. DÉFINITION ET PROPRIÉTÉS

A. RAPPEL

Soit un réel x et M le point correspondant sur le cercle trigonométrique dans une repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$

Le cosinus de x est noté $\cos(x)$, où $\cos(x)$ est l'abscisse du point M .

Le sinus de x est noté $\sin(x)$, où $\sin(x)$ est l'ordonnée du point M .

Ces deux propriétés permettent de réduire l'intervalle d'étude des fonctions cosinus et sinus à $[0; \pi]$

Par parité, on peut déduire $[-\pi; 0]$, donc $[-\pi; \pi]$.

Par périodicité on peut déduire les résultats sur \mathbb{R}

II. DÉRIVABILITÉ

A. ÉTUDE DES FONCTIONS SINUS ET COSINUS

1. THÉORÈME

Les fonctions sinus et cosinus sont dérivables sur \mathbb{R} , et pour tout réel x :

$$\sin'(x) = \cos(x) \quad \text{et} \quad \cos'(x) = -\sin(x)$$

2. TABLEAUX DE VARIATION

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos'(x) = -\sin(x)$	0	-	0
cos	1	0	-1

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin'(x) = \cos(x)$	+	0	+
sin	0	1	0

FIGURE 17.1. – Tableaux de Variation des Fonctions cosinus et sinus


3. COURBES REPRÉSENTATIVES

FIGURE 17.2. – Représentation Graphique des Fonctions cosinus et sinus

B. COMPLÉMENT1. THÉORÈME

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x} = 0$$

A. DÉMONSTRATION

La fonction sinus est continue et dérivable en 0 :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(0 + h) - \sin(0)}{h} = \sin'(0) = \cos(0) = 1$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(0 + h) - \cos(0)}{h} = \cos'(0) = -\sin(0) = 0$$