

Exercices Chapitre sur les Variables Aléatoires *

Diego Van Overberghe

13 Mai 2020

Exercice 33

- a) $p = 1 - 0,34 - 0,26 - 0,17 - 0,12 = 0,11$
b) $p = 1 - 0,26 - 0,24 - 0,14 - 0,13 - 0,04 = 0,19$

Exercice 35

a) On a :

x_i	-1	0	1	3	4	5	6	8
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{20}$

FIGURE 1 – Tableau présentant la loi de probabilité de X

- b) $P(1 \leq X \leq 5) = p_1 + p_3 + p_4 + p_5 = 0,1 + 0,15 + 0,25 + 0,2 = 0,7$
 $P(X \geq 4) = p_{-1} + p_0 + p_1 + p_3 + p_4 = 0,65$

Exercice 36

a)

x_i	-4	0	2
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{9}$	$\frac{5}{9}$	$\frac{1}{3}$

FIGURE 2 – Tableau présentant la loi de probabilité de X

- b) On a x , le nombre de jetons rouges ou verts et y , le nombre de jetons bleus.

$$\begin{cases} 2x + y = 20 \\ y = 2x \end{cases} \iff \begin{cases} x = 5 \\ y = 10 \end{cases}$$

x_i	-4	0	2
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

FIGURE 3 – Tableau présentant la loi de probabilité de X

*Page 328 du manuel Hatier

Exercice 39

On a $p = 1 - 0,12 - 0,14 - 0,21 - 0,32 - 0,13 = 0,08$

De plus, $P(U \leq 13) = 0,12 + 0,14 + 0,21 + 0,32 = 0,79$

Donc, $q = P(U \leq 13) - 0,14 - 0,10 = 0,55$

Et, $r = 1 - P(V \leq 13) - 0,10 = 0,11$

Exercice 40

a) Faux. $P(X \geq 4) = 0,15$

b) Faux. $P(2 \leq X \leq 3) = 0,35$

c) Vrai. $P(X \leq 2) = 0,15$

Exercice 50

a) $E(X) = p_0x_0 + p_1x_1 + p_2x_2 + p_3x_3 + p_4x_4 = 1,2$

$V(X) = p_0(x_0 - E(X))^2 + \dots + p_r(x_r - E(X))^2 = 1,46$

$\sigma(X) \approx 1,21$

b) $E(Y) = p_0y_0 + \dots + p_ry_r = 1,1$

$V(Y) = p_0(y_0 - E(Y))^2 + \dots + p_r(y_r - E(Y))^2 = 0,0184$

$\sigma(Y) \approx 0,14$

c) $E(Z) = p_0z_0 + \dots + p_rz_r = 1,01$

$V(X) = p_0(z_0 - E(Z))^2 + \dots + p_r(z_r - E(Z))^2 \approx 2,05$

$\sigma(Z) \approx 1,43$

Exercice 51

1) $E(X) = p_0x_0 + \dots + p_rx_r = 4,9$

$V(X) = p_0(x_0 - E(X))^2 + \dots + p_r(x_r - E(X))^2 = 1,81$

$\sigma(X) \approx 1,35$

2) a)

y_j	0	1	2	3	4	5
$P(Y = y_j)$	0,05	0,12	0,18	0,3	0,23	0,12

FIGURE 4 – Tableau présentant la loi de probabilité de Y

z_j	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4
$P(Z = z_j)$	0,05	0,12	0,18	0,3	0,23	0,12

FIGURE 5 – Tableau présentant la loi de probabilité de Z

t_j	2,8	3,7	4,6	5,5	6,4	7,3
$P(T = t_j)$	0,05	0,12	0,18	0,3	0,23	0,12

FIGURE 6 – Tableau présentant la loi de probabilité de T

b)

$$E(Y) = E(X) - 2 = 2,9$$

$$V(Y) = 1,81$$

$$\sigma(Y) \approx 1,35$$

$$E(Z) = 5,88$$

$$V(Z) \approx 2,61$$

$$\sigma(Z) = 1,62$$

$$E(T) = 5,41$$

$$V(T) \approx 1,47$$

$$\sigma(T) \approx 1,63$$

Exercice 52

a) $E(X) = p_1 x_1 + \dots + p_r x_r = 1,99$

b) $E(Y) = p_1 y_1 + \dots + p_r y_r = 2,13$

c) Au centre d'examen B, les candidats font plus d'erreurs en moyenne.

d) $\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{p_0(x_0 - E(X))^2 + \dots + p_r(x_r - E(X))^2} \approx 1,24$

$$\sigma(Y) = \sqrt{V(Y)} = \sqrt{p_0(y_0 - E(Y))^2 + \dots + p_r(y_r - E(Y))^2} \approx 1,76$$

La centre d'examen B a donc les résultats les plus dispersés.

Exercice 56

a) Les représentations graphiques peuvent tous être assimilées à des paraboles dont le sommet se situe à une abscisse de 25. Donc, les espérances des variables seront identiques. Les courbes sont symétriques par rapport à la droite d'équation $x = 25$.

b) $\sigma(X) < \sigma(Z) < \sigma(Y)$

Exercice 60

$$E(X) = p_0 x_0 + \dots + p_r x_r; \quad V(X) = p_0(x_0 - E(X))^2 + \dots + p_r(x_r - E(X))^2; \quad \sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

$$E(E_1) = -0,21$$

$$V(E_1) = 2,2259$$

$$\sigma(E_1) \approx 1,49$$

$$E(E_2) = -0,21$$

$$V(E_2) = 1,8459$$

$$\sigma(E_2) \approx 1,36$$

La marque modélisée par E_2 a une espérance identique à celle de E_1 , mais l'écart-type est beaucoup plus petit, donc il y a moins de risque d'avoir un produit très défectueux.

Exercice 61

a) Vrai. $E(aX) = aE(X)$

b) Faux. $\sigma(X + b) = \sigma(X)$

c) Vrai. $V(0,9X) = 0,9V(X)$ $\sigma(0,9X) = 0,9\sigma(X)$

Exercice 62

$$E(X) = 3,105$$

$$V(X) \approx 0,51$$

$$\sigma(X) \approx 0,72$$

$$E(Y) = 3,045$$

$$V(Y) \approx 0,38$$

$$\sigma(Y) \approx 0,62$$

$$E(Z) = 3,28$$

$$V(Z) \approx 0,67$$

$$\sigma(Z) \approx 0,82$$

- a) La production Z est la plus dispersée.
- b) La production Z a la masse moyenne la plus élevée.
- c) La production Y est la plus régulière.

Exercice 64

- a) Vrai. Les tirages sont indépendants, donc : $P(B ; R) = P(B) \times P(R) = P(R) \times P(B) = P(R ; B)$
- b) Faux. Les tirages sont indépendants, donc : $P(R ; R) = P^2(R) = \frac{1}{16}$
- c) Vrai. Les tirages sont indépendants, donc : $P(B ; B) = P^2(B) = \frac{9}{16}$

Exercice 65

- a) Il-y-a 36 issues possibles.
- b) $P(A) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$
 $P(B) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} - P(\text{"on obtient deux fois 1"}) = \frac{12}{36} - \frac{1}{36} = \frac{11}{36}$
 $P(C) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$

Exercice 66

1.




FIGURE 7 – Arbre pondéré

2. a) X prend les valeurs 0 ; 1 ; 2.
- b) $P(X = 0) = P(\bar{A})^2 = \frac{1}{25}$; $P(X = 2) = P(A)^2 = \frac{16}{25}$
 $P(X = 1) = 1 - P(X = 0) - P(X = 2) = \frac{8}{25}$
- c) $P(X \geq 1) = P(X = 1) + P(X = 2) = \frac{24}{25}$
 $P(X \leq 1) = P(X = 1) + P(X = 0) = \frac{9}{25}$

Exercice 67

- a) L'affirmation de Victor est fausse. Chaque lancer est indépendant puisque le dé n'est pas truqué.
 Sa justification est fausse parce que il considère qu'au deuxième lancer, il n'y a plus que cinq faces, or il y en a toujours six.
- b) Il y a que $\frac{11}{36}$ de chance que l'un des deux joueurs commencent à jouer au premier tour.
 Donc, l'affirmation de Valentine est fausse aussi.

Exercice 69

a)




FIGURE 8 – Arbre pondéré

- b) On pose la variable aléatoire X , qui représente le nombre d'utilisateurs abonnés. Ses valeurs possibles sont : 0 ; 1 ; 2 ; 3. On donne sa loi de probabilité par le tableau ci-dessous, avec $P(X = x_i) = P(\bar{A})^{3-x_i} \times P(A)^{x_i} \times (\text{Nombre d'issues de l'événement})$

x_i	0	1
$P(X = x_i)$	$0,38^3 \times 1 \approx 0,0549$	$0,38^2 \times 0,62 \times 3 \approx 0,2686$
x_i	2	3
$P(X = x_i)$	$0,38 \times 0,62^2 \times 3 \approx 0,4382$	$0,62^3 \times 1 \approx 0,2384$

FIGURE 9 – Tableau présentant la loi de probabilité de X

- $P(\text{"Deux des utilisateurs sont abonnés."}) = P(X = 2) \approx 0,4382$
- $P(\text{"Au moins deux des utilisateurs sont abonnés."}) = P(X \geq 2) \approx 0,6766$
- $P(\text{"Au plus deux des utilisateurs sont abonnés."}) = P(X \leq 2) \approx 0,7617$

```
c) import random
def s_abonnes(nbUsagers=10): # Voir Note 1
    X=0
    for ind in range(nbUsagers):
        if random.random()<0.62:
            X+=1
    return X

print(s_abonnes())
```

*# Note 1: Il s'agit ici d'un "default parameter", c'est-à-dire que
si l'utilisateur ne donne pas d'argument, alors 10 est utilisé.*

On cherche quelle est la probabilité que sept des utilisateurs sur les dix soient abonnés. J'utilise la méthode décrite dans le "Savoir-Faire" n° 4, Page 323.

Si on imagine l'arbre pondéré qui modélise la situation, on obtient un arbre énorme. La difficulté est de retrouver combien de branches de l'arbre satisfont notre événement.

$$2^{10} = 1024 \text{ branches au niveau de la dernière colonne}$$

$$\sum_{n=1}^{10} (2^n) = 2048 \text{ branches en total}$$

Dont seulement une petite partie satisfait $P(\text{"7 utilisateurs sont abonnés"})$:

$$\frac{10!}{7! \times 3!} = 120^\dagger$$

Finalement, on a $P(Y = 7) = 0,62^7 \times 0,38^3 \times 120 \approx 0,2319$

Ceci est cohérent avec ce que je retrouve dans mes simulations ($n = 10\,000$).

Cependant, je suis certain qu'il existe une méthode beaucoup plus simple de résoudre le problème, et que ne demande pas au moins une heure de recherche pour pouvoir calculer le nombre de combinaisons avec répétition possibles...

†. 10 niveaux dans l'arbre, avec 7 "la personne est abonnée", et 3 "la personne n'est pas abonnée".

Exercice 71

a)

Numéro sur la face	1	2	3	4
1	2	3	4	5
2	3	4	5	6
3	4	5	6	7
4	5	6	7	8

FIGURE 10 – Tableau à double entrée présentant l'ensemble des valeurs prises par S

b)

s_i	2	3	4	5	6	7	8
$P(S = s_i)$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$

FIGURE 11 – Tableau présentant la loi de probabilité de S

c)

$$P(A) = p_2 + p_4 + p_6 + p_8 = 0,5 \quad \text{ou} \quad P(A) = \frac{8}{16}$$

$$P(B) = p_3 + p_5 + p_7 = 0,5 \quad \text{ou} \quad P(B) = \frac{8}{16}$$

$$P(C) = p_2 + p_4 + p_5 + p_7 + p_8 = \frac{11}{16} \quad \text{ou} \quad P(C) = \frac{11}{16}$$

$$P(D) = p_3 = \frac{1}{8} \quad \text{ou} \quad P(D) = \frac{2}{16}$$

d)

— Les deux expériences sont indépendantes, donc $P(E) = 2(P(A) \times P(B)) = 0,50$

— Les deux expériences sont indépendantes, donc $P(\bar{C} \cap \bar{C}) = \left(\frac{5}{16}\right)^2 = \frac{25}{256} \approx 0,0977$

Exercice 73

- 1) On définit A : “L’adhérent a moins de 15 ans.”; B : “l’adhérent a entre 15 et 25 ans.”; C : “L’adhérent a entre 26 et 60 ans.”; D : “L’adhérent a plus de 60 ans.”




FIGURE 12 – Arbre pondéré

- 2) Je n'avais pas anticipé le conflit entre les noms des évènements, désormais, les événements A et B du manuel seront notés A' et B', respectivement.
- Les réponses sont indépendantes, donc, $P(A') = P(A \cap A) = P(A)^2 = 0,09$
 - $P(B') = P(D) + P(C \cap D) + P(B \cap D) + P(A \cap D) = 0,0591$
- 3) a) $0,30^{10} = 6 \times 10^{-6} = 0,000006$
- b) $P(\text{"elles ont tous plus que 60 ans"}) = 0,03^{10} = 6 \times 10^{-16}$
D'où $P(\text{"elles n'ont pas tous plus que 60 ans"}) = 1 - 1 \times 10^{-16} \approx 0,999999$

Exercice 75

a)

x_i	0	1	2	3	4
$P(X = x_i)$	$0,55^4 \approx 0,092$	$0,55^3 \times 0,45^1 \times 4 \approx 0,300$	$0,55^2 \times 0,45^2 \times 6 \approx 0,368$	$0,55^1 \times 0,45^3 \times 4 \approx 0,200$	$0,45^4 \approx 0,041$

FIGURE 13 – Tableau présentant la loi de probabilité de X

- b) $E(X) = p_0x_0 + \dots + p_rx_r = 1,8$
C'est-à-dire qu'en moyenne, 1,8 sur 4, soit 45%, des femmes âgées de 16 ans ou plus, font de l'exercice.

Exercice 79

- 1) $P(X = k) = P(X \leq k) - P(X \leq k - 1)$
- 2) a) $P(X = k) = P(X \geq k) - P(X \geq k + 1)$
- b)
- $$E(X) = p_0x_0 + p_1x_1 + p_2x_2 + p_3x_3$$
- $$\Leftrightarrow E(X) = P(X = 0) \times 0 + P(X = 1) \times 1 + P(X = 2) \times 2 + P(X = 3) \times 3$$
- $$\Leftrightarrow E(X) = P(X \geq 1) - P(X \geq 2) + 2(P(X \geq 2) - P(X \geq 3)) + 3(P(X \geq 3) - P(X \geq 4))$$
- $$\Leftrightarrow E(X) = P(X \geq 1) - P(X \geq 2) + 2P(X \geq 2) - 2P(X \geq 3) + 3P(X \geq 3) - 3P(X \geq 4)$$
- $$\Leftrightarrow E(X) = P(X \geq 1) + P(X \geq 2) + P(X \geq 3) - 3P(X \geq 4)$$

Or, X ne prend que ses valeurs dans $\llbracket 0;3 \rrbracket$, donc, $P(X \geq 4) = 0$

$$E(X) = P(X \geq 1) + P(X \geq 2) + P(X \geq 3)$$

Exercice 80

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & E(Z) = 0 \\ \iff & E\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right) = 0 \\ \iff & \frac{E(X) - \mu}{\sigma} = 0 \\ \iff & E(X) = \mu \\ \iff & E(X) = E(X) \end{aligned}$$

On peut donc conclure que $E(Z) = 0$

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad & V(Z) = 1 \\ \iff & V\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right) = 1 \\ \iff & \frac{V(X)}{\sqrt{\sigma}} = 1 \\ \iff & V(X) = \sqrt{\sigma} \\ \iff & V(X) = V(X) \end{aligned}$$

On peut donc conclure que $V(Z) = 1$

Exercice 88

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & P(\text{"n pile"}) = 2^n \\ \text{b)} \quad & P(\text{"Au moins un face"}) = 1 - 2^n \\ \text{c)} \quad & n=1 \quad \text{En VBA} \\ & \text{Do While } 1-2^n \leq 0.999 \\ & \quad n = n + 1 \\ & \text{Loop} \end{aligned}$$

Exercice 95

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & \text{On d duit } p_2 = \frac{1}{4}, \text{ parce que } \sum_{i=1}^r (p_i) = 1 \\ & E(C) = 0 \\ \iff & p_1 x_1 + p_2 x_2 = 0 \\ \iff & \frac{15}{20} \times -1 + \frac{5}{20} x = 0 \\ \iff & x = 3 \end{aligned}$$

c_i	-1	3
$P(C = c_i)$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$

FIGURE 14 – Tableau présentant la loi de probabilité de C

On déduit $p_2 = \frac{1}{9}$, parce que $\sum_{i=1}^r (p_i) = 1$

$$E(M) = 0$$

$$\Leftrightarrow p_1 x_1 + p_2 x_2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{-8}{9} + \frac{z}{9} = 0$$

$$\Leftrightarrow z = 8$$

m_i	-1	8
$P(M = m_1)$	$\frac{8}{9}$	$\frac{1}{9}$

FIGURE 15 – Tableau présentant la loi de probabilité de M

b) Pas forcément, il s'agit de deux indicateurs statistiques différents.

$$E(C) = 0$$

$$V(C) = 3$$

$$\sigma(C) = \sqrt{3}$$

$$E(M) = 0$$

$$V(C) = 8$$

$$\sigma(C) = \sqrt{8}$$