




Роль NAD⁺

NAD⁺ необходим для окислительно-восстановительных реакций и синтеза основных ферментов, например, сиртуинов (SIRT1, SIRT6) и PARPs, которые участвуют в процессах восстановления ДНК и клеточного метаболизма. С возрастом, при хроническом воспалении и под воздействием фермента CD38 уровень NAD⁺ снижается, что приводит к потере коллагена, эластичности и способности кожи к обновлению.

Механизм действия

The diagram features a central orange hexagon with the text "NAD+ COMPLEX" in white and yellow. To the left of the hexagon, the text "Деление Клеток" (Cell Division) is written. To the right, the text "Окислительно-восстановительные Реакции" (Oxidative-Reductive Reactions) is written. The hexagon is connected by lines to four blue dots, which are further connected to a larger, fainter hexagon in the background.



Ниацинамид	Пептиды и Коллаген
Ровный цвет лица и укрепление барьера кожи	Улучшение упругости и сокращение морщин

Идеально подходит для 

- Лиц, стремящихся предотвратить или устранить ранние признаки старения
- Сухой, грубой или тусклой кожи, нуждающейся в обновлении
- Кожи, теряющей упругость, с неровным тоном и пигментными пятнами

Способ Применения

Глубина введения	0,5-2 мм в дерму (примерно под углом 30°)
Техника	Микропульсная, Наплаж (расстояние между точками инъекций – 1 см для равномерного распределения)
Игла	30–32G, длина 4–6 мм
Объём на одну точку	0,01–0,05 мл
Курс	3 процедуры с интервалом 1–2 недели;

Длина игл/Длина игл	0,25–0,5 мм
Курс	5 процедур с интервалом 1–2 недели; поддерживающая терапия каждые 3–6 месяцев
Применение	Нанесите подготовленный раствор на очищенную кожу; используйте дермалерол для доставки активных веществ и синтеза коллагена.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

- Может возникнуть легкое покраснение или припухлость, которые обычно проходят в течение нескольких часов.
- Место инъекции может становиться чувствительным и могут появиться синяки,

Противопоказания

- Экзема, раны или дерматит в зоне обработки.
- Индивидуальная непереносимость или повышенная чувствительность к любым компонентам.
- Беременность или кормление грудью (проконсультируйтесь со специалистом).
- Аутоиммунные заболевания или неконтролируемый сахарный диабет (рекомендуется консультация врача).

Хранение	Хранить при комнатной температуре (1-30°С) в месте, защищенном от прямых солнечных лучей и заморозания.
Срок годности	24 месяца с даты производства. Срок годности указан на упаковке.
Использование	Восстановить раствор сразу перед применением.
	[Лиофилизат] Sodium Hyaluronate, Nicotinamide Adenine Dinucleotide (25%). [Ампула с раствором] Water, Sodium Chloride, Nicotinamide Mononucleotide (0.01%), Panthoenl, Collagen, Nicinamide, Tyrosine, Glycerin, Butylene Glycol, Propanediol, Ascorbic Acid, Glutathione

 www.mybncglobal.com