



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**о государственной регистрации пестицида или агрохимиката**

№ 2015

от « 20 » августа 2010г

Настоящее свидетельство выдано ООО «Дюпон Наука и Технологии», 1027710006059  
(наименование организации, ОГРН,

ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. №109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Хармони Классик, ВДГ (187,5 г/кг тифенсульфурон-метила + 187,5 г/кг  
(наименование пестицида или агрохимиката)

хлоримурон-этила)

получил государственную регистрацию за № 2015-10-108-276-0-1-3-0

на срок по « 19 » августа 2020г. и допускается к обороту на территории Российской Федерации со следующими регламентами:

**Для сельскохозяйственного производства:**

Норма применения препарата, кг/га	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработок)
0,025-0,035	Соя	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов начиная с фазы первого тройчатого листа сои и ранние фазы роста сорняков. Не обрабатывать растения сои в состоянии стресса. Следует соблюдать ограничения по севообороту: в случае пересева высевать только сою. Спустя три месяца можно высевать озимые зерновые культуры. Весной – зерновые колосовые, овес, кукурузу, горох. На вторую весну – подсолнечник, рапс и упомянутые выше культуры. На третью весну – свеклу, картофель, лук. Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га	60(1)
0,035-0,05		Однолетние и некоторые многолетние (осот полевой) двудольные сорняки	Опрыскивание посевов начиная с фазы первого тройчатого листа сои и ранние фазы роста сорняков. Не обрабатывать растения сои в состоянии стресса. Следует соблюдать ограничения по севообороту: в случае пересева высевать только сою. Спустя три месяца можно высевать озимые зерновые культуры. Весной – зерновые колосовые, овес, кукурузу, горох. На вторую весну – подсолнечник, рапс и упомянутые выше культуры. На третью весну – свеклу, картофель, лук. Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га	
0,025-0,05		Однолетние и некоторые многолетние (осот полевой) двудольные сорняки	Опрыскивание посевов начиная с фазы первого тройчатого листа сои и ранние фазы роста сорняков в смеси с Тренд 90, Ж (200 мл/га). Не обрабатывать растения сои в состоянии стресса. Следует соблюдать ограничения по севообороту: В случае пересева высевать только сою. Спустя три месяца можно высевать озимые зерновые культуры. Весной – зерновые колосовые, овес, кукурузу, горох. На вторую весну – подсолнечник, рапс и упомянутые выше культуры. На третью весну – свеклу, картофель, лук. Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га	

Сроки безопасного выхода на обработанные площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Запрещается применение препарата: в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов; в личных подсобных хозяйствах; авиационным методом.

Заместитель Руководителя Россельхознадзора

(подпись)

А.И. Саурин

(Ф.И.О.)

М.П.