

NHICEJEXOS POCCHE CBNAETEAECTBO

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 319	от «»	апреля	2014
Настоящее свидетель ООО «Дюпон Нау	ство выдано ука и Технологии»,	ОГРН 102771	<mark>0006059</mark>
		Janes State	
	ание Регистранта, ОГРН, ФИО индивиду		
В соответствии с Фед	еральным законом о	г 19 июля 1997	г. № 109-ФЗ
«О безопасном обращении	и с пестицидами и аг	рохимикатами»	3
пестицид Танос, ВД	Г (250 г/кг фамокса		цимоксанила)
The state of the s			
получил государствен	нную регистрацию за	029	<mark>9-02-319-1</mark>
на срок по « <u>14</u> »_	апреля	2024г. и допу	ускается к обороту на
территории Российской ф	Редерации со следую	ощими регламен	тами применения:
		1	

Директор Департамента растепиеводства, химизации

и защиты растений П.А. Чекмарев

№000353

Для сельскохозяйственного производства:

Норма приме- нения препарата кг/га	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожида- ния (кратно сть обрабо- ток)
1	2	3	4	5
0,6	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации в фазы: начало смыкания рядков, бутонизация, конец цветения, рост ягод и клубней. Расход рабочей жидкости — 400 л/га	15(4)
0,4	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое (до цветения), последующие – с интервалом 8-12 дней. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га	30(3)
0,5-0,6	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 8-12 дней. Расход рабочей жидкости – 400 л/га	14(4)
0,6	Подсолнечник	Белая гниль, серая гниль, ложная мучнистая роса,	Опрыскивание в период вегетации в фазы: 4-6 настоящих листьев (профилактическое) и бутонизации. Расход рабочей жидкости — 400 л/га	50(2)
0,4		фомопсис, фомоз	Опрыскивание в период вегетаций в фазы: 4-6 настоящих листьев (профилактическое), бутонизации и начала цветения. Расход рабочей жидкости — 400 л/га	50(3)
0,5-0,6	Лук (кроме лука перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 8-12 дней. Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га	21(3)

Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Танос, ВДГ (250 г/кг фамоксадона+250 г/кг цимоксанила) от 15 апреля 2014 г. № 319

Для личных подсобных хозяйств:

Норма приме- нения препарата	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожида- ния (кратно сть обрабо- ток)
1	2	3	4	5
4 г/10 л воды	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 10 л/100	30(3)
6 г/10 л воды	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	M ²	14(4)
	Картофель			15(4)
12 г/10 л воды	Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое (до цветения), последующие – с интервалом 8-12 дней. Расход рабочей жидкости – 5 л/100 м ²	21(3)