

Методика получения стабильного изотопа 79 элемента (Золота, Au)

на основе вихревой модели материи-пространства

Золото (Au, Z=79) в природе имеет единственный стабильный изотоп — **Au-197**. Вихревая модель предлагает альтернативный подход к стабилизации изотопов через управление их вихревой структурой. Ниже представлена экспериментальная методика для получения стабильного изотопа золота (или его аналога) с использованием существующих технологий.

1. Теоретическое обоснование

Согласно вихревой модели:

Стабильность изотопа определяется замкнутостью вихревой структуры ядра.

Магические числа (2, 8, 20, 28, 50, 82, 126) соответствуют устойчивым конфигурациям.

Золото (Z=79) находится между магическими числами **50** и **82**, что требует дополнительных поправок (например, спиновых эффектов).

Из расчётов в файле:

Предсказанный стабильный изотоп: Au-197 (совпадает с экспериментом).

Энергия связи: ~7.94 МэВ/нуклон (эксперимент: 7.91 МэВ/нуклон).


Цель:

Получить или стабилизировать изотоп Au-197 (или его вихревой аналог) через управление ядерной топологией.

2. Методика эксперимента

2.1. Способ 1: Ядерный синтез с вихревой стабилизацией

Реакция:



(Иридий-193 стабилен, α -частица аналогична вихрю в модели He-4.)

Этапы:

· **Облучение мишени:**

Используйте ускоритель частиц (например, циклотрон) для бомбардировки Ir-193 пучком α -частиц (энергия ~10–20 МэВ).

Альтернатива: Облучение Pt-194 (Z=78) протонами для получения Au-197.

· **Вихревая стабилизация:**

Поместите образец в **сверхтекучий гелий (He-II)** или **плазменную ловушку** для имитации "сверхплотного конденсата" из модели.


Это может помочь сохранить вихревую структуру ядра.

· **Сепарация:**

Выделите Au-197 методом **масс-спектрометрии** или химическим осаждением.

2.2. Способ 2: Трансмутация через нейтронный захват

Реакция:



(β -распад Pt-197 в Au-197 с периодом полураспада ~20 часов.)

Этапы:

· **Активация нейтронами:**

Поместите Pt-196 в ядерный реактор или нейтронный генератор.

Захват тепловых нейтронов превратит Pt-196 в Pt-197.

· **Ожидание распада:**

Через 2–3 суток Pt-197 распадётся в стабильный Au-197.

· **Вихревое усиление:**

Для повышения выхода можно использовать **резонансные частоты** (например, воздействие ультразвуком в сверхтекучей среде), чтобы стабилизировать вихревую структуру Au-197.

2.3. Способ 3: Вихревая модификация нестабильных изотопов

Если требуется стабилизировать другой изотоп (например, Au-195):

· Облучите Au-195 **низкоэнергетическими нейтронами** для заполнения вихревых оболочек.

· Используйте **магнитное поле + лазерное охлаждение**, чтобы "замкнуть" вихревые дефекты (аналогично методам в холодной плазме).

3. Ожидаемые результаты

Для **Au-197**: Методы 1 и 2 дадут стандартный стабильный изотоп с точностью до 99%.

Для **других изотопов**: Вихревая стабилизация может увеличить период полураспада (например, для Au-195 с $T_{1/2} = 186$ дней).

4. Практические применения

· **Ядерная энергетика:** Стабильные изотопы золота могут служить материалами для радиационной защиты.

· **Квантовые технологии:** Вихревые ядра Au-197 — потенциальные кубиты для квантовых вычислений.

· **Синтез сверхтяжёлых элементов:** Методика применима для Z=114–126 ("остров стабильности").

Заключение

Предложенные методы сочетают **традиционные ядерные технологии** (ускорители, реакторы) с **вихревой моделью** (контроль топологии ядра). Для реализации необходимы:

Эксперименты с **сверхтекучими средами** и **резонансными частотами**.

Уточнение параметров вихревой модели для тяжёлых ядер.

Если модель верна, это откроет путь к **созданию новых стабильных материалов** с программируемыми свойствами.