

Seminar

Panjerjev razred

Lana Herman

Tin Markon

Mentor: prof. dr. Janez Bernik

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za matematiko in fiziko

Marec, 2019

Kazalo

1 Problem	2
2 Rešitev	2

1 Problem

Za verjetnostno masno funkcijo $p : \mathbb{N}_0 \rightarrow [0, 1]$ slučajne spremenljivke z vrednostmi v \mathbb{N}_0 pravimo, da je v Panjerjevem razredu, če obstajata realni števili a in b taki da je

$$p_k = p_{k-1} \left(a + \frac{b}{k} \right), \quad k \in \mathbb{N}.$$

Dokaži, da je p v Panjerjevem razredu, če in samo če je ene izmed sledečih oblik (povsod teče n po \mathbb{N}_0):

1. $p_n = \delta_0(n)$ (Diracova masa v 0).
2. $p_n = \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda}$ za nek $\lambda \in (0, \infty)$ (Poissonova porazdelitev).
3. $p_n = \binom{\alpha+n-1}{n} p^n (1-p)^\alpha$ za neka $\alpha \in (0, \infty), p \in (0, 1)$
(Tu je $\binom{\alpha+n-1}{n}$ posplošeni binomski simbol, ki se izraža $\binom{\alpha+n-1}{n} = \frac{\Gamma(\alpha+n)}{\Gamma(n+1)\Gamma(\alpha)}$).
4. $p_n = \binom{N}{n} p^n (1-p)^{N-n}$ za neka $p \in (0, 1), N \in \mathbb{N}$ (binomska porazdelitev).

2 Rešitev

(\Leftarrow) Najprej predpostavimo, da so Diracova masa v 0, Poissonova porazdelitev, negativna binomska porazdelitev ter binomska porazdelitev v Panjerjevem razredu. Iščemo taki realni števili a in b , da bo veljala enakost $p_k = p_{k-1} \left(a + \frac{b}{k} \right)$.

1. $p_1 = p_0(a+b) = 0 = p_2 = p_3 = \dots = p_k, \quad \forall k \in \mathbb{N}$, sledi $a+b=0, a=-b$
2. $\frac{p_k}{p_{k-1}} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda} (k-1)!}{\lambda^{k-1} e^{-\lambda} k!} = \frac{\lambda}{k}$, sledi $a=0, b=\lambda$
3. Ker velja $\Gamma(n) = (n-1)!$ za $\forall n \in \mathbb{N}$, in $\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha)$ za $\forall \alpha > 0$, velja

$$\binom{n+\alpha-1}{n} = \frac{(n+\alpha-1)!}{n!(\alpha-1)!} = \frac{\Gamma(n+\alpha)}{n!\Gamma(\alpha)}.$$

$$\frac{p_n}{p_{n-1}} = \frac{\binom{n+\alpha-1}{n} p^n (1-p)^\alpha}{\binom{n-1+\alpha-1}{n-1} p^{n-1} (1-p)^\alpha} = \dots = \frac{\Gamma(\alpha+n)}{n\Gamma(\alpha+n-1)} p = \frac{(\alpha+n-1)\Gamma(\alpha+n-1)}{n\Gamma(\alpha+n-1)} p =$$

$$p + p(\alpha-1) \frac{1}{n}, \text{ sledi } a=p, b=p(\alpha-1)$$
4. $\frac{p_n}{p_{n-1}} = \frac{\binom{N}{n} p^n (1-p)^{N-n}}{\binom{N}{n-1} p^{n-1} (1-p)^{N-n+1}} = \dots = \frac{p}{1-p} (N+1) \frac{1}{n} - \frac{p}{1-p}, \text{ sledi } a =$

$$- \frac{p}{1-p}, b = \frac{p}{1-p} (N+1)$$

(\Rightarrow) Sedaj predpostavimo, da obstajata taki realni števili a in b , da velja enakost $p_k = p_{k-1}(a + \frac{b}{k})$. Dokazati moramo, da je p v Panjerjevem razredu, če je Diracova masa v 0, Poissonova porazdelitev, negativna binomska porazdelitev ali binomska porazdelitev.

Ker mora biti $p_k \geq 0$ za $\forall k \in \mathbb{N} \Rightarrow a + b \geq 0$.

1. $a + b = 0$:

$$p_1 = p_0(a + b) = 0 = p_2 = p_3 = \dots = p_k.$$

Ker mora veljati

$$1 = \sum_{k=0}^{\infty} p_k,$$

sledi $p_0 = 1$ in tako dobimo Diracovo maso v točki 0.

2. $a + b > 0$:

- $0 < a < 1$: Določimo novo spremenljivko $\alpha = \frac{a+b}{a}$, sledi $b = a(\alpha - 1)$,

$$\begin{aligned} p_1 &= p_0(a + b) = p_0 a \alpha, \\ p_2 &= p_1(a + \frac{b}{2}) = p_1 a (\frac{\alpha}{2} + \frac{1}{2}) = p_0 a^2 \alpha (\alpha + 1) \frac{1}{2}, \\ &\vdots \\ p_k &= p_0 a^k \frac{1}{k!} \frac{(\alpha + k - 1)!}{(\alpha - 1)!} = p_0 a^k \binom{\alpha + k - 1}{k}. \end{aligned}$$

Veljati mora

$$\sum_{k=0}^{\infty} p_k = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha + k - 1}{k} p_0 a^k = p_0 \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha + k - 1}{k} a^k = 1.$$

Velja tudi:

$$\begin{aligned} \binom{\alpha + k - 1}{k} &= \frac{(\alpha + k - 1)(\alpha + k - 2) \dots (\alpha + k - (k - 1))(\alpha + k - k)(\alpha - 1)!}{k!(\alpha - 1)!} = \\ &= (-1)^k \frac{(-\alpha)(-\alpha - 1) \dots (-\alpha - k + 1)}{k!} = (-1)^k \binom{-\alpha}{k}. \end{aligned}$$

Torej je:

$$p_0 \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha + k - 1}{k} a^k = p_0 \sum_{k=0}^{\infty} \binom{-\alpha}{k} (-1)^k a^k = p_0 \sum_{k=0}^{\infty} \binom{-\alpha}{k} (-a)^k = p_0 (1 + (-a))^{-\alpha},$$

kjer smo upoštevali binomsko vrsto in dejstvo, da je $|a| < 1$. Iz tega sledi enakost $p_0 = (1 - a)^\alpha$. Od tod dobimo negativno binomsko porazdelitev.

- $a = 0$: Velja $p_k = p_{k-1} \frac{b}{k}$. Če razpišemo, dobimo:

$$\begin{aligned} p_1 &= p_0 b, \\ p_2 &= p_0 \frac{b^2}{2}, \\ &\dots \\ p_k &= p_0 \frac{b^k}{k!}. \end{aligned}$$

Ker mora veljati

$$\sum_{k=0}^n p_k = 1, \text{ sledi } \sum_{k=0}^{\infty} p_0 \frac{b^k}{k!} = p_0 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{b^k}{k!} = p_0 e^b = 1.$$

Torej velja enakost $p_0 = e^{-b}$ in $p_k = e^{-b} \frac{b^k}{k!}$, kar pa je ravno Poissonova porazdelitev s parametrom b .

- $a < 0$: $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{p_k}{p_{k-1}} = \lim_{k \rightarrow \infty} (a + \frac{b}{k}) = a < 0$, iz česar sledi, da obstaja tak $N \in \mathbb{N}$, da velja $a + \frac{b}{N+1} = 0$ (vsi členi od nekega N dalje so enaki 0, ker mora biti verjetnostna masna funkcija nenegativna). Če izrazimo b , dobimo $b = -a(N+1)$. To vstavimo v Panjerjevo zvezo $p_k = p_{k-1}(a + \frac{b}{k})$:

$$\begin{aligned} p_1 &= p_0(a - a(N+1)) = p_0 a(-1)N, \\ p_2 &= p_1(a - a \frac{N+1}{2}) = p_0 a^2 \frac{1}{2} (-1)^2 N(N-1), \\ &\vdots \\ p_k &= p_0 a^k \frac{1}{k!} N(N-1) \cdots (N-k+1) (-1)^k \\ &= p_0 a^k \frac{1}{k!} \frac{N!}{(N-k)!} (-1)^k = p_0 (-a)^k \binom{N}{k}. \end{aligned}$$

Vemo, da mora veljati

$$\sum_{k=0}^{\infty} p_k = 1 \rightarrow \sum_{k=0}^N \binom{N}{k} p_0 (-a)^k = p_0 \sum_{k=0}^N \binom{N}{k} (-a)^k = p_0 (1-a)^N = 1 \rightarrow p_0 = (1-a)^{-N}.$$

(Uporabili smo binomski izrek.)

Če vstavimo $a = \frac{-p}{1-p}$ dobimo:

$$p_k = \binom{N}{k} (1 + \frac{p}{1-p})^{-N} (\frac{p}{1-p})^k = \binom{N}{k} (\frac{1}{1-p})^{-N} \frac{p^k}{(1-p)^k} = \binom{N}{k} (1-p)^{N-k} p^k,$$

kar pa je ravno binomska porazdelitev.