

# Matemática I

## Lógica e Teoria de Conjuntos

Diogo Ribeiro

POLITÉCNICO DO PORTO  
ESCOLA SUPERIOR DE MEDIA ARTES E DESIGN

# Expressões Algébricas

- ▶ Expressões onde surgem uma ou mais variáveis.

# Expressões Designatórias e Condições

- ▶ **Expressões Designatórias:** expressões algébricas que se transformam em termos quando se concretizam as variáveis.
- ▶ **Condições:** expressões algébricas que se transformam em proposições quando se concretizam as variáveis.

$$3x + 2 = 1$$

**Conjunto-solução:** conjunto de valores para os quais a concretização da variável leva a proposições verdadeiras.

$$\text{Em } \mathbb{R}, 3x + 2 = 1 \quad \text{CS} = -\frac{1}{3}$$

# Classificação de Condições

- ▶ Possíveis não universais: algumas concretizações da variável conduzem a proposições verdadeiras.
- ▶ Possíveis universais: todas as concretizações da variável conduzem a proposições verdadeiras.
- ▶ Impossíveis: nenhuma concretização da variável conduz a proposições verdadeiras.

Exemplos em  $\mathbb{R}$ :

- ▶  $x^2 = 1$
- ▶  $x^2 > -1$
- ▶  $x^2 < -1$

# Quantificadores

- ▶  $\forall$ : Quantificador Universal
- ▶  $\exists$ : Quantificador Existencial

Exemplos:

$$\forall n \in \mathbb{N}, n > 0$$

$$\exists x \in \mathbb{Z} : 3x = -21$$

# Segundas Leis de DeMorgan

$$\sim \forall x, p(x) \iff \exists x : \sim p(x)$$

$$\sim \exists x : p(x) \iff \forall x, \sim p(x)$$

Exemplos:

$$\sim \forall x \in \mathbb{R}, 2x = 1 \iff \exists x \in \mathbb{R} : 2x \neq 1$$

$$\sim \exists x \in \mathbb{N} : x^2 < 0 \iff \forall x \in \mathbb{N}, x^2 \geq 0$$

# Operações com Conjuntos

- ▶ Reunião:  $A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$
- ▶ Interseção:  $A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$
- ▶ Complementar:  $A' = \{x : x \notin A\}$
- ▶ Diferença:  $A \setminus B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}$

# Relações entre Conjuntos

- Igualdade de conjuntos:

$$A = B \iff \forall x, (x \in A \iff x \in B)$$

- Subconjunto:  $A \subset B \iff \forall x, (x \in A \Rightarrow x \in B)$



# Propriedades das Operações com Conjuntos

- ▶ **Comutativa:**  $A \cup B = B \cup A$ ,  $A \cap B = B \cap A$
- ▶ **Associativa:**  $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ ,  
 $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
- ▶ **Idempotência:**  $A \cup A = A$ ,  $A \cap A = A$
- ▶ **Elemento Neutro:**  $A \cup \emptyset = A$ ,  $A \cap \mathcal{U} = A$
- ▶ **Elemento Absorvente:**  $A \cup \mathcal{U} = \mathcal{U}$ ,  $A \cap \emptyset = \emptyset$
- ▶ **Distributiva:**  $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ ,  
 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

# Primeiras Leis de DeMorgan para Conjuntos

▶  $(A \cup B)' = A' \cap B'$

▶  $(A \cap B)' = A' \cup B'$