

ধানের ব্লাস্ট রোগ দমনে কৃষকদের করণীয়

রোগ পরিচিতি: ধানের সবচেয়ে ক্ষতিকর একটি রোগ হল ধানের ব্লাস্ট। এ রোগ এক প্রকার ছত্রাক জীবাণু দ্বারা হয়। এ রোগটি প্রধানত আমন ও বোরো মৌসুমে হয়ে থাকে। আমন মওসুমে প্রধানত সুগন্ধি ধানের জাতে হয়ে থাকে। ধানের চারা অবস্থা হতে শুরু করে বৃদ্ধির সব পর্যায়ে এ রোগটি হতে পারে। আক্রমণের পর্যায় অনুযায়ী এ রোগটি পাতা ব্লাস্ট, গিট ব্লাস্ট ও শিষ/নেক ব্লাস্ট নামে পরিচিত। রোগ প্রবণ জাতে এ রোগের আক্রমণে ১০০% পর্যন্ত ফলন নষ্ট হতে পারে।

পাতা ব্লাস্ট: ব্লাস্ট রোগের জীবাণু পাতায় আক্রমণ করলে প্রথমে সূচালু দাগ হতে ডিম্বাকৃতির ছোট ছোট পানি চোষা খুসর দাগ দেখা যায় আস্তে আস্তে দাগগুলি বড় হয়ে মাঝখানটা খুসর বা সাদা ও কিনারা বাদামী রং ধারণ করে। দাগগুলি একটু লম্বাটে হয়ে দেখতে অনেকটা চোখের আকৃতির মত দেখায়। রোগকাতর জাতে একাধিক দাগ মিশে গিয়ে শেষ পর্যন্ত পুরো পাতাই শুকিয়ে মারা যায় (চিত্র-১)। **গিট ব্লাস্ট:** রোগের জীবাণু যখন গিটে আক্রমণ করে তখন গিট কালো হয়ে দুর্বল হয়ে যায় ও ভেঙ্গে পড়ে তখন একে গিট ব্লাস্ট বলে। এ অবস্থায় আক্রান্ত গিটের উপরের অংশ মারা যায় (চিত্র-২)। **শিষ ব্লাস্ট:** বৃষ্টি বা ঘন কুয়াশার জন্য শিশির ধানের ডিগ পাতা অথবা শিষের গোড়ার সংযুক্ত স্থানে পানি জমে। যার ফলে উক্ত পানি জমে থাকা স্থানে বাতাসে ভেসে বেড়ানো ব্লাস্ট রোগের জীবাণু উক্ত স্থানে আক্রমণ করে আক্রান্ত স্থান কালচে বাদামী দাগ তৈরি করে। পরবর্তীতে আক্রান্ত শিষের গোড়া হতে উপরের শিষে খাবার পৌঁছাতে না পেরে আক্রান্ত স্থানের উপরের অংশ শুকিয়ে ধানের দানা চিটা হয়ে যায় (চিত্র-৩)। আক্রমণ প্রবল হলে রোগকাতর জাতে শিষ ভেঙ্গে যেতে পারে। শিষের গোড়া ছাড়া ও শিষের যেকোন স্থানে এ রোগের জীবাণু আক্রমণ করতে পারে। শিষ ব্লাস্ট রোগটি ছড়া মরা হিসাবেও কৃষকের কাছে পরিচিত।



চিত্র-১. পাতা ব্লাস্ট



চিত্র-২. গিট ব্লাস্ট



চিত্র-৩. শিষ ব্লাস্ট

রোগ হওয়ার পূর্বে ব্যবস্থাপনা (মূলত শিষ ব্লাস্ট দমনে আগাম করণীয়)

- ▶ পটাস সার শেষ বার ইউরিয়া উপরি প্রয়োগের সময় বিঘা প্রতি ৫ কেজি অতিরিক্ত ব্যবহার করা।
- ▶ অতি রোগ প্রবন এলাকায় মধ্যম মাত্রার ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী জাত ব্রি ধান৭৪ চাষ করা।
- ▶ রোগ হোক বা নাহোক ব্লাস্ট রোগ সংবেদনশীল জাত বিশেষ করে আমন মওসুমের সকল সুগন্ধি জাতে ও বোরো মওসুমে প্রায় সব জাতেই শিষ ব্লাস্ট রোগ দমনের জন্য অবশ্যই আগাম ব্যবস্থাপনা নিতে হবে।
- ▶ ধান গাছের খোড় অবস্থায় যদি ব্লাস্ট রোগের অনুকূল আবহাওয়া বিরাজমান থাকে, তাহলে ঐ এলাকার ধানের জমিতে রোগ হোক বা না হোক পুরোপুরি খোড় আসা অর্থাৎ শিষ বের হবার আগ মুহূর্তে একবার ও শিষ বের হবার পর আরেকবার (অর্থাৎ ১ম স্প্রে ৭-১০ দিন পর অর্থাৎ ফুল ফোঁটা পর্যায়) মোট দুইবার বিকেল বেলায় ট্রুপার ৭৫ ডলিউপি অথবা অনুমোদনকৃত যেকোন ট্রাইসাইক্লোজল গুপের ছত্রাকনাশক ১ গ্রাম ১ লিটার পানি হারে অর্থাৎ ১৬ লি: পানিতে ১৬ গ্রাম ওষধ ৮ শতক জমিতে আগাম স্প্রে করতে হবে। এ ছাড়া অন্যান্য অনুমোদিত ছত্রাকনাশক যেমন-জিল/ নাটিভো/ এমিস্টার টপ/ম্যাকটিভো/ ডিফা/ইন্দোফিলসবান/ সেলতিমা/ অবনি/ দোলা/ টিগার/ তীর/ সাইরাস/ এল-ক্লাজোল/ রতন/ ব্রাভো/ পালকি/ব্লাস্টিন প্যাকেটের গায়ে নির্ধারিত মাত্রায় প্রয়োগ করা যেতে পারে।



রোগ আক্রমণের পরে করণীয় (মূলত পাতা ব্লাস্টের ক্ষেত্রে)

১. ব্লাস্ট রোগের প্রাথমিক অবস্থায় জমিতে পানি ধরে রাখা।
২. পাতা ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে বিঘা প্রতি অতিরিক্ত ৫ কেজি পটাস সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
৩. ব্লাস্ট রোগের প্রাথমিক অবস্থায় উপরে উল্লেখিত ছত্রাকনাশকের যেকোন একটি ট্রাইসাইক্লোজল গুপের হলে ভাল) অনুমোদিত মাত্রায় ৭ দিন অন্তর দুইবার স্প্রে করতে হবে।

প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনার লাভ ক্ষতির বিশ্লেষণ:

ব্রি ধান২৮ বিঘায় যদি ১৯ মন হয় ও সর্বনিম্ন ১০৪০ টাকায় মন বিক্রি করলে মোট ১৯৭৬০ টাকা পাওয়া যাবে। আমাদের একটি পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে ৬৩% অর্থাৎ কৃষক ১২ মন ধান (১২৪৮০ টাকা) কম পেয়েছে। কৃষক বিঘাপ্রতি দুইবার (৬৬ গ্রাম+৬৬গ্রাম) স্প্রে করে ৩১৪/- + ৩১৪/- = ৬২৮ টাকা খরচ করে অন্তত: ১২৪৮০-৬২৮=১১৮৫২ টাকার ক্ষতি হতে রক্ষা পাবে। এ প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষক ও ধান ব্যবসায়ীরা লাখ লাখ টাকার ক্ষতি হতে বাঁচতে পারবে যার ফলে দেশের গড় উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে।

Citation: Rashid MM, Khan FH, Saha B, Ferdous T, Shalahuddin AKMS, Zahan I, Sultana R, Hossain M, Islam A, Nihad SAI, Bhuiyan MR, Mian MS, Khan MAI, Ansari TH, Latif MA. July 2021. Farmers' steps to manage blast disease of rice (Leaflet) Bangladesh Rice Research Institute, Regional Station, Cumilla. 20000 copy. BRRI Publication No. 324

প্রকাশনা ও অর্থায়নে:

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয় কুমিল্লা
ফোন: +৮৮০৮১৬-৩২৩১, ই-মেইল: brriscomilla@gmail.com ওয়েবসাইট: www.brri.gov.bd

সহযোগিতায়:

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চল