

По условию теоремы

$$L[Y_i] = B_i \quad (i = \overline{1, m}).$$

Тогда, в силу линейности оператора L , имеем:

$$L\left[\sum_{i=1}^m Y_i\right] = \sum_{i=1}^m L[Y_i] = \sum_{i=1}^m B_i. \quad \blacksquare$$

§ 21. Системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами

21.1. Собственные значения и собственные векторы

В предыдущем параграфе мы использовали линейный дифференциальный оператор для компактной формы записи системы дифференциальных уравнений и доказательства некоторых теорем. Для дальнейшей работы нам необходимо вспомнить ряд понятий, связанных с линейными операторами. А именно, нам понадобятся понятия собственного вектора и собственного значения оператора конечномерных пространств.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Пусть φ – оператор пространства L . Если для некоторого ненулевого вектора $x \in L$ и числа λ имеем $\varphi(x) = \lambda x$, то число λ называется собственным значением оператора φ , а вектор x называется собственным вектором оператора φ , относящимся к собственному значению λ .

Укажем свойства, которыми обладают собственные векторы.

1. Каждый собственный вектор x оператора φ относится к единственному собственному значению.
2. Если x_1 и x_2 – собственные векторы оператора φ , относящиеся к одному и тому же собственному значению λ , то их линейная комбинация $\alpha x_1 + \beta x_2$ – собственный вектор оператора φ , относящийся к тому же собственному значению.

Из второго свойства следует:

- а) каждому собственному значению λ соответствует бесчисленное множество собственных векторов;
- б) если к множеству всех собственных векторов x оператора φ , относящихся к одному и тому же собственному значению λ , присоединить нулевой вектор (нулевой вектор по определению не является собственным), то получим подпространство пространства L . Это подпространство называется **собственным подпространством оператора φ** и обозначается L_λ .

3. Собственные векторы x_1, x_2, \dots, x_k оператора φ , относящиеся к различным собственным значениям $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$, линейно независимы.

Из свойства 3 следует, что линейный оператор, действующий в n -мерном линейном пространстве L_n , не может иметь более n собственных значений. Кроме того, в пространстве может существовать базис, хотя бы часть которого – собственные векторы.

Процесс поиска собственных значений и собственных векторов оператора конечномерного пространства на практике сводится к решению алгебраических уравнений и систем.

Действительно, предположим, что \mathbf{A} – матрица оператора φ в базисе e_1, e_2, \dots, e_n , \mathbf{X} – матрица-столбец координат вектора x в том же базисе. Тогда векторное равенство $\varphi(x) = \lambda x$ равносильно матричному равенству

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{X} = \lambda \mathbf{X} \quad \text{или} \quad (\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E})\mathbf{X} = \mathbf{O}. \quad (21.1)$$

Но матричное уравнение $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E})\mathbf{X} = \mathbf{O}$ представляет собой матричную запись системы n линейных однородных уравнений с n неизвестными.

Так как собственные векторы ненулевые, то система (21.1) должна иметь нетривиальные решения. Это будет иметь место, если

$$\text{rang}(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}) \neq n$$

или, что то же,

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}) = 0.$$

Матрица $\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}$ называется **характеристической матрицей** оператора φ (матрицы \mathbf{A}), а ее определитель $\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E})$, являющийся многочленом относительно λ – **характеристическим многочленом** оператора φ (матрицы \mathbf{A}).

Найдя корни характеристического многочлена, мы определим собственные значения. Подставив конкретное собственное значение в (21.1) и решив получившуюся систему, мы найдем относящиеся к нему собственные векторы.

ПРИМЕР 21.1. Найти собственные векторы и собственные значения оператора, имеющего в некотором базисе матрицу

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -5 & -3 \\ -1 & -2 & -3 \\ 3 & 15 & 12 \end{pmatrix}.$$

РЕШЕНИЕ. 1) Запишем характеристическую матрицу и найдем характеристический многочлен:

$$\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 2 - \lambda & -5 & -3 \\ -1 & -2 - \lambda & -3 \\ 3 & 15 & 12 - \lambda \end{pmatrix},$$

$$\Rightarrow |\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}| = (3 - \lambda)(\lambda^2 - 9\lambda + 18).$$

Корни характеристического многочлена (собственные значения):

$$\lambda_1 = 6, \quad \lambda_{2,3} = 3.$$

2) Для каждого из найденных собственных значений λ_i запишем систему линейных однородных уравнений $(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{E})\mathbf{X} = \mathbf{O}$ и найдем ее фундаментальную систему решений. Это будут координаты базисных векторов собственного подпространства L_{λ_i} .

а) Для $\lambda_1 = 6$ имеем:

$$(\mathbf{A} - 6\mathbf{E})\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 2 - 6 & -5 & -3 \\ -1 & -2 - 6 & -3 \\ 3 & 15 & 12 - 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{O},$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} -4 & -5 & -3 \\ -1 & -8 & -3 \\ 3 & 15 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -4x_1 - 5x_2 - 3x_3 = 0, \\ -x_1 - 8x_2 - 3x_3 = 0, \\ 3x_1 + 15x_2 + 6x_3 = 0. \end{cases}$$

Ранг матрицы системы равен 2, в качестве базисного минора можно выбрать, например, минор $\begin{vmatrix} -4 & -5 \\ -1 & -8 \end{vmatrix}$. Тогда переменные x_1, x_2 будут зависимыми, а x_3 — свободной. Отбрасываем третье уравнение системы и находим общее решение:

$$\begin{cases} -4x_1 - 5x_2 - 3x_3 = 0, \\ -x_1 - 8x_2 - 3x_3 = 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -4x_1 - 5x_2 = 3x_3, \\ -x_1 - 8x_2 = 3x_3; \end{cases}$$

$$\Rightarrow \Delta = \begin{vmatrix} -4 & -5 \\ -1 & -8 \end{vmatrix} = 27, \quad \Delta_1 = \begin{vmatrix} 3x_3 & -5 \\ 3x_3 & -8 \end{vmatrix} = -9x_3, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} -4 & 3x_3 \\ -1 & 3x_3 \end{vmatrix} = -9x_3;$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = -\frac{x_3}{3}, \\ x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = -\frac{x_3}{3}. \end{cases}$$

Фундаментальная система решений состоит из одного решения. Чтобы ее записать, придадим свободной переменной x_3 любое отличное от нуля значение. Например, полагаем $x_3 = -3$. Тогда из общего решения находим

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 1.$$

Итак, получили: $\mathbf{X}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ – решение фундаментальной системы.

Следовательно, базисом собственного подпространства $L_{\lambda=6}$ является вектор

$$c_1 = 1 \cdot e_1 + 1 \cdot e_2 - 3 \cdot e_3 = \{1; 1; 3\}.$$

$$\Rightarrow L_{\lambda=6} = \{\alpha c_1 \mid \forall \alpha \in \mathbb{R}\}.$$

б) Для $\lambda_{2,3} = 3$ имеем:

$$(\mathbf{A} - 3\mathbf{E})\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 2-3 & -5 & -3 \\ -1 & -2-3 & -3 \\ 3 & 15 & 12-3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{O},$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -5 & -3 \\ -1 & -5 & -3 \\ 3 & 15 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -x_1 - 5x_2 - 3x_3 = 0, \\ -x_1 - 5x_2 - 3x_3 = 0, \\ 3x_1 + 15x_2 + 9x_3 = 0. \end{cases}$$

Матрица системы имеет три пропорциональные строки и, следовательно, ее ранг равен 1. Выбирая в качестве зависимой переменной x_1 получаем, что ее общее решение имеет вид:

$$x_1 = -5x_2 - 3x_3.$$

Находим фундаментальную систему решений:

$$x_2 = 1, \quad x_3 = 0 \quad \Rightarrow \quad x_1 = -5;$$

$$x_2 = 0, \quad x_3 = 1 \quad \Rightarrow \quad x_1 = -3.$$

Итак, получили: $\mathbf{X}_2 = \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{X}_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ – решения фундаментальной системы.

Следовательно, базисом собственного подпространства $L_{\lambda=3}$ являются векторы

$$c_2 = \{-5; 1; 0\} \quad \text{и} \quad c_3 = \{-3; 0; 1\}.$$

$$\Rightarrow L_{\lambda=3} = \{\alpha c_2 + \beta c_3 \mid \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}. \diamond$$

В заключение этого пункта заметим, что говорят также о **собственных векторах матрицы** A порядка n , имея при этом ввиду собственные векторы оператора n -мерного пространства, имеющего A своей матрицей в некотором базисе. Использование такой терминологии удобно в задачах, в которых на каком-то этапе решения возникает система линейных однородных уравнений $(A - \lambda E)X = O$. В этом случае любое решение системы $(A - \lambda E)X = O$ обычно называют собственным вектором матрицы A , а ее фундаментальную систему решений – линейно независимыми собственными векторами матрицы A .

21.2. Линейные однородные системы дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Метод Эйлера

Рассмотрим систему линейных дифференциальных уравнений вида

$$\frac{dy_i}{dx} = \sum_{j=1}^n a_{ij} y_j + b_i(x) \quad (i = \overline{1, n}), \quad (21.2)$$

где коэффициенты a_{ij} – постоянные. Такие системы называют **системами дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами** и именно они имеют наибольшее практическое применение.

Систему (21.2) можно решить методом исключения. При этом получится линейное уравнение порядка n с постоянными коэффициентами. Мы умеем интегрировать такие дифференциальные уравнения. Проблема лишь в том, что процесс получения дифференциального уравнения порядка n довольно трудоемкий и требует аккуратности.

Другой способ – найти общее решение соответствующей однородной системы, а затем найти общее решение неоднородной системы методом вариации постоянных. Этот путь, как правило, менее трудоемкий, так как оказалось, что фундаментальная система решений линейной однородной системы с постоянными коэффициентами связана с собственными векторами ее матрицы. Именно установление этой связи и является целью нашего дальнейшего изложения. Нахождение фундаментальной системы решений с использованием собственных векторов матрицы называется **методом Эйлера**.

Итак, рассмотрим линейную однородную систему с постоянными коэффициентами:

$$\frac{dy_i}{dx} = \sum_{j=1}^n a_{ij} y_j \quad (i = \overline{1, n}). \quad (21.3)$$

Вид уравнений системы (21.3) наводит на мысль, что решения следует искать прежде всего среди таких функций, производные которых «похожи» на сами функции. Среди элементарных функций таким свойст-

вом обладает показательная функция. Поэтому частные решения будем искать в виде

$$y_1 = d_1 e^{\lambda x}, y_2 = d_2 e^{\lambda x}, \dots, y_n = d_n e^{\lambda x}, \quad (21.4)$$

где $\lambda, d_1, d_2, \dots, d_n$ – неизвестные действительные числа, которые нужно выбрать так, чтобы функции (21.4) удовлетворяли системе (21.3).

Запишем систему (21.3) в матричном виде:

$$\mathbf{Y}' = \mathbf{A} \mathbf{Y}, \quad (21.5)$$

где

$$\mathbf{A} = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

По предположению,

$$\begin{aligned} \mathbf{Y} = \begin{pmatrix} d_1 e^{\lambda x} \\ d_2 e^{\lambda x} \\ \dots \\ d_n e^{\lambda x} \end{pmatrix} &= e^{\lambda x} \mathbf{D}, \quad \text{где } \mathbf{D} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \dots \\ d_n \end{pmatrix}. \\ \Rightarrow \mathbf{Y}' &= \begin{pmatrix} d_1 \lambda e^{\lambda x} \\ d_2 \lambda e^{\lambda x} \\ \dots \\ d_n \lambda e^{\lambda x} \end{pmatrix} = \lambda e^{\lambda x} \mathbf{D}. \end{aligned}$$

Подставим \mathbf{Y} и \mathbf{Y}' в (21.5) и получим

$$\lambda \cdot e^{\lambda x} \mathbf{D} = \mathbf{A} \cdot (e^{\lambda x} \mathbf{D}) \quad \text{или} \quad \lambda \cdot \mathbf{D} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{D},$$

$$\Rightarrow \mathbf{A} \cdot \mathbf{D} - \lambda \mathbf{D} = \mathbf{O},$$

$$\Rightarrow (\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}) \cdot \mathbf{D} = \mathbf{O}. \quad (21.6)$$

Матричное уравнение (21.6) представляет собой матричную запись системы n линейных однородных уравнений с n неизвестными. Чтобы такая система имела нетривиальные решения необходимо, чтобы

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}) = 0.$$

Но это означает, что λ должно является действительным характеристическим корнем (т. е. собственным значением) матрицы \mathbf{A} , а \mathbf{D} – ее собственным вектором, относящимся к λ .

Матрица \mathbf{A} имеет n характеристических корней, но среди них могут быть комплексные и кратные. Рассмотрим ситуации, которые в связи с этим могут возникнуть.

$$\begin{cases} y_1 = C_1 d_{11} e^{\lambda_1 x} + C_2 d_{12} e^{\lambda_2 x} + \dots + C_n d_{1n} e^{\lambda_n x}, \\ y_2 = C_1 d_{21} e^{\lambda_1 x} + C_2 d_{22} e^{\lambda_2 x} + \dots + C_n d_{2n} e^{\lambda_n x}, \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ y_n = C_1 d_{n1} e^{\lambda_1 x} + C_2 d_{n2} e^{\lambda_2 x} + \dots + C_n d_{nn} e^{\lambda_n x}. \end{cases}$$

ПРИМЕР 21.2. Найти общее решение системы:

$$\begin{cases} y_1' = y_1 + 2y_2, \\ y_2' = 4y_1 + 3y_2. \end{cases}$$

РЕШЕНИЕ. Данная система – линейная однородная с постоянными коэффициентами. Следовательно, ее общее решение может быть найдено методом Эйлера.

Матрица системы:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Запишем ее характеристическую матрицу и найдем характеристический многочлен:

$$\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 4 & 3-\lambda \end{pmatrix},$$
$$\Rightarrow |\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}| = \lambda^2 - 4\lambda - 5.$$

Найдем характеристические корни:

$$\lambda^2 - 4\lambda - 5 = 0,$$
$$\Rightarrow \lambda_1 = 5, \lambda_2 = -1.$$

Характеристические корни являются собственными значениями матрицы \mathbf{A} . Найдем ее собственные векторы, относящиеся к каждому из собственных значений.

а) Для $\lambda_1 = 5$ имеем:

$$\begin{aligned} (\mathbf{A} - 5\mathbf{E})\mathbf{X} &= \begin{pmatrix} 1-5 & 2 \\ 4 & 3-5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \mathbf{O}, \\ \Rightarrow \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{или} \quad \begin{cases} -4x_1 + 2x_2 = 0, \\ 4x_1 - 2x_2 = 0. \end{cases} \\ \Rightarrow x_2 &= 2x_1 - \text{общее решение системы.} \end{aligned}$$

Фундаментальная система решений состоит из одного решения. Полагаем $x_1 = 1$ и находим это решение:

$$\mathbf{D}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Итак, получили, что \mathbf{D}_1 – собственный вектор матрицы \mathbf{A} , относящийся к собственному значению $\lambda_1 = 5$. Следовательно, решение системы дифференциальных уравнений:

$$\mathbf{Y}_1 = e^{5x} \mathbf{D}_1 = e^{5x} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{5x} \\ 2e^{5x} \end{pmatrix}.$$

б) Для $\lambda_2 = -1$ имеем:

$$\begin{aligned} (\mathbf{A} + \mathbf{E})\mathbf{X} &= \begin{pmatrix} 1+1 & 2 \\ 4 & 3+1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \mathbf{O}, \\ \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{или} \quad \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 = 0, \\ 4x_1 + 4x_2 = 0. \end{cases} \\ \Rightarrow x_2 &= -x_1 - \text{общее решение системы.} \end{aligned}$$

Фундаментальная система решений состоит из одного решения. Полагаем $x_1 = 1$ и находим это решение:

$$\mathbf{D}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Так как \mathbf{D}_2 – собственный вектор матрицы \mathbf{A} , относящийся к собственному значению $\lambda_2 = -1$, то решение системы дифференциальных уравнений:

$$\mathbf{Y}_2 = e^{-x} \mathbf{D}_2 = e^{-x} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-x} \\ -e^{-x} \end{pmatrix}.$$

Найденные таким образом решения \mathbf{Y}_1 и \mathbf{Y}_2 образуют фундаментальную систему решений и, следовательно, общее решение системы имеет вид

$$\mathbf{Y} = C_1 \mathbf{Y}_1 + C_2 \mathbf{Y}_2 = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{5x} + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{-x}$$

или, подробнее,

$$\begin{cases} y_1 = C_1 e^{5x} + C_2 e^{-x}, \\ y_2 = 2C_1 e^{5x} - C_2 e^{-x}. \end{cases} \diamond$$

II. Характеристические корни матрицы \mathbf{A} различны, но среди них есть комплексные

Так как характеристический многочлен матрицы \mathbf{A} имеет действительные коэффициенты, то комплексные корни будут появляться сопряженными парами. Пусть, например, характеристическими корнями являются числа $\lambda_1 = \alpha + \beta i$, $\lambda_2 = \alpha - \beta i$.

Рассмотрим две системы n линейных однородных уравнений с n неизвестными:

$$(\mathbf{A} - \lambda_1 \mathbf{E}) \cdot \mathbf{X} = \mathbf{O} \quad \text{и} \quad (\mathbf{A} - \lambda_2 \mathbf{E}) \cdot \mathbf{X} = \mathbf{O}.$$

В алгебре доказано, что если для них выбрать одни и те же переменные свободными и придать им сопряженные значения, то для зависимых переменных тоже получаться сопряженные значения.

Пусть $\mathbf{D} = (d_{j1})$ – решение системы $(\mathbf{A} - \lambda_1 \mathbf{E}) \cdot \mathbf{X} = \mathbf{O}$. Тогда $\bar{\mathbf{D}} = (\bar{d}_{j1})$ – решение системы $(\mathbf{A} - \lambda_2 \mathbf{E}) \cdot \mathbf{X} = \mathbf{O}$. Рассмотрим матрицы-столбцы

$$\mathbf{Z}_1 = e^{\lambda_1 x} \mathbf{D} = e^{(\alpha + i\beta)x} \mathbf{D} = e^{\alpha x} \cdot e^{i\beta x} \mathbf{D} = e^{\alpha x} \cdot (\cos \beta x + i \sin \beta x) \mathbf{D},$$

$$\mathbf{Z}_2 = e^{\lambda_2 x} \bar{\mathbf{D}} = e^{(\alpha - i\beta)x} \bar{\mathbf{D}} = e^{\alpha x} \cdot e^{-i\beta x} \bar{\mathbf{D}} = e^{\alpha x} \cdot (\cos \beta x - i \sin \beta x) \bar{\mathbf{D}}.$$

В силу выбора \mathbf{D} и $\bar{\mathbf{D}}$ эти матрицы-столбцы \mathbf{Z}_1 и \mathbf{Z}_2 будут удовлетворять матричному уравнению $\mathbf{Y}' = \mathbf{A}\mathbf{Y}$. Полагаем далее

$$\mathbf{Y}_1 = \frac{1}{2}(\mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2), \quad \mathbf{Y}_2 = \frac{1}{2i}(\mathbf{Z}_1 - \mathbf{Z}_2).$$

Непосредственной проверкой легко убедиться, что \mathbf{Y}_1 и \mathbf{Y}_2 состоят из действительных функций и тоже удовлетворяют матричному уравнению $\mathbf{Y}' = \mathbf{A}\mathbf{Y}$. Более того, можно доказать, что \mathbf{Y}_1 и \mathbf{Y}_2 линейно независимы и, следовательно, могут быть включены в фундаментальную систему решений.

Замечание. На практике матрицу-столбец \mathbf{Z}_2 не записывают, так как $\mathbf{Z}_2 = \bar{\mathbf{Z}}_1$. Действительно,

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{Z}}_1 &= \overline{e^{\alpha x} \cdot (\cos \beta x + i \sin \beta x) \mathbf{D}} = e^{\alpha x} \cdot (\cos \beta x + i \sin \beta x) \cdot \bar{\mathbf{D}} = \\ &= e^{\alpha x} \cdot (\cos \beta x - i \sin \beta x) \cdot \bar{\mathbf{D}} = \mathbf{Z}_2. \end{aligned}$$

Следовательно, $\mathbf{Y}_1 = \frac{1}{2}(\mathbf{Z}_1 + \bar{\mathbf{Z}}_1) = \text{Re } \mathbf{Z}_1,$

$$\mathbf{Y}_2 = \frac{1}{2i}(\mathbf{Z}_1 - \bar{\mathbf{Z}}_1) = \text{Im } \mathbf{Z}_1.$$

ПРИМЕР 21.3. Найти общее решение системы

$$\begin{cases} y'_1 = y_1 - y_2 - y_3, \\ y'_2 = y_1 + y_2, \\ y'_3 = 3y_1 + y_3. \end{cases}$$

РЕШЕНИЕ. Так как данная система – линейная однородная с постоянными коэффициентами, то ее общее решение может быть найдено методом Эйлера.

1) Матрица системы:
$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Запишем ее характеристическую матрицу и найдем характеристический многочлен:

$$\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1-\lambda & -1 & -1 \\ 1 & 1-\lambda & 0 \\ 3 & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix},$$

$$\Rightarrow |\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}| = (1-\lambda)[(1-\lambda)^2 + 4].$$

Найдем характеристические корни:

$$(1-\lambda)[(1-\lambda)^2 + 4] = 0,$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = 1, \quad \lambda_{2,3} = 1 \pm 2i.$$

2) Действительный корень $\lambda_1 = 1$ является собственным значением матрицы \mathbf{A} . Найдем собственный вектор матрицы, относящийся к этому собственному значению. Имеем:

$$(\mathbf{A} - \mathbf{E})\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1-1 & -1 & -1 \\ 1 & 1-1 & 0 \\ 3 & 0 & 1-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0},$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{или} \quad \begin{cases} -x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 = 0, \\ 3x_1 = 0. \end{cases}$$

Ранг матрицы системы равен 2, в качестве базисного минора можно выбрать, например, минор $\begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$. Тогда переменные x_1, x_2 будут зависимыми, а x_3 свободной. Общее решение при этом будет иметь вид:

$$\begin{cases} x_2 = -x_3, \\ x_1 = 0. \end{cases}$$

Фундаментальная система решений состоит из одного решения. Полагаем $x_3 = 1$ и находим его:

$$\mathbf{D}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Итак, получили, что \mathbf{D}_1 – собственный вектор матрицы \mathbf{A} , относящийся к собственному значению $\lambda_1 = 1$. Следовательно, решение системы дифференциальных уравнений:

$$\mathbf{Y}_1 = e^x \mathbf{D}_1 = e^x \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -e^x \\ e^x \end{pmatrix}.$$

3) Возьмем один из комплексных корней, например $\lambda_2 = 1 + 2i$, и найдем фундаментальную систему решений системы $(\mathbf{A} - \lambda_2 \mathbf{E})\mathbf{X} = \mathbf{O}$.

Имеем:

$$\begin{aligned} (\mathbf{A} - \lambda_2 \mathbf{E})\mathbf{X} &= \begin{pmatrix} 1 - (1 + 2i) & -1 & -1 \\ 1 & 1 - (1 + 2i) & 0 \\ 3 & 0 & 1 - (1 + 2i) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{O}, \\ \Rightarrow \begin{pmatrix} -2i & -1 & -1 \\ 1 & -2i & 0 \\ 3 & 0 & -2i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{или} \quad \begin{cases} -2ix_1 - x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 - 2ix_2 = 0, \\ 3x_1 - 2ix_3 = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Ранг матрицы системы равен 2, в качестве базисного минора можно выбрать, например, минор $\begin{vmatrix} -2i & 0 \\ 0 & -2i \end{vmatrix}$. Тогда переменные x_2, x_3 будут зависимыми, а x_1 свободной. Общее решение при этом будет иметь вид:

$$\begin{cases} x_2 = \frac{x_1}{2i}, \\ x_3 = \frac{3x_1}{2i}. \end{cases}$$

Фундаментальная система решений состоит из одного решения. Полагаем $x_3 = 2i$ и находим его:

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 2i \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Тогда
$$\mathbf{Z} = e^{(1+2i)x} \begin{pmatrix} 2i \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = e^x \cdot (\cos 2x + i \sin 2x) \begin{pmatrix} 2i \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix},$$

$$\Rightarrow \mathbf{Z} = e^x \cdot \begin{pmatrix} -2 \sin 2x + i \cdot 2 \cos 2x \\ \cos 2x + i \cdot \sin 2x \\ 3 \cos 2x + i \cdot 3 \sin 2x \end{pmatrix} = e^x \cdot \begin{pmatrix} -2 \sin 2x \\ \cos 2x \\ 3 \cos 2x \end{pmatrix} + ie^x \cdot \begin{pmatrix} 2 \cos 2x \\ \sin 2x \\ 3 \sin 2x \end{pmatrix}$$

Откуда находим

$$\mathbf{Y}_1 = \operatorname{Re} \mathbf{Z} = e^x \cdot \begin{pmatrix} -2 \sin 2x \\ \cos 2x \\ 3 \cos 2x \end{pmatrix}, \quad \mathbf{Y}_2 = \operatorname{Im} \mathbf{Z} = e^x \cdot \begin{pmatrix} 2 \cos 2x \\ \sin 2x \\ 3 \sin 2x \end{pmatrix}.$$

Найденные таким образом решения $\mathbf{Y}_1, \mathbf{Y}_2, \mathbf{Y}_3$ образуют фундаментальную систему решений и, следовательно, общее решение системы имеет вид

$$\begin{aligned} \mathbf{Y} &= C_1 \mathbf{Y}_1 + C_2 \mathbf{Y}_2 + C_3 \mathbf{Y}_3 = \\ &= C_1 e^x \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^x \begin{pmatrix} -2 \sin 2x \\ \cos 2x \\ 3 \cos 2x \end{pmatrix} + C_3 e^x \cdot \begin{pmatrix} 2 \cos 2x \\ \sin 2x \\ 3 \sin 2x \end{pmatrix} \end{aligned}$$

или, подробнее,

$$\begin{cases} y_1 = & -2C_2 e^x \sin 2x + 2C_3 e^x \cos 2x, \\ y_2 = -C_1 e^x + C_2 e^x \cos 2x + C_3 e^x \sin 2x, \quad \diamond \\ y_3 = C_1 e^x + 3C_2 e^x \cos 2x + 3C_3 e^x \sin 2x. \end{cases}$$

III. Характеристические корни матрицы \mathbf{A} действительны, но среди них есть кратные

Пусть λ – действительный характеристический корень матрицы \mathbf{A} кратности ℓ , $r = \operatorname{rang}(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E})$. Возможны два случая.

1) $n - r = \ell$.

В этом случае фундаментальная система решений системы линейных однородных уравнений $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E})\mathbf{X} = \mathbf{O}$ состоит из ℓ решений. Следовательно, существуют ℓ линейно независимых собственных векторов $\mathbf{D}_1, \mathbf{D}_2, \dots, \mathbf{D}_\ell$ матрицы \mathbf{A} , относящихся к собственному значению λ . Тогда решения системы дифференциальных уравнений

$$\mathbf{Y}_1 = e^{\lambda x} \mathbf{D}_1, \quad \mathbf{Y}_2 = e^{\lambda x} \mathbf{D}_2, \quad \dots, \quad \mathbf{Y}_\ell = e^{\lambda x} \mathbf{D}_\ell$$

линейно независимы и входят в фундаментальную систему решений этой системы.

2) $n - r \neq \ell$ (точнее, $n - r < \ell$, случай $n - r > \ell$ вообще невозможен из алгебраических соображений).

Тогда фундаментальная система решений системы линейных однородных уравнений $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E})\mathbf{X} = \mathbf{O}$ состоит из $k < \ell$ решений. С их помощью мы сможем получить k линейно независимых решений системы дифференциальных уравнений. В такой ситуации существует два возможных способа найти все решения.

Первый способ – искать ℓ решений вида

$$\mathbf{Y} = e^{\lambda x} \begin{pmatrix} a_{10} + a_{11}x + \dots + a_{1,\ell-1}x^{\ell-1} \\ a_{20} + a_{21}x + \dots + a_{2,\ell-1}x^{\ell-1} \\ \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \\ a_{n0} + a_{n1}x + \dots + a_{n,\ell-1}x^{\ell-1} \end{pmatrix},$$

где коэффициенты многочленов a_{ij} находят, подставляя \mathbf{Y} в исходную систему.

ПРИМЕР 21.4. Найти общее решение системы

$$\begin{cases} y_1' = y_1 - y_2, \\ y_2' = y_1 + 3y_2. \end{cases}$$

РЕШЕНИЕ. Так как система – линейная однородная с постоянными коэффициентами, то ее общее решение может быть найдено методом Эйлера.

Матрица системы: $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$

Запишем ее характеристическую матрицу и найдем характеристический многочлен:

$$\begin{aligned} \mathbf{A} - \lambda \mathbf{E} &= \begin{pmatrix} 1 - \lambda & -1 \\ 1 & 3 - \lambda \end{pmatrix}, \\ \Rightarrow |\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}| &= \lambda^2 - 4\lambda + 4. \end{aligned}$$

Найдем характеристические корни:

$$\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0, \quad \Rightarrow \lambda_{1,2} = 2.$$

Итак, имеем характеристический корень кратности $\ell = 2$. При этом $r = \text{rang}(\mathbf{A} - 2\mathbf{E}) = 1$ (т. к. $|\mathbf{A} - 2\mathbf{E}| = 0$). Следовательно,

$$n - r = 2 - 1 = 1 \quad \text{и} \quad n - r < \ell.$$

Будем искать решения системы в виде

$$\mathbf{Y} = e^{2x} \begin{pmatrix} a + bx \\ c + dx \end{pmatrix},$$

т. е. полагаем

$$y_1 = (a + bx)e^{2x}, \quad y_2 = (c + dx)e^{2x}.$$

Тогда

$$y_1' = (2a + 2bx + b)e^{2x}, \quad y_2' = (2c + 2dx + d)e^{2x}.$$

Подставим y_1, y_2, y_1', y_2' в исходную систему и получим:

$$\begin{cases} (2a + b + 2bx)e^{2x} = (a + bx - c - dx)e^{2x}, \\ (2c + d + 2dx)e^{2x} = (a + bx + 3c + 3dx)e^{2x} \end{cases}$$

или, после сокращения на e^{2x} :

$$\begin{cases} 2a + b + 2bx = a + bx - c - dx, \\ 2c + d + 2dx = a + bx + 3c + 3dx; \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (a + b + c) + (b + d)x = 0, \\ (-a - c + d) - (b + d)x = 0. \end{cases}$$

Приравнивая коэффициенты при равных степенях x , получим:

$$\begin{cases} a + b + c = 0, \\ -a - c + d = 0, \\ -b - d = 0, \\ b + d = 0. \end{cases}$$

Или, после преобразований:

$$\begin{cases} a + b + c = 0, \\ b + d = 0. \end{cases}$$

Ранг матрицы системы равен 2, в качестве базисного минора можно выбрать, например, минор $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$. Тогда переменные a , b будут зависимыми, c и d – свободными. Общее решение при этом будет иметь вид:

$$\begin{cases} a = d - c, \\ b = -d. \end{cases}$$

Находим фундаментальную систему решений:

$$d = 1, c = 0 \Rightarrow a = 1, b = -1;$$

$$d = 0, c = 1 \Rightarrow a = -1, b = 0.$$

Первое из решений фундаментальной системы ($a = 1$, $b = -1$, $c = 0$, $d = 1$) дает для системы дифференциальных уравнений решение

$$\mathbf{Y}_1 = e^{2x} \begin{pmatrix} 1 - x \\ x \end{pmatrix},$$

второе решение из фундаментальной системы ($a = -1$, $b = 0$, $c = 1$, $d = 0$) дает решение

$$\mathbf{Y}_2 = e^{2x} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Найденные таким образом решения \mathbf{Y}_1 , \mathbf{Y}_2 образуют фундаментальную систему решений и, следовательно, общее решение системы имеет вид:

$$\mathbf{Y} = C_1 \mathbf{Y}_1 + C_2 \mathbf{Y}_2 = C_1 e^{2x} \begin{pmatrix} 1 - x \\ x \end{pmatrix} + C_2 e^{2x} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}. \diamond$$

Как показывает рассмотренный пример, чтобы найти решения для системы дифференциальных уравнений второго порядка, нам пришлось решать алгебраическую систему из четырех уравнений с четырьмя неизвестными. А если порядок исходной системы будет 3, то алгебраическая система будет содержать в лучшем случае шесть уравнений и шесть неизвестных (а в худшем – девять уравнений и неизвестных). И хотя мы в каждом случае точно знаем количество свободных переменных (их количество совпадает с кратностью корня), задача получается трудоемкая.

Второй способ решения – найти k линейно независимых решений системы дифференциальных уравнений, а недостающие $\ell - k$ решений искать в виде

$$\begin{aligned} Y_{k+1} &= e^{\lambda x} (D_{k+1,0} + D_{k+1,1}x), \\ Y_{k+2} &= e^{\lambda x} \left(D_{k+2,0} + D_{k+2,1}x + D_{k+2,2} \cdot \frac{x^2}{2} \right), \\ Y_{k+3} &= e^{\lambda x} \left(D_{k+3,0} + D_{k+3,1}x + D_{k+3,2} \cdot \frac{x^2}{2} + D_{k+3,3} \cdot \frac{x^3}{3} \right) \text{ и т.д.} \end{aligned}$$

Здесь D_{ij} – числовые матрицы-столбцы, определяемые так, чтобы Y_i были решениями системы дифференциальных уравнений.

На первый взгляд кажется, что этот способ такой же трудоемкий, как и предыдущий. Но на самом деле это не так. Рассмотрим его применительно к системам дифференциальных уравнений 3-го порядка, т. е. к системам вида

$$Y' = AY, \quad (21.7)$$

где $A = (a_{ij})$ – матрица третьего порядка, $a_{ij} \in \mathbb{R}$.

Число характеристических корней матрицы совпадает с ее порядком, следовательно, если матрица A имеет кратный характеристический корень λ , то его кратность ℓ равна двум или трем. Рассмотрим каждый из этих случаев.

а) Пусть $\ell = 2$, $n - r = 1$.

В этом случае матрица A имеет один линейно независимый собственный вектор D_1 , относящийся к собственному значению λ и, следовательно, $Y_1 = e^{\lambda x} D_1$ – решение системы (21.7). Еще одно решение системы дифференциальных уравнений будем искать в виде

$$Y_2 = e^{\lambda x} (D_{20} + D_{21}x).$$

Тогда

$$Y_2' = e^{\lambda x} (\lambda D_{20} + \lambda D_{21}x + D_{21})$$

и, подставляя Y_2 и Y_2' в (21.7), получаем:

$$e^{\lambda x}(\lambda D_{20} + \lambda D_{21}x + D_{21}) = A \cdot e^{\lambda x}(D_{20} + D_{21}x).$$

После преобразований будем иметь:

$$\lambda D_{20} + D_{21} + \lambda D_{21}x = AD_{20} + AD_{21}x.$$

Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях x , находим:

$$\begin{cases} \lambda D_{21} = AD_{21}, \\ \lambda D_{20} + D_{21} = AD_{20} \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} AD_{21} - \lambda D_{21} = O, \\ AD_{20} - \lambda D_{20} = D_{21}. \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (A - \lambda E)D_{21} = O, \\ (A - \lambda E)D_{20} = D_{21}. \end{cases} \quad (21.8)$$

Первое уравнение системы (21.8) означает, что D_{21} – собственный вектор матрицы A , относящийся к собственному значению λ и, следовательно, можем полагать $D_{21} = D_1$. Тогда второе уравнение системы (21.8) перепишется в виде:

$$(A - \lambda E)D_{20} = D_1,$$

т. е. в качестве D_{20} можно взять любое решение системы линейных уравнений $(A - \lambda E)X = D_1$.

Таким образом, если $\ell = 2$ и $n - r = 1$, то рассматриваемая система (21.7) имеет решения

$$\boxed{Y_1 = e^{\lambda x} D_1 \text{ и } Y_2 = e^{\lambda x} (D_{20} + D_1 x),} \quad (21.9)$$

где D_1 – собственный вектор матрицы A , относящийся к собственному значению λ ;

D_{20} – любое решение системы линейных уравнений $(A - \lambda E)X = D_1$.

Найденные таким образом решения Y_1 и Y_2 входят в фундаментальную систему решений, так как они линейно независимы.

Действительно, рассматривая

$$\alpha Y_1 + \beta Y_2 = O,$$

получаем

$$(\alpha D_1 + \beta D_{20}) + \beta D_1 x = O,$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \beta D_1 = O, \\ \alpha D_1 + \beta D_{20} = O. \end{cases}$$

По определению собственного вектора $D_1 \neq O$. Тогда из этой системы находим

$$\alpha = \beta = 0.$$

А это означает, что Y_1 и Y_2 – линейно независимы.

Замечание. При получении формул (21.9) нигде не использовался тот факт, что система дифференциальных уравнений третьего порядка. Следовательно, они останутся справедливыми и для линейной однородной системы порядка n .

ПРИМЕР 21.5. Найти общее решение системы

$$\begin{cases} y_1' = y_1 - y_2, \\ y_2' = y_1 + 3y_2. \end{cases}$$

РЕШЕНИЕ. Так как система – линейная однородная с постоянными коэффициентами, то ее общее решение может быть найдено методом Эйлера.

1) Матрица системы:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Ее характеристическая матрица:

$$\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1 - \lambda & -1 \\ 1 & 3 - \lambda \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} |\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}| &= \lambda^2 - 4\lambda + 4, \\ \Rightarrow \lambda_{1,2} &= 2. \end{aligned}$$

Итак, имеем характеристический корень кратности $\ell = 2$. При этом $r = \text{rang}(\mathbf{A} - 2\mathbf{E}) = 1$ (т. к. $|\mathbf{A} - 2\mathbf{E}| = 0$). Следовательно,

$$n - r = 2 - 1 = 1$$

и для нахождения решений можно воспользоваться формулами (21.9).

2) Найдем собственный вектор матрицы \mathbf{A} , относящийся к собственному значению $\lambda = 2$. Имеем:

$$\begin{aligned} (\mathbf{A} - 2\mathbf{E})\mathbf{X} &= \begin{pmatrix} 1-2 & -1 \\ 1 & 3-2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \mathbf{O}, \\ \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{или} \quad \begin{cases} -x_1 - x_2 = 0, \\ x_1 + x_2 = 0. \end{cases} \\ \Rightarrow x_1 &= -x_2 - \text{общее решение системы.} \end{aligned}$$

Фундаментальная система решений состоит из одного решения. Полагаем $x_2 = 1$ и находим это решение:

$$\mathbf{D}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Итак, получили, что \mathbf{D}_1 – собственный вектор матрицы \mathbf{A} , относящийся к собственному значению $\lambda = 2$. Следовательно, решение системы дифференциальных уравнений:

$$\mathbf{Y}_1 = e^{2x} \mathbf{D}_1 = e^{2x} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -e^{2x} \\ e^{2x} \end{pmatrix}.$$

3) Второе решение системы дифференциальных уравнений найдем в виде

$$\mathbf{Y}_2 = e^{2x}(\mathbf{D}_{20} + \mathbf{D}_1 x),$$

где \mathbf{D}_{20} – любое решение системы линейных уравнений $(\mathbf{A} - 2\mathbf{E})\mathbf{X} = \mathbf{D}_1$.
Имеем:

$$\begin{aligned} (\mathbf{A} - 2\mathbf{E})\mathbf{X} &= \begin{pmatrix} 1-2 & -1 \\ 1 & 3-2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \mathbf{D}_1, \\ \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{или} \quad \begin{cases} -x_1 - x_2 = -1, \\ x_1 + x_2 = 1. \end{cases} \\ \Rightarrow x_1 &= 1 - x_2 - \text{общее решение системы.} \end{aligned}$$

Полагаем $x_2 = 0$ и находим частное решение:

$$\mathbf{D}_{20} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Подставляем \mathbf{D}_1 и \mathbf{D}_{20} в \mathbf{Y}_2 и получаем:

$$\mathbf{Y}_2 = e^{2x} \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} x \right] = e^{2x} \begin{pmatrix} 1-x \\ x \end{pmatrix}.$$

Найденные таким образом решения \mathbf{Y}_1 , \mathbf{Y}_2 образуют фундаментальную систему и, следовательно, общее решение системы имеет вид:

$$\mathbf{Y} = C_1 \mathbf{Y}_1 + C_2 \mathbf{Y}_2 = C_1 e^{2x} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{2x} \begin{pmatrix} 1-x \\ x \end{pmatrix}. \quad \diamond$$

б) Пусть $\ell = 3$, $n - r = 1$.

В этом случае матрица \mathbf{A} имеет один линейно независимый собственный вектор \mathbf{D}_1 , относящийся к собственному значению λ и, следовательно, $\mathbf{Y}_1 = e^{\lambda x} \mathbf{D}_1$ – решение системы (21.7). Необходимо найти еще два решения. Второе решение системы дифференциальных уравнений будем искать в виде

$$\mathbf{Y}_2 = e^{\lambda x}(\mathbf{D}_{20} + \mathbf{D}_{21}x).$$

Условия, которым при этом будут удовлетворять \mathbf{D}_{20} и \mathbf{D}_{21} были нами уже получены ранее. А именно, \mathbf{D}_{21} будет собственным вектором матрицы \mathbf{A} , относящимся к собственному значению λ , и, следовательно, можно считать $\mathbf{D}_{21} = \mathbf{D}_1$; \mathbf{D}_{20} – любое решение системы линейных уравнений $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{E})\mathbf{X} = \mathbf{D}_1$.

Третье решение системы запишем в виде

$$\mathbf{Y}_3 = e^{\lambda x} \left(\mathbf{D}_{30} + \mathbf{D}_{31}x + \mathbf{D}_{32} \cdot \frac{x^2}{2} \right).$$

Тогда

$$\mathbf{Y}'_3 = e^{\lambda x} \left(\lambda \mathbf{D}_{30} + \lambda \mathbf{D}_{31}x + \lambda \mathbf{D}_{32} \cdot \frac{x^2}{2} + \mathbf{D}_{31} + \mathbf{D}_{32}x \right)$$

и, подставляя \mathbf{Y}_3 и \mathbf{Y}'_3 в (21.7), получаем:

$$e^{\lambda x} \left(\lambda \mathbf{D}_{30} + \lambda \mathbf{D}_{31}x + \lambda \mathbf{D}_{32} \cdot \frac{x^2}{2} + \mathbf{D}_{31} + \mathbf{D}_{32}x \right) = \mathbf{A} \cdot e^{\lambda x} \left(\mathbf{D}_{30} + \mathbf{D}_{31}x + \mathbf{D}_{32} \cdot \frac{x^2}{2} \right).$$

После преобразований будем иметь:

$$(\lambda \mathbf{D}_{30} + \mathbf{D}_{31}) + (\lambda \mathbf{D}_{31} + \mathbf{D}_{32})x + \lambda \mathbf{D}_{32} \cdot \frac{x^2}{2} = \mathbf{A}\mathbf{D}_{30} + \mathbf{A}\mathbf{D}_{31}x + \mathbf{A}\mathbf{D}_{32} \cdot \frac{x^2}{2}.$$

Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях x , находим:

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \lambda \mathbf{D}_{32} = \mathbf{A}\mathbf{D}_{32}, \\ \lambda \mathbf{D}_{31} + \mathbf{D}_{32} = \mathbf{A}\mathbf{D}_{31}, \\ \lambda \mathbf{D}_{30} + \mathbf{D}_{31} = \mathbf{A}\mathbf{D}_{30}; \end{cases} \\ \Rightarrow & \begin{cases} \mathbf{A}\mathbf{D}_{32} - \lambda \mathbf{D}_{32} = \mathbf{O}, \\ \mathbf{A}\mathbf{D}_{31} - \lambda \mathbf{D}_{31} = \mathbf{D}_{32}, \\ \mathbf{A}\mathbf{D}_{30} - \lambda \mathbf{D}_{30} = \mathbf{D}_{31}; \end{cases} \\ \Rightarrow & \begin{cases} (\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E})\mathbf{D}_{32} = \mathbf{O}, \\ (\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E})\mathbf{D}_{31} = \mathbf{D}_{32}, \\ (\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E})\mathbf{D}_{30} = \mathbf{D}_{31}. \end{cases} \end{aligned} \quad (21.10)$$

Первое уравнение системы (21.10) означает, что \mathbf{D}_{32} – собственный вектор матрицы \mathbf{A} , относящийся к собственному значению λ и, следовательно, можем полагать $\mathbf{D}_{32} = \mathbf{D}_1$. Тогда второе уравнение системы (21.10) переписывается в виде:

$$(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E})\mathbf{D}_{31} = \mathbf{D}_1,$$

т. е. в качестве \mathbf{D}_{31} можно взять любое решение системы линейных уравнений $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E})\mathbf{X} = \mathbf{D}_1$. Так как \mathbf{D}_{20} тоже является решением этой системы, то можем полагать

$$\mathbf{D}_{31} = \mathbf{D}_{20}.$$

С учетом этого, третье уравнение системы (21.10) переписывается в виде:

$$(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E})\mathbf{D}_{30} = \mathbf{D}_{20},$$

т. е. в качестве \mathbf{D}_{30} можно взять любое решение системы линейных уравнений $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E})\mathbf{X} = \mathbf{D}_{20}$.

Таким образом, если $\ell = 3$ и $n - r = 1$, то рассматриваемая система (21.7) имеет решения

$$\boxed{Y_1 = e^{\lambda x} D_1, \quad Y_2 = e^{\lambda x} (D_{20} + D_1 x), \quad Y_3 = e^{\lambda x} \left(D_{30} + D_{20} x + D_1 \cdot \frac{x^2}{2} \right)}, \quad (21.11)$$

где D_1 — собственный вектор матрицы A , относящийся к собственному значению λ ;

D_{20} — любое решение системы линейных уравнений $(A - \lambda E)X = D_1$;

D_{30} — любое решение системы линейных уравнений $(A - \lambda E)X = D_{20}$.

При этом легко доказать, что найденные таким образом решения Y_1, Y_2, Y_3 будут линейно независимыми.

Замечание. При получении формул (21.11) нигде не использовался тот факт, что система дифференциальных уравнений третьего порядка. Следовательно, они останутся справедливыми и для линейной однородной системы порядка n .

ПРИМЕР 21.6. Найти общее решение системы

$$\begin{cases} y_1' = y_1 - 3y_2 + 3y_3, \\ y_2' = -2y_1 - 6y_2 + 13y_3, \\ y_3' = -y_1 - 4y_2 + 8y_3. \end{cases}$$

РЕШЕНИЕ. Система является линейной однородной с постоянными коэффициентами. Следовательно, ее общее решение может быть найдено методом Эйлера.

1) Матрица системы:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ -2 & -6 & 13 \\ -1 & -4 & 8 \end{pmatrix}.$$

Ее характеристическая матрица:

$$A - \lambda E = \begin{pmatrix} 1 - \lambda & -3 & 3 \\ -2 & -6 - \lambda & 13 \\ -1 & -4 & 8 - \lambda \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} |A - \lambda E| &= -\lambda^3 + 3\lambda^2 - 3\lambda + 1 = -(\lambda - 1)^3, \\ \Rightarrow \lambda_{1,2,3} &= 1. \end{aligned}$$

Итак, имеем характеристический корень кратности $\ell = 3$. При этом

$$\mathbf{A} - 1 \cdot \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1-1 & -3 & 3 \\ -2 & -6-1 & 13 \\ -1 & -4 & 8-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 3 \\ -2 & -7 & 13 \\ -1 & -4 & 7 \end{pmatrix},$$

$$\begin{vmatrix} 0 & -3 \\ -2 & -7 \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow r = \text{rang}(\mathbf{A} - \mathbf{E}) = 2.$$

Следовательно,

$$n - r = 3 - 2 = 1$$

и для нахождения решений можно воспользоваться формулами (21.11).

2) Найдем собственный вектор матрицы \mathbf{A} , относящийся к собственному значению $\lambda = 1$. Имеем:

$$(\mathbf{A} - \mathbf{E})\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 3 \\ -2 & -7 & 13 \\ -1 & -4 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{O},$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -3 & 3 \\ -2 & -7 & 13 \\ -1 & -4 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{или} \quad \begin{cases} -3x_2 + 3x_3 = 0, \\ -2x_1 - 7x_2 + 13x_3 = 0, \\ -x_1 - 4x_2 + 7x_3 = 0. \end{cases}$$

Как уже указывали выше, ранг матрицы системы равен 2 и в качестве базисного минора можно выбрать, например, минор $\begin{vmatrix} 0 & -3 \\ -2 & -7 \end{vmatrix}$. Тогда переменные x_1, x_2 будут зависимыми, а x_3 свободной. Отбрасываем третье уравнение системы и находим общее решение:

$$\begin{cases} -3x_2 + 3x_3 = 0, \\ -2x_1 - 7x_2 + 13x_3 = 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x_2 = 3x_3, \\ 2x_1 + 7x_2 = 13x_3; \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_2 = x_3, \\ x_1 = 3x_3 \end{cases} - \text{общее решение.}$$

Фундаментальная система решений состоит из одного решения. Полагаем $x_3 = 1$ и находим это решение:

$$\mathbf{D}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Итак, получили, что \mathbf{D}_1 – собственный вектор матрицы \mathbf{A} , относящийся к собственному значению $\lambda = 1$. Следовательно, решение системы дифференциальных уравнений:

$$\mathbf{Y}_1 = e^x \mathbf{D}_1 = e^x \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3e^x \\ e^x \\ e^x \end{pmatrix}.$$

3) Второе решение системы дифференциальных уравнений будем искать в виде

$$\mathbf{Y}_2 = e^x (\mathbf{D}_{20} + \mathbf{D}_1 x),$$

где \mathbf{D}_{20} – любое решение системы линейных уравнений $(\mathbf{A} - \mathbf{E})\mathbf{X} = \mathbf{D}_1$.

Имеем:

$$(\mathbf{A} - \mathbf{E})\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 3 \\ -2 & -7 & 13 \\ -1 & -4 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{D}_1,$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -3 & 3 \\ -2 & -7 & 13 \\ -1 & -4 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{или} \quad \begin{cases} -3x_2 + 3x_3 = 3, \\ -2x_1 - 7x_2 + 13x_3 = 1, \\ -x_1 - 4x_2 + 7x_3 = 1. \end{cases}$$

Выбирая переменные x_1, x_2 зависимыми, а x_3 свободной, получаем общее решение

$$\begin{cases} x_2 = -1 + x_3, \\ x_1 = 3 + 3x_3. \end{cases}$$

Полагаем $x_3 = 0$ и находим частное решение:

$$\mathbf{D}_{20} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Подставляем \mathbf{D}_1 и \mathbf{D}_{20} в \mathbf{Y}_2 и получаем:

$$\mathbf{Y}_2 = e^x \left[\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} x \right] = e^x \begin{pmatrix} 3 + 3x \\ -1 + x \\ x \end{pmatrix}.$$

4) Третье решение системы дифференциальных уравнений найдем в виде

$$\mathbf{Y}_3 = e^{\lambda x} \left(\mathbf{D}_{30} + \mathbf{D}_{20}x + \mathbf{D}_1 \cdot \frac{x^2}{2} \right),$$

где \mathbf{D}_{30} – любое решение системы линейных уравнений $(\mathbf{A} - \mathbf{E})\mathbf{X} = \mathbf{D}_{20}$.

Имеем:

$$(\mathbf{A} - \mathbf{E})\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 3 \\ -2 & -7 & 13 \\ -1 & -4 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{D}_{20},$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -3 & 3 \\ -2 & -7 & 13 \\ -1 & -4 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{или} \quad \begin{cases} -3x_2 + 3x_3 = 3, \\ -2x_1 - 7x_2 + 13x_3 = -1, \\ -x_1 - 4x_2 + 7x_3 = 0. \end{cases}$$

Выбирая переменные x_1, x_2 зависимыми, а x_3 – свободной, получаем общее решение

$$\begin{cases} x_2 = -1 + x_3, \\ x_1 = 4 + 3x_3. \end{cases}$$

Полагаем $x_3 = 0$ и находим частное решение:

$$\mathbf{D}_{30} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Подставляем $\mathbf{D}_1, \mathbf{D}_{20}$ и \mathbf{D}_{30} в \mathbf{Y}_3 и получаем:

$$\mathbf{Y}_3 = e^x \left[\begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \frac{x^2}{2} \right] = e^x \begin{pmatrix} 4 + 3x + 1,5x^2 \\ -1 - x + 0,5x^2 \\ 0,5x^2 \end{pmatrix}.$$

Найденные таким образом решения $\mathbf{Y}_1, \mathbf{Y}_2, \mathbf{Y}_3$ образуют фундаментальную систему и, следовательно, общее решение системы имеет вид:

$$\begin{aligned} \mathbf{Y} &= C_1 \mathbf{Y}_1 + C_2 \mathbf{Y}_2 + C_3 \mathbf{Y}_3 = \\ &= C_1 e^x \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^x \left[\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} x \right] + C_3 e^x \left[\begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \frac{x^2}{2} \right] = \\ &= C_1 e^x \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^x \begin{pmatrix} 3 + 3x \\ -1 + x \\ x \end{pmatrix} + C_3 e^x \begin{pmatrix} 4 + 3x + 1,5x^2 \\ -1 - x + 0,5x^2 \\ 0,5x^2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

или, более подробно,

$$\begin{cases} y_1 = 3C_1 e^x + C_2 e^x (3 + 3x) + C_3 e^x (4 + 3x + 1,5x^2), \\ y_2 = C_1 e^x + C_2 e^x (-1 + x) + C_3 e^x (-1 - x + 0,5x^2), \\ y_3 = C_1 e^x + C_2 e^x \cdot x + C_3 e^x \cdot 0,5x^2. \end{cases} \diamond$$

в) Пусть $\ell = 3, n - r = 2$.

В этом случае матрица \mathbf{A} имеет два линейно независимых собственных вектора \mathbf{D}_1 и \mathbf{D}_2 , относящихся к собственному значению λ и, следовательно, $\mathbf{Y}_1 = e^{\lambda x} \mathbf{D}_1$, $\mathbf{Y}_2 = e^{\lambda x} \mathbf{D}_2$ – решения системы (21.7). Необходимо найти еще одно решение. Третье решение системы дифференциальных уравнений будем искать в виде

$$\mathbf{Y}_3 = e^{\lambda x} (\mathbf{D}_{30} + \mathbf{D}_{31} x).$$

Условия, которым при этом будут удовлетворять \mathbf{D}_{30} и \mathbf{D}_{31} , нами получены ранее. А именно, \mathbf{D}_{31} будет собственным вектором матрицы \mathbf{A} , относящимся к собственному значению λ ; \mathbf{D}_{30} – любое решение системы линейных уравнений $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E})\mathbf{X} = \mathbf{D}_{31}$.

В нашем случае размерность собственного подпространства матрицы \mathbf{A} для собственного значения λ равна двум, а в качестве его базиса выбраны \mathbf{D}_1 и \mathbf{D}_2 . Следовательно,

$$\mathbf{D}_{31} = \alpha \mathbf{D}_1 + \beta \mathbf{D}_2,$$

где α, β – некоторые числа, *одновременно не равные нулю*, которые следует выбрать так, чтобы система линейных уравнений $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E})\mathbf{X} = \mathbf{D}_{31}$ была совместна.

Замечание. Если $\alpha = \beta = 0$, то $\mathbf{D}_{31} = \alpha \mathbf{D}_1 + \beta \mathbf{D}_2 = \mathbf{O}$ и, следовательно, \mathbf{D}_{31} не будет собственным вектором.

Таким образом, если $\ell = 3$ и $n - r = 2$, то рассматриваемая система (21.7) имеет решения

$$\mathbf{Y}_1 = e^{\lambda x} \mathbf{D}_1, \quad \mathbf{Y}_2 = e^{\lambda x} \mathbf{D}_2, \quad \mathbf{Y}_3 = e^{\lambda x} (\mathbf{D}_{30} + \mathbf{D}_{31}x), \quad (21.12)$$

где $\mathbf{D}_1, \mathbf{D}_2$ – линейно независимые собственные векторы матрицы \mathbf{A} , относящиеся к собственному значению λ ;

$\mathbf{D}_{31} = \alpha \mathbf{D}_1 + \beta \mathbf{D}_2$, α, β – числа, одновременно не равные нулю, которые выбираются так, чтобы система линейных уравнений $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E})\mathbf{X} = \mathbf{D}_{31}$ была совместна;

\mathbf{D}_{30} – любое решение системы уравнений $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E})\mathbf{X} = \mathbf{D}_{31}$.

При этом легко доказать, что найденные таким образом решения $\mathbf{Y}_1, \mathbf{Y}_2, \mathbf{Y}_3$ будут линейно независимыми.

Замечание. Формулы (21.12) останутся справедливыми и для линейной однородной системы порядка n , так как при их получении не использовался тот факт, что система дифференциальных уравнений третьего порядка.

ПРИМЕР 21.7. Найти общее решение системы

$$\begin{cases} y_1' = 2y_1, \\ y_2' = y_2 - y_3, \\ y_3' = y_2 + 3y_3. \end{cases}$$

РЕШЕНИЕ. Так как система – линейная однородная с постоянными коэффициентами, то ее общее решение может быть найдено методом Эйлера.

1) Матрица системы:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Ее характеристическая матрица:

$$\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & -1 \\ 0 & 1 & 3-\lambda \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} |\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}| &= (2-\lambda)(\lambda^2 - 4\lambda + 4) = -(\lambda - 2)^3, \\ &\Rightarrow \lambda_{1,2,3} = 2. \end{aligned}$$

Итак, имеем характеристический корень кратности $\ell = 3$. При этом

$$\begin{aligned} \mathbf{A} - 2\mathbf{E} &= \begin{pmatrix} 2-2 & 0 & 0 \\ 0 & 1-2 & -1 \\ 0 & 1 & 3-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \\ &\Rightarrow r = \text{rang}(\mathbf{A} - 2\mathbf{E}) = 1. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$n - r = 3 - 1 = 2$$

и для нахождения решений можно воспользоваться формулами (21.12).

2) Найдем собственные векторы матрицы \mathbf{A} , относящиеся к собственному значению $\lambda = 2$. Имеем:

$$\begin{aligned} (\mathbf{A} - 2\mathbf{E})\mathbf{X} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}, \\ \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{или} \quad \begin{cases} 0 \cdot x_1 - x_2 - x_3 = 0, \\ 0 \cdot x_1 + x_2 + x_3 = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Выбрав x_3 в качестве зависимой переменной, а x_1, x_2 — свободными, получаем общее решение:

$$x_3 = 0 \cdot x_1 - x_2.$$

Находим фундаментальную систему решений:

$$x_1 = 1, x_2 = 0 \Rightarrow x_3 = 0;$$

$$x_1 = 0, x_2 = 1 \Rightarrow x_3 = -1.$$

$$\Rightarrow \mathbf{D}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{D}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Итак, получили, что $\mathbf{D}_1, \mathbf{D}_2$ – линейно независимые собственные векторы матрицы \mathbf{A} , относящиеся к собственному значению $\lambda = 2$. Следовательно, решения системы дифференциальных уравнений:

$$\mathbf{Y}_1 = e^{2x} \mathbf{D}_1 = e^{2x} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{Y}_2 = e^{2x} \mathbf{D}_2 = e^{2x} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

3) Третье решение системы уравнений найдем в виде

$$\mathbf{Y}_3 = e^{\lambda x} (\mathbf{D}_{30} + \mathbf{D}_{31}x),$$

где $\mathbf{D}_{31} = \alpha \mathbf{D}_1 + \beta \mathbf{D}_2$, α, β – числа, одновременно не равные нулю, которые выбираются так, чтобы система линейных уравнений $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E})\mathbf{X} = \mathbf{D}_{31}$ была совместна;

\mathbf{D}_{30} – любое решение системы уравнений $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E})\mathbf{X} = \mathbf{D}_{31}$.

Исследуем на совместность систему линейных уравнений $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E})\mathbf{X} = \alpha \mathbf{D}_1 + \beta \mathbf{D}_2$. Имеем:

$$(\mathbf{A} - 2\mathbf{E})\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix},$$

$$\alpha \mathbf{D}_1 + \beta \mathbf{D}_2 = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ -\beta \end{pmatrix};$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ -\beta \end{pmatrix} \quad \text{или} \quad \begin{cases} 0 = \alpha, \\ 0 \cdot x_1 - x_2 - x_3 = \beta, \\ 0 \cdot x_1 + x_2 + x_3 = -\beta. \end{cases}$$

Система будет совместна при $\alpha = 0$ и $\forall \beta \in \mathbb{R}$. Пусть $\alpha = 0$ и $\beta = -1$. Тогда

$$\mathbf{D}_{31} = 0 \cdot \mathbf{D}_1 + (-1) \cdot \mathbf{D}_2 = -\mathbf{D}_2$$

и система для нахождения \mathbf{D}_{30} имеет вид

$$\begin{cases} 0 \cdot x_1 - x_2 - x_3 = -1, \\ 0 \cdot x_1 + x_2 + x_3 = 1. \end{cases}$$

Выбрав x_3 в качестве зависимой переменной, а x_1, x_2 – свободными, получаем общее решение:

$$x_3 = 1 - 0 \cdot x_1 - x_2.$$

Полагаем $x_1 = 0$, $x_2 = 0$ и находим частное решение:

$$\mathbf{D}_{30} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Подставляем $\mathbf{D}_{31} = -\mathbf{D}_2$ и \mathbf{D}_{30} в \mathbf{Y}_3 и получаем:

$$\mathbf{Y}_3 = e^{2x} \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} x \right] = e^{2x} \begin{pmatrix} 0 \\ -x \\ 1+x \end{pmatrix}.$$

Найденные таким образом решения $\mathbf{Y}_1, \mathbf{Y}_2, \mathbf{Y}_3$ образуют фундаментальную систему и, следовательно, общее решение системы имеет вид:

$$\begin{aligned} \mathbf{Y} &= C_1 \mathbf{Y}_1 + C_2 \mathbf{Y}_2 + C_3 \mathbf{Y}_3 = \\ &= C_1 e^{2x} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 e^{2x} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + C_3 e^{2x} \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} x \right] = \\ &= C_1 e^{2x} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 e^{2x} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + C_3 e^{2x} \begin{pmatrix} 0 \\ -x \\ 1+x \end{pmatrix} \end{aligned}$$

или, более подробно

$$\begin{cases} y_1 = C_1 e^{2x}, \\ y_2 = C_2 e^{2x} - C_3 x e^{2x}, \\ y_3 = -C_2 e^{2x} + C_3 (1+x) e^{2x}. \end{cases} \quad \diamond$$

ПРИМЕР 21.8. Найти общее решение системы $\mathbf{Y}' = \mathbf{A}\mathbf{Y}$, где

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & -4 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ -4 & 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

РЕШЕНИЕ. Так как система – линейная однородная с постоянными коэффициентами, то ее общее решение может быть найдено методом Эйлера.

1) Матрица системы:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & -4 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ -4 & 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

Ее характеристическая матрица:

$$\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 4-\lambda & -4 & 2 \\ 2 & -2-\lambda & 1 \\ -4 & 4 & -2-\lambda \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} |\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}| &= -\lambda(\lambda^2 + 4\lambda - 4\lambda) = -\lambda^3, \\ &\Rightarrow \lambda_{1,2,3} = 0. \end{aligned}$$

Итак, имеем характеристический корень кратности $\ell = 3$. При этом

$$\mathbf{A} - 0 \cdot \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 4-0 & -4 & 2 \\ 2 & -2-0 & 1 \\ -4 & 4 & -2-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -4 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ -4 & 4 & -2 \end{pmatrix},$$

$$\Rightarrow r = \text{rang}(\mathbf{A} - 0 \cdot \mathbf{E}) = 1.$$

Следовательно,

$$n - r = 3 - 1 = 2$$

и для нахождения решений можно воспользоваться формулами (21.12).

2) Найдем собственный вектор матрицы \mathbf{A} , относящийся к собственному значению $\lambda = 0$. Имеем:

$$(\mathbf{A} - 0 \cdot \mathbf{E})\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 4 & -4 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ -4 & 4 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0},$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 4 & -4 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ -4 & 4 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{или} \quad \begin{cases} 4x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 0, \\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 = 0, \\ -4x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 0. \end{cases}$$

Как уже указывали выше, ранг матрицы системы равен 1 и в качестве базисного минора можно выбрать, например, минор $|1|$. Тогда переменная x_3 будет зависимой, а x_1, x_2 – свободными. Отбрасываем первое и третье уравнение системы и находим общее решение:

$$2x_1 - 2x_2 + x_3 = 0,$$

$$\Rightarrow x_3 = -2x_1 + 2x_2 \text{ – общее решение.}$$

Фундаментальная система решений состоит из двух решений. Полагая $x_1 = 1, x_2 = 0$ и $x_1 = 0, x_2 = 1$, находим их:

$$\mathbf{D}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{D}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Итак, получили, что \mathbf{D}_1 и \mathbf{D}_2 – собственные векторы матрицы \mathbf{A} , относящиеся к собственному значению $\lambda = 0$. Следовательно, решение системы дифференциальных уравнений:

$$\mathbf{Y}_1 = e^{0 \cdot x} \mathbf{D}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad \mathbf{Y}_2 = e^{0 \cdot x} \mathbf{D}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

3) Третье решение системы уравнений найдем в виде

$$\mathbf{Y}_3 = e^{\lambda x} (\mathbf{D}_{30} + \mathbf{D}_{31}x),$$

где $\mathbf{D}_{31} = \alpha \mathbf{D}_1 + \beta \mathbf{D}_2$, α, β – числа, одновременно не равные нулю, которые выбираются так, чтобы система линейных уравнений $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E})\mathbf{X} = \mathbf{D}_{31}$ была совместна;

\mathbf{D}_{30} – любое решение системы уравнений $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E})\mathbf{X} = \mathbf{D}_{31}$.

Исследуем на совместность систему линейных уравнений $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E})\mathbf{X} = \alpha \mathbf{D}_1 + \beta \mathbf{D}_2$. Имеем:

$$\begin{aligned} (\mathbf{A} - 0 \cdot \mathbf{E})\mathbf{X} &= \begin{pmatrix} 4 & -4 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ -4 & 4 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \\ \alpha \mathbf{D}_1 + \beta \mathbf{D}_2 &= \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ -2\alpha + 2\beta \end{pmatrix}; \\ \Rightarrow \begin{pmatrix} 4 & -4 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ -4 & 4 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ -2\alpha + 2\beta \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Умножим вторую строку на -2 и 2 и прибавим к первой и третьей строке соответственно. В результате получим систему линейных уравнений:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha - 2\beta \\ \beta \\ -2\alpha + 4\beta \end{pmatrix}.$$

Система будет совместна при $\alpha - 2\beta = -2\alpha + 4\beta = 0$, где β – любое действительное число. Пусть

$$\beta = 1 \Rightarrow \alpha = 2.$$

Тогда $\mathbf{D}_{31} = 2 \cdot \mathbf{D}_1 + \mathbf{D}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$

и система для нахождения \mathbf{D}_{30} имеет вид

$$\{2x_1 - 2x_2 + x_3 = 1,$$

Выбрав x_3 в качестве зависимой переменной, а x_1, x_2 – свободными, получаем общее решение:

$$x_3 = 1 - 2x_1 + 2x_2.$$

Полагаем $x_1 = 0$, $x_2 = 0$ и находим частное решение:

$$\mathbf{D}_{30} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Подставляем $\mathbf{D}_{31} = 2 \cdot \mathbf{D}_1 + \mathbf{D}_2$ и \mathbf{D}_{30} в \mathbf{Y}_3 и получаем:

$$\mathbf{Y}_3 = e^{0 \cdot x} \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} x \right] = \begin{pmatrix} 2x \\ x \\ 1-2x \end{pmatrix}.$$

Найденные таким образом решения $\mathbf{Y}_1, \mathbf{Y}_2, \mathbf{Y}_3$ образуют фундаментальную систему и, следовательно, общее решение системы имеет вид:

$$\begin{aligned} \mathbf{Y} &= C_1 \mathbf{Y}_1 + C_2 \mathbf{Y}_2 + C_3 \mathbf{Y}_3 = \\ &= C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + C_3 \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} x \right] = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + C_3 \begin{pmatrix} 2x \\ x \\ 1-2x \end{pmatrix} \end{aligned}$$

или, более подробно

$$\begin{cases} y_1 = C_1 + 2C_3x, \\ y_2 = C_2 + C_3x, \\ y_3 = -2C_1 + 2C_2 + C_3(1-2x). \end{cases} \quad \diamond$$

Итак, мы рассмотрели метод Эйлера в трех случаях:

- 1) характеристические корни матрицы \mathbf{A} действительны и различны;
- 2) характеристические корни матрицы \mathbf{A} различны, но среди них есть комплексные;
- 3) характеристические корни матрицы \mathbf{A} действительны, но среди них есть кратные.

Не рассмотренным остался случай, когда среди характеристических корней матрицы \mathbf{A} есть кратные комплексные корни. В этой ситуации алгебраические трудности метода Эйлера возрастают настолько, что лучше использовать другие методы интегрирования.