


6-1 分别绘出以下各序列的图形：


(1)  $x(n] = nu(n)$

(2)  $x(n] = -nu(-n)$

解：(1)  $x(n] = nu(n)$



(2)  $x(n] = -nu(-n)$



6-2 分别绘出以下各序列的图形：


(1)  $u(n+2) \cdot u(-n-4)$

(2)  $(n-1)[\delta(n-1) - \delta(n+1)]$


解：(1)



则两个离散序列相乘得：



$$(2) (n-1)[\delta(n-1)-\delta(n+1)] = 2\delta(n+1)$$



6-3 判断下列信号是否是周期信号，如果是请写出其周期。

$$(2) x(n) = e^{j\left(\frac{n}{5}-6\pi\right)} \quad (3) x(n) = \sin \frac{2n\pi}{5} + \cos \frac{3n\pi}{7}$$

解：(2)  $x(n) = e^{j\left(\frac{n}{5}-6\pi\right)} = e^{j\frac{n}{5}}$ ,  $\Omega_0 = \frac{1}{5}$ , 则  $\frac{2\pi}{\Omega_0} = 10\pi$  (无理数), 故序列  $x(n)$  为非周期


序列。

$$(3) x(n) = \sin \frac{2n\pi}{5} + \cos \frac{3n\pi}{7} = \sin \frac{2\pi}{5}n + \cos \frac{3\pi}{7}n, \text{ 对于序列 } \sin \frac{2\pi}{5}n, \frac{2\pi}{\Omega_0} = 5,$$


其周期为 5; 对于序列  $\cos \frac{3\pi}{7}n$ ,  $\frac{2\pi}{\Omega_0} = \frac{7}{3}$ , 其周期为 7, 故序列  $x(n) = \sin \frac{2n\pi}{5} + \cos \frac{3n\pi}{7}$

的周期 (最小公倍数) 为 35。

6-4 写出题图 6-4 所示各序列的表达式。



(a)



(b)

题图 6-4

解：(a)  $f_1(n) = u(n+3) + u(n-1) - 2u(n-5)$

$$(b) f_2(n) = u(n+2) - 2u(n-2) + u(n-5)$$

6-6 求下列序列的卷积和。

$$(1) u(n) * u(n)$$

$$(2) 0.5^n u(n) * 3^n u(n)$$

$$(3) 2^n u(n-1) * 3^n u(-n+2)$$

$$(4) nu(n) * \delta(n+3)$$

解: (1) 设  $f(n) = u(n) * u(n) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} u(i) \cdot u(n-i) = \sum_{i=0}^n 1 = (n+1) \cdot u(n)$

$$(2) 0.5^n u(n) * 3^n u(n) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} 0.5^i u(i) \cdot 3^{n-i} u(n-i) = 3^n \cdot \sum_{i=0}^n \left(\frac{0.5}{3}\right)^i$$

利用等比数列部分和公式  $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$  得:

$$\begin{aligned} 0.5^n u(n) * 3^n u(n) &= 3^n \frac{1 \cdot \left[1 - \left(\frac{1}{6}\right)^{n+1}\right]}{1 - \frac{1}{6}} u(n) \\ &= 3^n \cdot \frac{6}{5} \left[1 - \left(\frac{1}{6}\right)^{n+1}\right] u(n) = \frac{2}{5} \cdot 3^{n+1} \left[1 - \left(\frac{1}{6}\right)^{n+1}\right] u(n) \end{aligned}$$

(3) 该卷积和利用定义来做较为简单,

$$2^n u(n-1) * 3^n u(-n+2) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} 3^i u(-i+2) \cdot 2^{n-i} u(n-i-1)$$

根据单位阶跃序列的定义可得:  $-i+2 \geq 0 \Rightarrow i \leq 2$ ;  $n-i-1 \geq 0 \Rightarrow i \leq n-1$

$$\text{当 } n-1 \leq 2 \text{ 时, 则 } \sum_{i=-\infty}^{\infty} 3^i u(-i+2) \cdot 2^{n-i} u(n-i-1) = 2^n \cdot \sum_{i=-\infty}^{n-1} \left(\frac{3}{2}\right)^i$$

$$\text{当 } n-1 > 2 \text{ 时, 则 } \sum_{i=-\infty}^{\infty} 3^i u(-i+2) \cdot 2^{n-i} u(n-i-1) = 2^n \cdot \sum_{i=-\infty}^2 \left(\frac{3}{2}\right)^i$$

$$\text{故可得: } 2^n u(n-1) * 3^n u(-n+2) = \left[2^n \cdot \sum_{i=-\infty}^{n-1} \left(\frac{3}{2}\right)^i\right] \cdot u(-n+3) + \left[2^n \cdot \sum_{i=-\infty}^2 \left(\frac{3}{2}\right)^i\right] u(n+4)$$


(4) 利用卷积的性质 ( $f(n) * \delta(n-m) = f(n-m)$ ) 可得:

$$nu(n) * \delta(n+3) = nu(n) \Big|_{n=n+3} = (n+3)u(n+3)$$

6-7 如题图 6-4 所示, 如果  $y(n) = f_1(n) * f_2(n)$ , 则试求  $y(-2)$ 、 $y(0)$ 、 $y(1)$  的值。


解: 由于  $y(n) = f_1(n) * f_2(n) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} f_1(i) \cdot f_2(n-i)$ , 则  $y(-2) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} f_1(i) \cdot f_2(-2-i)$ , 其图

形如下：




对应时刻点相乘后累加得  $y(-2) = 4$ 。

$$y(0) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} f_1(i) \cdot f_2(-i), \text{ 其图形如下图所示:}$$



对应时刻点相乘后累加得  $y(0) = 4$ 。

$$y(1) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} f_1(i) \cdot f_2(1-i), \text{ 其图形如下图所示:}$$



对应时刻点相乘后累加得  $y(1) = 4$ 。

由于  $f_1(n)$  和  $f_2(n)$  为有限序列，故该题可采用数乘法进行计算：

$$\begin{array}{cccccccccccccccc}
 & & & & & & & & & & 1 & 1 & 1 & \underset{\uparrow}{1} & 2 & 2 & 2 & 2 \\
 & & & & & & & & & & 1 & 1 & \underset{\uparrow}{1} & 1 & -1 & -1 & -1 \\
 \hline
 & & & & & & & & & & -1 & -1 & -1 & -1 & -2 & -2 & -2 & -2 \\
 & & & & & & & & & & -1 & -1 & -1 & -1 & -2 & -2 & -2 & -2 \\
 & & & & & & & & & & -1 & -1 & -1 & -1 & -2 & -2 & -2 & -2 \\
 & & & & & & & & & & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\
 & & & & & & & & & & 1 & 1 & 1 & \underset{\uparrow}{1} & 2 & 2 & 2 & 2 \\
 & & & & & & & & & & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\
 & & & & & & & & & & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\
 \hline
 1 & 2 & 3 & 4 & 4 & \underset{\uparrow}{4} & 4 & 5 & 2 & -1 & -4 & -6 & -4 & -2
 \end{array}$$

可得  $y(-2)=4$ 、 $y(0)=4$ 、 $y(1)=4$ 。

6-8 已知两序列

$$\begin{array}{ccc}
 f_1(n) = \{\cdots, 0, 1, \underset{\uparrow}{2}, 3, 4, 0, \cdots\}, & f_2(n) = \{\cdots, 0, \underset{\uparrow}{1}, 2, 3, 0, \cdots\}, \\
 n=0 & n=0
 \end{array}$$

试计算  $y(n) = f_1(n) * f_2(n)$ 。

解：由于两个序列为有限长序列，故采用数乘法较为简单：

$$\begin{array}{cccc}
 & & & & 1 & 2 & 3 & 4 \\
 & & & & & \uparrow & & \\
 & & & & & 1 & 2 & 3 \\
 \hline
 & & & & 3 & 6 & 9 & 12 \\
 & & & & 2 & 4 & 6 & 8 \\
 & & & & 1 & 2 & 3 & 4 \\
 & & & & \uparrow & & & \\
 & & & & 1 & 4 & 10 & 16 & 17 & 12
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \text{故 } y(n) = f_1(n) * f_2(n) = \{\cdots, 0, 1, \underset{\uparrow}{4}, 10, 16, 17, 12, 0, \cdots\}, \\
 n=0
 \end{array}$$

6-9 已知某 LTI 系统的单位脉冲响应为

$$\begin{array}{c}
 h(n) = \{\cdots, 0, \underset{\uparrow}{2}, 2, 2, 0, \cdots\}, \\
 n=0
 \end{array}$$

则当系统激励  $f(n) = (-1)^n u(n)$  时，试求系统的零状态响应  $y_f(n)$ 。

解：由已知得： $h(n) = 2\{u(n) - u(n-3)\}$ ，则系统的零状态响应为

$$y_f(n) = h(n) * f(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^{n-k} u(n-k) \cdot 2 \{u(k) - u(k-3)\}$$

则当  $k \geq 0$  ;  $k \leq 2$  ; 且  $n-k \geq 0 \Rightarrow k \leq n$  时,  $y_f(n)$  有非零值, 故

$$\text{当 } n < 0 \text{ 时, } y_f(n) = h(n) * f(n) = 0$$

当  $0 \leq n \leq 2$  时,

$$y_f(n) = \left[ \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \cdot 2 \right] \cdot [u(n) - u(n-3)] = 2 \cdot (-1)^n \left[ \sum_{k=0}^n (-1)^{-k} \right] \cdot [u(n) - u(n-3)]$$

$$y_f(0) = 2 \cdot (-1)^0 \left[ \sum_{k=0}^0 (-1)^{-k} \right] = 2$$

$$y_f(1) = 2 \cdot (-1)^1 \left[ \sum_{k=0}^1 (-1)^{-k} \right] = 2 \cdot (1-1) = 0$$

$$y_f(2) = 2 \cdot (-1)^2 \left[ \sum_{k=0}^2 (-1)^{-k} \right] = 2 \cdot (1-1+1) = 2$$

$$\text{当 } n \geq 3 \text{ 时, } y_f(n) = \left[ \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \cdot 2 \right] \cdot u(n-3) = 2 \cdot (-1)^n \left[ \sum_{k=0}^2 (-1)^{-k} \right] \cdot u(n-3)$$


$$y_f(3) = 2 \cdot (-1)^3 \left[ \sum_{k=0}^2 (-1)^{-k} \right] = 2 \cdot (-1) \cdot (1-1+1) = -2$$

$$y_f(4) = 2 \cdot (-1)^4 \left[ \sum_{k=0}^2 (-1)^{-k} \right] = 2 \cdot (1) \cdot (1-1+1) = 2$$


$$y_f(5) = 2 \cdot (-1)^5 \left[ \sum_{k=0}^2 (-1)^{-k} \right] = 2 \cdot (-1) \cdot (1-1+1) = -2, \dots\dots$$

该题采用图解法相对容易, 且不容易出错。


当  $n < 0$ ,  $f(k) \cdot h(n-k) = 0$ , 例如  $n = -1$  时的  $h(-1-k)$  如下图所示:




当  $n = 0$ , 则  $f(k) \cdot h(-k) = 2$ , 如下图所示:




当  $n=1$ ,  $f(k) \cdot h(1-k) = 2 - 2 = 0$ , 如下图所示:



当  $n=2$ ,  $f(k) \cdot h(2-k) = 2 - 2 + 2 = 2$ , 如下图所示:



当  $n=3$ ,  $f(k) \cdot h(2-k) = -2 + 2 - 2 = -2$ , 如下图所示:



同理可得  $y_f(4) = 2$ ,  $y_f(5) = -2$ , 等等

故可得:  $y_f(n) = 2\delta(n) + 2 \cdot (-1)^n u(n-2)$


6-17 三个子系统的输入输出关系如下:

子系统 1:  $y(n) = x(n/2) - 2$

子系统 2:  $y(t) = 3x(n)$

子系统 3:  $y(n) = x(2n) + 1$

将三个子系统级联如题图 6-17 所示，则整个系统的输入输出之间是否满足线性、时不变的关系？



题图 6-17

解：非线性、时变系统。

6-19 已知系统的单位脉冲响应如下，试判断系统的因果性和稳定性。

(3)  $h(n) = \delta(2n) + \delta(n-1)$       (4)  $h(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(-n+3)$

解： (3) 因果、稳定系统

(4) 非因果、非稳定系统