

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

ACTARA® 25 WG

INSECTICIDA - NEONICOTINOIDE
THIAMETHOXAM

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O
SE INHALA. PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL
POR EXPOSICIÓN

"NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN"
"MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS
MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS,
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS"



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: ACTARA® 25 WG es un insecticida sistémico y translaminar, con amplio espectro de acción y rápida penetración. Actúa por contacto e ingestión interfiriendo los receptores de mensajes en el sistema nervioso de los insectos, ocasionando que estos dejen de alimentarse inmediatamente y mueran después.

EQUIPO DE APLICACIÓN: ACTARA® 25 WG puede ser aplicado foliarmente con cualquier equipo convencional. Aplicaciones dirigidas a la base de la planta pueden hacerse con equipo terrestre, tratando de lograr la cantidad adecuada del producto. También aplicaciones a través de sistemas de riego por goteo son posibles. Todo equipo debe estar limpio y adecuadamente calibrado previo a la aplicación. Calibre siempre el equipo con agua, antes de aplicar el producto. Recuerde obtener el equipo auxiliar adecuado (medidores de productos líquidos y sólidos, cubetas graduadas, paletas de agitación, cepillos, brochas, etc.). Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: botas, mascarilla, anteojos, guantes, dosificador y equipo de aplicación en buen estado.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Agregar la cantidad recomendada de ACTARA® 25 WG en un recipiente con agua para realizar una pre-mezcla. Esta agregarla al tanque que contiene el agua total a asperjar. Calibre el equipo adecuado previo a la aplicación y lávelo inmediatamente después de usarlo.



RECOMENDACIONES DE USO:

Costa Rica

CULTIVOS	INSECTOS
Tomate <u>Lycopersicum esculentum</u>	Mosca blanca <u>Bemisia spp</u>
Arroz <u>Oryza sativa</u>	Sogatata <u>Sogatodes oryzicola</u> Chinche <u>Oebalus insularis</u>
Melón <u>Cucumis melo</u>	Afidos <u>Aphis gossiphya</u> <u>Bemisia tabaci</u>
Sandía <u>Citrullus vulgaris</u>	Mosca blanca <u>Bemisia tabaci</u>
Chayote <u>Sechium edule</u>	Mosca blanca <u>Bemisia argentifolii</u> Afidos <u>Aphis spp</u>
Algodón <u>Gossypium sp</u>	Mosca blanca <u>Bemisia tabaci</u>
Caña de azúcar <u>Saccharum officinarum</u>	Salivazo <u>Aenolamia postica</u>
Cítricos <u>Citrus spp</u>	Psílido <u>Diaphorina citri</u>

DOSIS RECOMENDADAS:

Tomate: 250-400 gramos/ha. Arroz: 75-100 gramos/ha.

Melón: 220-280 gramos/ha. Sandía: 400 gramos/ha.

Chayote: 200-250 gramos/ha. Algodón: 200 gramos/ha.

Caña de azúcar: 400-600 gramos/ha. Cítricos: 357-535 gramos/ha (1-3 g/árbol).

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Tomate: Dependiendo del nivel de presión de plagas, aplique 3 días después del trasplante en un volumen de agua de 200-300 l/ha ó 20-25 ml/planta. Realizar de 2 a 3 aplicaciones a intervalos de 15 días.

Arroz: Iniciar aplicaciones a los 15 días después de germinado el cultivo.

Melón: Aplicar a la base del tallo (drench) 12 días después de la siembra. Vía foliar: 220 g/ha. Intervalo máximo entre aplicaciones: 7 días.

Sandía: Aplicación a la base del tallo (drench) 7 días después del trasplante. En presencia de altas poblaciones de insectos iniciar 4 ddt (días después del trasplante), realizando una segunda aplicación a los 16 ddt, con la misma dosis.

Chayote: Dependiendo del nivel de presión de las plagas, hacer una o dos aplicaciones a los 3-7 y/o 20-25 días después del trasplante. Aplicaciones dirigidas a la base de la planta en un volumen de solución de 25 mL/planta. Volumen de agua: 400 L/ha.

Caña de azúcar: Entre 30 y 60 días. Dirija la aplicación a la base de la plantas, distribuyendo el caldo de aspersión tanto al suelo como a los tallos.

Algodón: Iniciar las aplicaciones 25-30 dds (al inicio de la infestación), con intervalo de 7 días.

Cítricos: Realice una aplicación al suelo, a 1 metro de la base del tronco, con un volumen de agua de 1100 L/ha.

El Salvador

CULTIVOS	INSECTOS
Caña de azúcar <u>Saccharum officinarum</u>	Chinche Salivoza <u>Aenolamia sp</u>
Tomate <u>Lycopersicum esculentum</u> Chile <u>Capsicum sp</u> Papa <u>Solanum tuberosum</u>	Mosca blanca <u>Bemisia argentifolii</u>
Melón <u>Cucumis melo</u> Sandía <u>Citrullus vulgaris</u>	Mosca blanca <u>Bemisia argentifolii</u>

DOSIS RECOMENDADAS:

Caña de azúcar: 200-400 gramos/ha (140-280 gramos/mz)

Tomate, Chile, Papa: 200-600 gramos/ha (140-420 gramos/mz)

Melón, Sandía: 400 gramos/ha (280 gramos/mz)

Nicaragua

CULTIVO	INSECTO
Arroz <u>Oryza sativa</u>	Chinche hedionda <u>Oebalus insularis</u>
Tomate <u>Lycopersicum esculentum</u> Chile <u>Capsicum sp</u> Melón <u>Cucumis melo</u>	Mosca blanca <u>Bemisia spp</u> Afidos <u>Aphis spp</u> Afidos <u>Mysus spp</u>
Caña de azúcar <u>Saccharum officinarum</u>	Salivazo o Mosca pinta <u>Aenolamia sp</u>
Tabaco <u>Nicotiana tabacum</u>	Mosca blanca <u>Bemisia spp</u> Afidos <u>Aphis spp</u>

DOSIS RECOMENDADA: 50-400 gramos/ha (35-280 gramos/mz)

Belice

CULTIVOS	INSECTOS
Papaya <u>Carica papaya</u>	Afidos <u>Aphis spp</u> Mosca blanca <u>Bemisia spp</u> Cochinillas <u>Dysmicoccus sp</u>

Guatemala, Honduras y República Dominicana

CULTIVOS	INSECTOS
Tomate <u>Lycopersicum esculentum</u> Chile <u>Capsicum sp</u>	Mosca blanca <u>Bemisia spp</u> <u>Trialeurodes spp</u> Afidos <u>Aphis spp</u>

Melón <u>Cucumis melo</u>	Afidos <u>Mysus spp</u> Afidos <u>Macrosiphum spp</u>
Caña de azúcar <u>Saccharum officinarum</u>	Salivazo o Mosca pinta <u>Aenolamia sp</u>

Guatemala, Honduras y República Dominicana

CULTIVO	INSECTOS
Tabaco <u>Nicotiana tabacum</u>	Mosca blanca <u>Bemisia spp</u> Afidos <u>Aphis spp</u>

Guatemala

CULTIVO	INSECTOS
Zucchini <u>Cucurbita máxima</u>	Mosca blanca <u>Bemisia spp</u> <u>Trialeurodes spp</u> Afidos <u>Aphis spp</u> Afidos <u>Mysus spp</u> Afidos <u>Macrosiphum spp</u>
Okra <u>Hibiscus esculenta</u>	Mosca blanca <u>Bemisia sp</u>

República Dominicana

CULTIVO	INSECTOS
Arroz <u>Oryza sativa</u>	Sogata <u>Sogatodes oryzicola</u> Chinche marrón <u>Tibraca limbariventris</u> Chinche o hiede vivo <u>Oebalus insularis</u> Millonaria <u>Hidrellia spp</u>

Panamá

CULTIVOS	INSECTOS
Tomate <u>Lycopersicum esculentum</u> Chile <u>Capsicum sp</u> Melón <u>Cucumis melo</u> Sandía <u>Citrullus vulgaris</u> Zapallo <u>Cucurbita pepo</u> Pepino <u>Cucumis sativus</u> Otras cucurbitáceas	Mosca blanca <u>Bemisia spp</u> <u>Trialeurodes spp</u> Afidos <u>Aphis spp</u> Afidos <u>Mysus spp</u> Afidos <u>Macrosiphum spp</u>
Arroz <u>Oryza sativa</u>	Chinche hedionda <u>Oebalus insularis</u>
Caña de azúcar <u>Saccharum officinarum</u>	Salivazo o Mosca pinta <u>Aenolamia sp</u>
Chayote <u>Sechium edule</u>	Mosca blanca <u>Bemisia argentifolli</u>

DOSIS RECOMENDADAS:

Tomate, Chile, Melón, Zucchini, Sandía, Tabaco, Zapallo, Pepino, Chayote: 250-400 gramos/ha (175-280 gramos/mz)

Arroz: 50-100 gramos/ha (35-70 gramos/mz)

Caña de azúcar: 200-400 gramos/ha (140-280 gramos/mz)

Caña de azúcar – PANAMÁ: 400 gramos/ha (280 gramos/mz)

Okra: 300 gramos/ha (210 gramos/mz)

Papaya: 400 gr/ha (280 gr/mz)

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Tomate, Chile, Papa y Okra: Dependiendo del nivel de infestación de las plagas, hacer dos o tres aplicaciones a los 2-3, 12-15 y/o 25 días después del transplante. Aplicaciones dirigidas a la base de la planta en un volumen de solución de 25 cm³ o mL/planta. Volumen de agua: 500 L/ha para 20,000 plantas/ha. Realizar un máximo de 3 aplicaciones por ciclo de cultivo. No alternar con otros insecticidas del mismo grupo.

Tabaco: Una sola aplicación 7 días después del transplante o después de hacer resiembra. Aplicaciones dirigidas a la base de la planta en un volumen de solución de 25 mL/planta. Volumen de agua: 500 L/ha para 20,000 plantas/ha. Realizar un máximo de 3 aplicaciones por ciclo de cultivo. No alternar con otros insecticidas del mismo grupo.

Arroz: Para el control de Sogata y la prevención de hoja blanca, aplique **ACTARA® 25 WG** a partir de los 15 días de germinado el cultivo.

Melón, Zucchini, Sandía, Zapallo, Pepino, Chayote: Dependiendo del nivel de presión de las plagas, hacer una o dos aplicaciones a los 3-7 y/o 20-25 días después del transplante. Aplicaciones dirigidas a la base de la planta en un volumen de solución de 25 mL/planta. Volumen de agua: 400 L/ha.

Caña de azúcar: Entre 30 y 60 días.

Papaya: Aplicación foliar al inicio de la infestación, a intervalo de 10 días. No hacer más de cuatro aplicaciones por año.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Tomate, Chile, Papa, Melón, Zucchini, Sandía, Zapallo, Pepino, Papaya y Chayote: 3 días. **Tabaco y Okra:** 14 días. **Arroz y Caña de azúcar:** 30 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Se puede reingresar al área tratada una vez que se ha secado el rocío de la aspersión; de lo contrario, se recomienda usar el equipo de protección personal apropiado.

FITOTOXICIDAD: Cuando se usa según las recomendaciones, **ACTARA® 25 WG** es bien tolerado por los cultivos. Sin embargo, debido al gran número de variedades e híbridos existentes, se recomienda hacer ensayos en pequeña escala para observar la fitocompatibilidad.

COMPATIBILIDAD: Siempre se recomienda realizar previamente una prueba de compatibilidad a pequeña escala con los productos a utilizar. Ante la imposibilidad de conocer todos los productos del mercado no asumimos ninguna responsabilidad por mezclas hechos con estos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

ACTARA® 25 WG no es explosivo, no es inflamable, no es corrosivo. Almacénalo en bodegas seguras, alejadas del calor, el fuego directo y la humedad. No transportar junto con productos de consumo animal y humano. Transpórtelo en su envase original, bien cerrado y debidamente etiquetado, con su correspondiente panfleto.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: En pruebas con animales se observaron efectos como disnea, actividad locomotora reducida, piloerección y postura reclinada. No se esperan efectos adversos en humanos por debajo de los límites de exposición ocupacional y cuando el producto es manejado como se indica en la etiqueta.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Si es ingerido, acuda al médico inmediatamente y, si es posible, muestre el envase, la etiqueta o este panfleto. No provoque el vómito. Si la persona está consciente, administre repetidamente carbón medicinal con bastante agua.

POR INHALACIÓN: Retire a la persona afectada de la zona de peligro, llévela a una habitación bien ventilada o a donde haya aire fresco. Si la respiración es irregular o se detiene, administre respiración artificial. Mantenga al paciente cálido y relajado. Llame inmediatamente al médico o al centro nacional de intoxicación.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos. Retire lentes de contacto en caso necesario. Busque atención médica inmediata.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Retire inmediatamente la ropa contaminada. Lave la piel inmediatamente con abundante agua. Si la irritación en la piel persiste, llame al médico. La ropa contaminada debe lavarse muy bien antes de volver a usarla.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No hay antídoto específico conocido. Aplicar terapia sintomática.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TELÉFONO
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica	1-801-00-29832 2251-3560, 2232-0735
BELICE	Karl Heusner Memorial Hospital Dr. Hurrisa Hailu	231-548 y 231-639 622-460
EL SALVADOR	Hospital Nacional Rosales	2231-9262
HONDURAS	Hospital Escuela	232-2322 y 232-2415
NICARAGUA	Centro Nacional de Toxicología	2289-4700, ext. 1294, 87550983
COSTA RICA	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones	2223-1028

PANAMÁ	Centro de Información e Investigación de Medicamentos y Tóxicos	523-4948, 523-4968
REPÚBLICA	Hospital Dr. Luis Aybar	684-3478 y 684-3672
DOMINICANA	Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello	681-2913 y 681-6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES VACÍOS.

TÓXICO PARA ABEJAS.

No aplique sobre cultivos en floración atractivos para las abejas desde 10 días antes de la floración y hasta el final de la misma.

No permita que la nube de aspersión derive hacia cultivos en floración o malezas.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En el caso de derrames o desechos del producto, recogerlos con aserrín o con material absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. A fin de evitar remanentes, se sugiere preparar la mezcla a utilizar en el día.

Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto.

No contamine con este producto o sus envases, desechos o derrames: ríos, lagos, charcas, zanjas, canales de drenaje, alcantarillas, etc. Evite los derrames del producto por la contaminación que puede provocar a las fuentes de agua. No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre del producto hacia otras áreas.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

El formulador garantiza el contenido de este envase, siendo apto el producto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso. El buen uso será responsabilidad exclusiva del comprador.

FORMULADOR:

Gowan Milling LLC
12300 E County 8th Street, Yuma, AZ 85365, Estados Unidos.
Tel: ++ 1 928 3441014 / Fax: ++ 1 928 3449445

IMPORTADO POR:

Guatemala:

Agro Insumos, S.A.

5ª Avenida 5-55 zona 14, Edificio Europlaza, Torre 3, 8º Nivel,
Guatemala. Tel. 2312-7000 / Fax 2312-7005

Belice:

James Brodie & Cia. Ltda.

16 Regent Street, Ciudad de Belice. Tel. 227-070 / Fax: 275-593

El Salvador:

Proagro, S. A.

Edificio Fertica. 5ª. Ave. Norte y 19 Calle Poniente
San Salvador, El Salvador. Tel. 503 2234-0444

Honduras:

Nicaragua:

Syngenta Crop Protection, S. A. – Sucursal Nicaragua

Residencial Los Robles, casa L-15 Del restaurante La marseillaise media cuadra al sur, Managua Nicaragua. Tel.: 2270-5008 / Fax: 2278-0928

Costa Rica:

Syngenta Crop Protection, S.A. – Sucursal Costa Rica

700 m este de la Intersección del Aeropuerto Juan Santamaría
Calle paralela, contiguo Zona Franca Saret. Plaza Aeropuerto, Oficina
D1, Alajuela, Costa Rica. Tel.: 2431-4707. Fax: 2431-4710

Panamá:

Syngenta, S.A.

R.U.C. 5306-2-329422 D.V.80, Clave 3987

Business Park, Costa del Este. Ave. La Rotonda, Edificio Torre V, Piso 12, República de Panamá. Tel.: 270-8200 / Fax: 270-8288

República Dominicana:

Syngenta Crop Protection, S.A. – Sucursal República Dominicana

Porfirio Herrera No. 29, Torre Empresarial INICA, Local 4W, Ensanche Evaristo Morales, Santo Domingo
Tel.: 1-809 227-0414. Fax 1-809 540-9340

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	302-184B	04-03-14
BELICE	0308-1	30-06-15
EL SALVADOR	AG-98-12-532	18-12-13
HONDURAS	531-268-III	10-01-13
NICARAGUA	SY-04E-2014	25-03-15
COSTA RICA	4386	08-09-99
PANAMÁ	1280	16-03-10
REPÚBLICA DOMINICANA	1977	28-10-14