

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

AMISTAR® 50 WG

FUNGICIDA - METOXIACRILATO
AZOXYSTROBIN

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O
SE INHALA. PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL
POR EXPOSICIÓN

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”
“MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS
MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS,
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

Amistar® 50 WG es un fungicida sistémico, protectante, erradicante y antiesporulante, inhibidor de la respiración mitocondrial, bloqueando la transferencia de electrones entre citocromo b y citocromo c₁, evitando así la formación de ATP.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Aspersora de mochila o equipo accionado por tractor. Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise cuidadosamente que esté en buen estado de funcionamiento. Antes de aplicar Amistar® 50 WG, calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que está aplicando la dosis correcta. Se recomienda usar boquillas de cono hueco. Para dosificar la cantidad correcta de acuerdo al tanque de la aspersora, debe utilizar tazón medidor. Después de la aplicación, lave el equipo de aspersión con agua y jabón, deje secarlo y guárdelo. Utilice el equipo de protección personal, antes de usar y manipular Amistar® 50 WG.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Póngase el equipo de protección personal antes de usar y manipular Amistar® 50 WG. Como con todos los productos químicos, evite en lo posible el contacto con la solución. No comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación de este producto. De acuerdo con la dosis de Amistar® 50 WG a utilizar, mézclelo en el tanque con agua limpia hasta la mitad; seguidamente complete el volumen de agua requerido. Agite para obtener una mezcla homogénea antes de comenzar la aspersión. Se recomienda una presión de 20 a 40 libras por pulgada cuadrada y un volumen de 200-400 litros de agua por hectárea (140-350 litros de agua por manzana).



RECOMENDACIONES DE USO:

USOS AUTORIZADOS EN GUATEMALA:			
Café	<u>Coffea Arabica</u>	Antracnosis	<u>Colletotrichum coffeanum</u>
		Ojo de gallo	<u>Mycena citricolor</u>
		Cercospora	<u>Cercospora coffeicola</u>
Arroz	<u>Oryza sativa</u>	Tizón de la hoja	<u>Pyricularia oryzae</u>
		Rizoctonia	<u>Rhizoctonia sp</u>
		Escaldado de la hoja	<u>Rhynchosporium sp</u>
		Mancha marrón	<u>Helminthosporium oryzae</u>
Melón	<u>Cucumis melo</u>	Mildiu velloso	<u>Pseudoperonospora cubensis</u>
Sandía	<u>Citrullus vulgaris</u>	Mildiu polvoroso	<u>Erysiphe sp</u>
Pepino	<u>Cucumis sativus</u>	Fusarium	<u>Fusarium spp</u>
Zucchini	<u>Cucurbita maxima</u>	Alternaria	<u>Alternaria spp</u>
		Gomosis	<u>Didymella bryoniae</u>
Tabaco	<u>Nicotiana tabacum</u>	Moho azul	<u>Peronospora tabacina</u>
Semilleros		Cercospora	<u>Cercospora nicotianae</u>
		Alternaria	<u>Alternaria tabacina</u>
		Pata negra	<u>Phytophthora nicotianae</u> var. <u>parasitica</u>
Cebolla	<u>Allium cepa</u>	Mildiu	<u>Peronospora destructor</u>
Ajo	<u>Allium sativum</u>	Alternaria	<u>Alternaria spp</u>
		Mildiu	<u>Peronospora destructor</u>
Papa	<u>Solanum tuberosum</u>		
Tomate	<u>Lycopersicon esculentum</u>	Tizón temprano	<u>Alternaria solani</u>
		Tizón tardío	<u>Phytophthora infestans</u>

Chile			
pimiento	<u>Capsicum spp</u>		
Rosas	<u>Rosa spp</u>	Mildiu polvoroso	<u>Sphaerotheca pannosa</u>
		Mildiu velloso	<u>Peronospora spp</u>
		Antracnosis	<u>Colletotrichum sp</u>
		Alternaria	<u>Alternaria sp</u>
		Rizoctonia	<u>Rhizoctonia sp</u>
		Sclerotinia	<u>Sclerotinia sp</u>
		Antracnosis	<u>Colletotrichum sp</u>
Mango	<u>Mangifera indica</u>		
Frijol	<u>Phaseolus vulgaris</u>	Roya	<u>Uromyces phaseoli</u>
		Antracnosis	<u>Colletotrichum lindemuthianum</u>
		Mancha foliar	<u>Cercospora spp</u>
Arveja			
china	<u>Pisum sativum</u>	Tizón de la hoja	<u>Ascochyta sp</u>
Ejote	<u>Phaseolus spp</u>	Roya	<u>Uromyces phaseoli</u>
francés			
Maíz	<u>Zea mays</u>	Roya	<u>Puccinia sorghi</u>
dulce			
Zanahoria	<u>Daucus carota</u>	Alternaria	<u>Alternaria dauci</u>
Apio	<u>Apium graveolens</u>	Septoria	<u>Septoria apii</u>
Lechuga	<u>Lactuca sativa</u>	Cercospora	<u>Cercospora sp</u>

USOS AUTORIZADOS EN BELICE:			
Melón	<u>Cucumis melo</u>	Mildiu velloso	<u>Pseudoperonospora cubensis</u>
Sandía	<u>Citrullus vulgaris</u>	Mildiu polvoroso	<u>Erysiphe sp</u>
Pepino	<u>Cucumis sativus</u>	Fusarium	<u>Fusarium spp</u>
		Alternaria	<u>Alternaria spp</u>
		Gomosis	<u>Didymella bryoniae</u>
Arroz	<u>Oryza sativa</u>	Tizón de la hoja	<u>Pyricularia oryzae</u>
		Rizoctonia	<u>Rhizoctonia sp</u>
		Escaldado de la hoja	<u>Rhynchosporium sp</u>
		Mancha marrón	<u>Helminthosporium oryzae</u>
Papaya	<u>Carica papaya</u>	Antracnosis	<u>Colletotrichum gloesporoides</u>
			<u>Cercospora papayae</u>
Naranja	<u>Citrus sinensis</u>	Cercospora	<u>Cercospora papayae</u>
Limón	<u>Citrus lemon</u>	Antracnosis	<u>Colletotrichum gloesporoides</u>
Cebolla	<u>Allium cepa</u>	Mildiu	<u>Peronospora destructor</u>
		Alternaria	<u>Alternaria porri</u>
Papa	<u>Solanum tuberosum</u>	Tizón tardío	<u>Phytophthora infestans</u>
Tomate	<u>Lycopersicon esculentum</u>		
		Tizón temprano	<u>Alternaria solani</u>
Chile	<u>Capsicum spp</u>	Antracnosis	<u>Colletotrichum coccodes</u>
Malanga	<u>Colocasia esculenta</u>	Marchitez	<u>Fusarium sp</u>

USOS AUTORIZADOS EN EL SALVADOR:			
Café	<u>Coffea Arabica</u>	Antracnosis	<u>Colletotrichum coffeanum</u>
		Ojo de gallo	<u>Mycena citricolor</u>
		Cercospora	<u>Cercospora</u>
			<u>coffeicola</u>
Arroz	<u>Oryza sativa</u>	Tizón de la hoja	<u>Pyricularia oryzae</u>
		Rizoctonia	<u>Rhizoctonia sp</u>
		Escaldado de la hoja	<u>Rhynchosporium sp</u>
		Mancha marrón	<u>Helminthosporium oryzae</u>
Melón	<u>Cucumis melo</u>	Mildiu velloso	<u>Pseudoperonospora cubensis</u>
Sandía	<u>Citrullus vulgaris</u>	Mildiu polvoroso	<u>Erysiphe sp</u>
Pepino	<u>Cucumis sativus</u>	Fusarium	<u>Fusarium spp</u>
		Alternaria	<u>Alternaria spp</u>
		Gomosis	<u>Didymella bryoniae</u>
Cebolla	<u>Allium cepa</u>	Alternaria	<u>Alternaria spp</u>
		Mildiu	<u>Peronospora destructor</u>
Papa	<u>Solanum tuberosum</u>		
Tomate	<u>Lycopersicon esculentum</u>	Tizón temprano	<u>Alternaria solani</u>
		Tizón tardío	<u>Phytophthora infestans</u>
Frijol	<u>Phaseolus vulgaris</u>	Roya	<u>Uromyces phaseoli</u>
		Antracnosis	<u>Colletotrichum lindemuthianum</u>
		Mancha foliar	<u>Cercospora spp</u>

USOS AUTORIZADOS EN HONDURAS:			
Café	<u>Coffea Arabica</u>	Antracnosis	<u>Colletotrichum coffeanum</u>
		Ojo de gallo	<u>Mycena citricolor</u>
		Cercospora	<u>Cercospora</u>
			<u>coffeicola</u>
Arroz	<u>Oryza sativa</u>	Tizón de la hoja	<u>Pyricularia oryzae</u>
		Rizoctonia	<u>Rhizoctonia sp</u>
		Escaldado de la hoja	<u>Rhynchosporium sp</u>

Arroz	<u>Oryza sativa</u>	Mancha marrón	<u>Helminthosporium oryzae</u>
Melón	<u>Cucumis melo</u>	Mildiu velloso	<u>Pseudoperonospora cubensis</u>
Sandía	<u>Citrullus vulgaris</u>	Mildiu polvoroso	<u>Erysiphe</u> sp
Pepino	<u>Cucumis sativus</u>	Fusarium	<u>Fusarium</u> spp
		Alternaria	<u>Alternaria</u> spp
		Gomosis	<u>Didymella bryoniae</u>
Tabaco	<u>Nicotiana tabacum</u>	Moho azul	<u>Peronospora tabacina</u>
Semilleros		Cercospora	<u>Cercospora nicotianae</u>
Cebolla	<u>Allium cepa</u>	Mildiu	<u>Peronospora destructor</u>
Ajo	<u>Allium sativum</u>	Alternaria	<u>Alternaria</u> sp
Papa	<u>Solanum tuberosum</u>		
Tomate	<u>Lycopersicon esculentum</u>	Tizón temprano	<u>Alternaria solani</u>
		Tizón tardío	<u>Phytophthora infestans</u>
Frijol	<u>Phaseolus vulgaris</u>	Roya	<u>Uromyces phaseoli</u>
		Antracnosis	<u>Colletotrichum lindemuthianum</u>
			<u>Cercospora</u> spp
Mango	<u>Mangifera indica</u>	Mancha foliar	<u>Colletotrichum</u> sp
		Antracnosis	
		Antracnosis	
		post-cosecha	<u>Colletotrichum</u> sp

USOS AUTORIZADOS EN NICARAGUA:			
Arroz	<u>Oryza sativa</u>	Cercóspora	<u>Cercospora oryzae</u>
		Mancha marrón	<u>Helminthosporium oryzae</u>
Tabaco	<u>Nicotiana tabacum</u>	Moho azul	<u>Peronospora tabacina</u>

USOS AUTORIZADOS EN COSTA RICA:			
Café	<u>Coffea Arabica</u>	Ojo de gallo	<u>Mycena citricolor</u>
Arroz	<u>Oryza sativa</u>	Rizoctonia	<u>Rhizoctonia oryzae</u>
Melón	<u>Cucumis melo</u>	Mildiu velloso	<u>Pseudoperonospora cubensis</u>
Sandía	<u>Citrullus vulgaris</u>	Mildiu velloso	<u>Pseudoperonospora cubensis</u>
Tomate	<u>Lycopersicon esculentum</u>	Tizón tardío	<u>Phytophthora infestans</u>
Papa	<u>Solanum tuberosum</u>	Tizón tardío	<u>Phytophthora infestans</u>
Helecho	hoja de cuero	Antracnosis	<u>Colletotrichum acutatum</u>
	<u>Rumohra adiantinformis</u>		
Cebolla	<u>Allium cepa</u>	Tizón foliar	<u>Stemphylium botryosum</u>
Frijol	<u>Phaseolus vulgaris</u>	Mustia hilachosa	<u>Thanatephorus cucumeris</u>
		Mancha angular	<u>Phaeoisariopsis griseola</u>
Zanahoria	<u>Daucus carota</u>	Alternaria	<u>Alternaria dauci</u>
Papaya	<u>Carica papaya</u>	Viruela de las Hojas y frutos	<u>Asperisporium caricae</u>

USOS AUTORIZADOS EN PANAMÁ:			
Café	<u>Coffea Arabica</u>	Antracnosis	<u>Colletotrichum coffeanum</u>
		Ojo de gallo	<u>Mycena citricolor</u>
		Cercospora	<u>Cercospora coffeicola</u>
Arroz	<u>Oryza sativa</u>	Tizón de la hoja	<u>Pyricularia oryzae</u>
		Rizoctonia	<u>Rhizoctonia</u> sp.
		Escaldado de la hoja	<u>Rhynchosporium</u> sp.
		Mancha marrón	<u>Helminthosporium oryzae</u>
Melón	<u>Cucumis melo</u>	Mildiu velloso	<u>Pseudoperonospora cubensis</u>
Sandía	<u>Citrullus vulgaris</u>	Mildiu polvoroso	<u>Erysiphe</u> sp.
Pepino	<u>Cucumis sativus</u>	Fusarium	<u>Fusarium</u> spp.
		Gomosis	<u>Didymella bryoniae</u>
Zapallo	<u>Cucurbita pepo</u>	Mildiu polvoroso	<u>Erisiphe</u> sp.
Otras cucurbitáceas		Mildius	<u>Erisiphe</u> sp.

USOS AUTORIZADOS EN REPÚBLICA DOMINICANA:			
Café	<u>Coffea Arabica</u>	Antracnosis	<u>Colletotrichum coffeanum</u>
		Ojo de gallo	<u>Mycena citricolor</u>
		Cercospora	<u>Cercospora coffeicola</u>
Arroz	<u>Oryza sativa</u>	Tizón de la hoja	<u>Pyricularia oryzae</u>
		Rizoctonia	<u>Rhizoctonia</u> sp
		Escaldado de la hoja	<u>Rhynchosporium</u> sp
		Mancha marrón	<u>Helminthosporium oryzae</u>
Melón	<u>Cucumis melo</u>	Mildiu velloso	<u>Pseudoperonospora cubensis</u>
Sandía	<u>Citrullus vulgaris</u>	Mildiu polvoroso	<u>Erysiphe</u> sp
Pepino	<u>Cucumis sativus</u>	Fusarium	<u>Fusarium</u> spp
		Alternaria	<u>Alternaria</u> spp
		Gomosis	<u>Didymella bryoniae</u>
Tabaco	<u>Nicotiana tabacum</u>	Moho azul	<u>Peronospora</u>

Semilleros		Cercospora	<u>tabacina</u>
			<u>Cercospora nicotianae</u>
		Alternaria	<u>Alternaria tabacina</u>
		Pata negra	<u>Phytophthora</u>
		<u>nicotianae</u>	var.
Cebolla	<u>Allium cepa</u>	Mildiu	<u>parasitica</u>
			<u>Peronospora destructor</u>
Ajo	<u>Allium sativum</u>	Alternaria	<u>Alternaria</u> spp
Papa	<u>Solanum tuberosum</u>		
Tomate	<u>Lycopersicon esculentum</u>	Tizón temprano	<u>Alternaria solani</u>
		Tizón tardío	<u>Phytophthora infestans</u>

DOSIS RECOMENDADAS:

Café: Antracnosis: 150-200 gramos de producto por ha (105-140 gramos de producto por manzana)
Ojo de gallo: 250-300 gramos de producto por ha (175-210 gramos de producto por manzana)

Arroz: 250-300 gramos de producto por ha (175-210 gramos de producto por manzana)

Maní, melón, sandía, pepino, zucchini, zapallo y tabaco: 200 gramos de producto por ha (140 gramos por manzana)

Ejote francés, maíz dulce, zanahoria, apio y lechuga: 200-300 gramos de producto por ha, (0,4-0,5 gramos de producto por litro de agua).

Ajo y cebolla: 150-200 ppm. de i.a. (0,3-0,4 gramos de producto por litro de agua)

Rosas: 200-250 ppm. de i.a. (0,4-0,5 gramos de producto por litro de agua)

Ornamentales: 75-100 ppm. de i.a. (0,15-0,20 gramos de producto por litro de agua)

Papa y tomate: 250-300 ppm. de i.a. (0,5-0,6 gramos de producto por litro de agua)

Chile: 0,5 – 0,6 gramos de producto por litro de agua.

Mango: 150 ppm de i.a. equivalente a 0.3 gramos de **Amistar® 50 WG** por litro de agua en aspersiones foliares.

Para el control preventivo de antracnosis de la fruta durante la post-cosecha se recomienda el tratamiento por inmersión de la fruta en una solución Amistar a una concentración de 150 ppm de ingrediente activo.

Papaya y cítricos: 0,3 gramos de producto por litro de agua.

Papaya post-cosecha: 0,2 – 0,3 gramos de producto por litro de agua.

Malanga: 300 – 500 gramos de producto por hectárea.

Frijol: 120 – 160 gramos de producto diluidos en un volumen de 200 – 250 litros de agua por hectárea. O bien un sobre de 10 gramos de **Amistar® 50 WG** diluido en una aspersora de 16 litros de agua.

Arveja china: 250 gramos de producto por hectárea (175 gramos por manzana), en un volumen máximo de 500 litros de agua/ha. La dosis mínima de **Amistar® 50 WG** deberá ser de 0,5 g de producto comercial por litro de agua, en un intervalo de aplicaciones de no más de 7 días.

Helecho hoja de cuero: 200 gramos por ha. Cuando se dosifica por concentración, ésta no deberá ser menor de 0,25 g/L. El volumen de mezccla debe ser de 950 a 1000 L/ha. Aplicación foliar; usar boquilla de cono hueco.

Cebolla – Costa Rica: 0.2 kg/ha en aplicaciones cada 7 días, en un volumen de aplicación de 300 L/ha.

Frijol – Costa Rica: 0,15 kg/ha. Realizar dos aplicaciones con un intervalo de 15 días cuando se presenten condiciones favorables para la enfermedad.

Zanahoria-Costa Rica: 150 g/ha

Papaya-Costa Rica: 128 a 160 g/Ha⁻¹, en 800 l/Ha⁻¹

NOTA: Una medida de 25 mililitros es equivalente a 15 gramos de **Amistar® 50 WG**.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Arroz: Aplicar a los 30-40 días después de la siembra o transplante. Repetir la aplicación a los 70-75 días.

Arroz-Costa Rica: Aplicar a los 45 y 75 días después de la siembra

Café: Cada 30-45 días.

Maní: Cada 15 días, alternando con fungicidas de diferente modo de acción.

Melón, sandía, pepino, zucchini, zapallo y tabaco: Cada 7-10 días, alternando con fungicidas de diferente modo de acción.

Melón- Costa Rica: Cada 10 días, alternando con fungicidas de diferente modo de acción.

Ajo y cebolla: Cada 7-14 días, alternando con fungicidas de diferente modo de acción.

Rosas y ornamentales: Cada 7-10 días, alternando con fungicidas de diferente modo de acción.

Papa, tomate, chile, maíz dulce, zanahoria, apio y lechuga: Cada 7-10 días, según el clima y la presión de la enfermedad. Alternar con fungicidas de diferente modo de acción.

Zanahoria-Costa Rica: Realizar cuatro aplicaciones, cada 7 días, 45 días después de la siembra, utilizando 300 litros de agua por hectárea, según el clima y la presión de la enfermedad.

Mango: Aplicaciones al follaje cada 21 días realizando la primera aplicación durante la floración y alternando con fungicidas de diferente modo de acción. Para el control preventivo de la antracnosis en la post-cosecha se recomienda, además de las aspersiones en el campo, complementar el tratamiento por inmersión de la fruta recién cosechada.

Papaya: Iniciar las aspersiones al inicio de floración, a un intervalo de 15 a 22 días, alternando con fungicidas de diferente modo de acción como **Bravo®**.

Naranja y limón: Asperjar al inicio de floración y una segunda aspersión 22 días después.

Malanga: Cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad; dos aspersiones a un intervalo de 15 días entre cada una.

Frijol: 1-2 aplicaciones entre los 15 y 30 días después de la siembra.

Arveja china y ejote francés: Las aplicaciones deberán hacerse a intervalos no mayores de 7 días. El número de aplicaciones de **Amistar® 50 WG** no deberá ser más del 30% del total de ciclos durante la temporada; además, las aplicaciones deberán hacerse alternadas con productos de diferente modo de acción.

Helecho hoja de cuero: Las aplicaciones deberán ser a intervalos de 7 a 10 días; no realizar más de un tercio del total de las aplicaciones y alternar con fungicidas de diferente modo de acción.

Papaya-Costa Rica: Realice la primera aplicación al detectar la presencia de la enfermedad, y posteriormente en frecuencia de 14 días.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Arroz, café, maní, melón, sandía, pepino, zucchini, zapallo, tabaco, ajo, mango, papaya, naranja, limón, frijol, arveja china, rosas, ornamentales, helecho hoja de cuero, apio, ejote francés y zanahoria: Cero días.

Cebolla, chile y malanga: Dos días.

Papa, tomate, maíz dulce y lechuga: Siete días.

Arroz-Costa Rica: 30 días

Papaya-Costa Rica: 3 d

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Después que la mezcla con el producto se haya secado en el follaje del cultivo tratado. Utilizar el equipo de protección personal.

FITOTOXICIDAD: Ninguna fitotoxicidad cuando se aplica solo y de acuerdo con las instrucciones de uso.

COMPATIBILIDAD: Compatible con la mayoría de productos agrícolas, no se mezcle con productos alcalinos. Sin embargo, siempre se recomienda realizar una prueba de compatibilidad a pequeña escala con los productos a utilizar.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No es inflamable ni corrosivo. No almacene ni transporte **Amistar® 50 WG** junto con productos de consumo humano, animal, fertilizantes, herbicidas y semillas. Almacénese y transpórtese en su envase original, en un lugar seco y bien ventilado, lejos del alcance de los niños o personas mentalmente incapacitadas.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

No se desarrollan síntomas específicos de intoxicación, pero el producto puede ser irritante a ojos y piel.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: No provoque el vómito, lavar la boca con agua. Lleve inmediatamente al paciente al médico.

POR INHALACIÓN: Retire al paciente a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y vigile la respiración.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Abra los párpados y lave los ojos con un flujo continuo de agua limpia por 15 minutos. Consulte al médico.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón por 15 minutos.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático y terapia de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TELÉFONO
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica	1-801-00-29832 2251-3560, 2232-0735
BELICE	Karl Heusner Memorial Hospital Dr. Hurrisa Hailu	231-548 y 231-639 622-460
EL SALVADOR	Centro Nacional de Información Toxicológica, Hospital San Rafael	2525-5800, ext.148 y 149
HONDURAS	Hospital Escuela	232-2322 y 232-2415
NICARAGUA	Centro de Toxicología Complejo de Salud Concepción Palacios	2289-7150, ext. 213
COSTA RICA	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones	2223-1028
PANAMÁ	Centro de Información e Investigación de Medicamentos y Tóxicos	523-4948, 523-4968
REPÚBLICA DOMINICANA	Hospital Dr. Luis Aybar Hospital Dr. Francisco	684-3478 y 684-3672

Moscoso Puello

681-2913 y 681-6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

No contamine fuentes de agua con los desechos o envases vacíos.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En el caso de derrames o desechos del producto, recogerlos con aserrín o con material absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. A fin de evitar remanentes, se sugiere preparar la mezcla a utilizar en el día.

Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o

deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante garantiza el contenido de este envase, siendo apto el producto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso. El buen uso será responsabilidad exclusiva del comprador.

FORMULADO POR:

Gowan Milling LLC, 12300 E County 8th Street, Yuma, AZ 85365, Estados Unidos de America, USA

IMPORTADO POR:

Guatemala:

Agroinsumos, S.A.

5ª Avenida 5-55 zona 14, Edificio Europlaza, Torre 3, 8º Nivel
Tel.: 2312-7000. Fax: 2312-7005

Belice:

James Brodie & Cia. Ltda.

16 Regent Street, Ciudad de Belice. Tel. 227-070 / Fax: 275-593

El Salvador:

Honduras:

Syngenta Crop Protection – Sucursal Honduras

Residencial Las Hadas casa #2902, Tegucigalpa,
Tel. 234-7764. Fax 232-0725

Nicaragua:

Syngenta Crop Protection, S. A. – Sucursal Nicaragua

Residencial Los Robles, casa L-15 Del restaurante La marseillaise
media cuadra al sur, Managua Nicaragua.
Tel.: 2270-5008 / Fax: 2278-0928

Costa Rica:

Syngenta Crop Protection, S.A. – Sucursal Costa Rica

700 m este de la Intersección del Aeropuerto Juan Santamaría
Calle paralela, contiguo Zona Franca Saret
Plaza Aeropuerto, Oficina D1, Alajuela, Costa Rica.
Tel.: 2431-4707. Fax: 2431-471

Panamá:

Syngenta, S.A.

R.U.C. 5306-2-329422 D.V.80, Clave 3987
Panamá Torre Evergreen Piso 6, Ave. 5ta B Sur y Calle 78 Este
San Francisco, Ciudad Panamá, República de Panamá
Tel.: 270-8200 / Fax: 270-8288

República Dominicana:

Syngenta Crop Protection, S.A. – Sucursal República Dominicana

Calle Porfirio Herrera No. 29, Torre Empresarial INICA - Piso 4to.
Ensanche Evaristo Morales, Santo Domingo, República Dominicana.
Tel.: 1- 809 227 0412 / 14. Fax: 1- 809 540 9340

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	302-220	11-09-02
BELICE	0268-1	30-06-08
EL SALVADOR	AG-96-10-395	09-10-09
HONDURAS	205-103-II	16-12-11
NICARAGUA	Sy-247B-6-98	10-04-03
COSTA RICA	4267	14-01-99
PANAMÁ	1155	04-09-09
REPÚBLICA DOMINICANA	1812	08-05-08