

**¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS**

ARMEVAL[®] 48 WP

**FUNGICIDA – ACILALANINA, INORGANICO
METALAXYL, COPPER OXYCHLORIDE**

CUIDADO

ANTIDOTO: NO TIENE

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE
Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS
Y A LA PIEL POR EXPOSICION**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION
MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS,
PERSONAS MENTALMENTE
INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS
Y MEDICAMENTOS**



USO AGRONOMICO:

MODO DE ACCION:

Fungicida de acción sistémico, erradicante y protectiva. Es absorbido por el follaje. Se transporta vía floema. **ARMEVAL 48 WP** combina la eficacia de dos fungicidas de diferente modo de acción, el metalaxyl inhibe la ARN polimerasa, que reduce la síntesis de ácidos nucleicos, mientras que el cobre tiene un modo de acción multisitio afectando al patógeno en varios sitios de su ciclo de vida. El metalaxyl presenta acción curativa, mientras que el cobre posee acción preventiva.

EQUIPO DE APLICACION:

El equipo de aplicación será bomba de mochila o equipo motorizado acoplado a tractor. Se recomienda utilizar boquillas de cono hueco. Calibre su equipo de aplicación inicialmente sólo con agua, verifique que el mismo se encuentre en buen estado de funcionamiento y sin fugas. El personal que manipule este producto deberá usar equipo de protección personal: botas de hule, mascarilla, lentes, guantes de hule, dosificador y aplicador.



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:

Llene el tanque de la aspersora con agua hasta la mitad, agregue la dosis correcta del producto y complete el volumen de agua, agite hasta que se homogenice la mezcla. Asegúrese de contar con el equipo auxiliar como dosificadores, cubetas graduadas y paletas de agitación; además, utilice el equipo de protección como botas de hule, mascarilla, lentes y guantes de hule.

El equipo y los utensilios empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. Deseche las aguas de lavado en un hueco, lejos de fuentes de agua viviendas.



RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones
Melón (<i>Cucumis melo</i>)	Mildiú vellosa (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	0,5 Kg/ha	Aplique ante ataques iniciales del patógeno y condiciones favorables al cultivo.
Sandía (<i>Citrullus lanatus</i>)		1 – 1,5 Kg/ha	Aplique ante ataques iniciales del patógeno y condiciones favorables al cultivo.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Se recomienda NO efectuar más de 4 aplicaciones por ciclo. Melón y Sandía: Las aplicaciones se deben hacer entre 12 y 21 días.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACION Y LA COSECHA:

Melón y Sandía: 15 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:

Se puede ingresar a la plantación 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD:

No causa fitotoxicidad cuando las aspersiones se realizan de acuerdo con las prácticas recomendadas. Como todo fungicida que contiene cobre, no se recomienda el uso de tensoactivos, tales como penetrantes.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común. No debe mezclarse con aceites, caldo bordeles, fentin-acetato. Es incompatible con ditiocarbamatos como methiran.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN
CASAS DE HABITACION
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE
EL MANEJO Y
APLICACION DE ESTE PRODUCTO**



**BAÑESE DESPUES DE
TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA**

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Este producto no es inflamable, ni corrosivo, no transporte este producto con alimentos, semillas, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor a una temperatura no superior a 35 °C y lejos del alcance de niños, personas discapacitadas y animales domésticos. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

SINTOMAS DE INTOXICACION:

Oral: Irritación gastrointestinal con vómitos verdoso y dolor quemante en boca, esófago y estómago, dolor abdominal y diarrea a veces sanguinolenta. Cefalea, transpiración, debilidad y shock. Hepatomegalia e ictericia, hemólisis y metahemoglobinemia. Albuminuria, hemoglobinemia, a veces insuficiencia renal.

Dérmica: Irritación de la piel y de los ojos. Sensibilización.

Inhalación: Irritación del tracto respiratorio.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTION: no induzca al vómito. Lleve de inmediato al paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACION: mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS
EN ESTADO DE INCONSCIENCIA**

TRATAMIENTO MEDICO:

El tratamiento médico es sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Costa Rica	Centro Nacional de Intoxicaciones	2223-1028

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE:**TOXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.**

NO CONTAMINE RIOS, LAGOS, ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos perforándolos. Si el país cuenta con un programa de recolección y disposición de envases, entregue este al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto. En caso de derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y recólectelos en un recipiente hermético y entréguelo al distribuidor o elimínelo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA
DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS,
PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE**

AVISO DE GARANTIA:

El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. También garantizan la eficacia del producto, siempre y cuando se le de el uso estipulado en el panfleto. Debido a que está fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, manipuleo de este producto, nos es imposible asumir responsabilidades por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Se garantiza asimismo la composición química del producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el envase se encuentre sellado.

FORMULADO POR:

INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLÉS, S.A.
Av. Rafael Casanova, 81-08100 MOLLET DEL VALLES,
Barcelona, ESPAÑA
Teléfono: 93 579 66 77 - Fax 0034 93 573 71 94

**IMPORTADOR Y DISTRIBUIDO POR:**

DAC - DISTRIBUIDORA AGROCOMERCIAL S.A.
Tel: 2494-9800 • Fax: 2249-3733 • Coyol, Alajuela, Costa Rica.
info@agrodac.com • www.agrodac.com



**PAIS
COSTA RICA**

**NUMERO DE REGISTRO
8702396**

**FECHA DE REGISTRO
19 / JULIO / 2010**