

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.



BACSTAR 25 WG

FUNGICIDA – MICROBIOLÓGICO

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS CEPA D747

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN, MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO.

MODO DE ACCIÓN.

Bacstar 25 WG es un fungicida bactericida microbiológico preventivo, de amplio espectro que ejerce control y supresión de enfermedades de suelo y follaje. Su modo de acción incluye la liberación de metabolitos de que causan disrupción de las membranas y paredes celulares, también coloniza rápidamente el follaje, la rizosfera y otras superficies de la planta, donde compete con los patógenos por los espacios para colonización e infección de la planta.

EQUIPO DE APLICACIÓN.

Este producto puede aplicarse con equipo de espalda con un volumen de aplicación de 200 a 400 litros por hectárea. Se puede aplicar también con equipo tirado con tractor (boom) usando de 100 a 150 litros por hectárea y también aplicación con equipo aéreo, avión o helicóptero, utilizando entre 10 a 30 litros de caldo por hectárea, estas aplicaciones deben hacerse cuando casi no se tengan vientos y las temperaturas no sean mayores a 32 °C. Observe que el equipo de aplicación esté en condiciones adecuadas de uso. Calibre el equipo de aplicación. Para aplicarlo utilice boquillas de cono relleno, en el caso de aplicación aérea usar boquillas micronair. Este producto no ejerce ningún tipo de acción sobre el equipo de aplicación. Utilice el siguiente equipo de protección al utilizar este producto: botas de hule, mascarilla, anteojos y guantes.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA.

Para preparar el caldo de aplicación, llene el tanque del equipo de la aspersora hasta la mitad con agua limpia, poniendo el sistema de agitación o recirculación a trabajar, vierta la cantidad requerida de producto y mezclar constantemente con una paleta de agitación, termine de llenar el tanque con agua limpia. El equipo y los utensilios empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. Debe de usar guantes y botas de hule durante el lavado del equipo de aplicación.



RECOMENDACIONES DE USO.

Respete las dosis recomendadas y la forma de aplicación indicada en este panfleto.

Cultivo	Enfermedades	Dosis, épocas, intervalo de aplicación
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Pudrición de la vaina: <i>Rhizoctonia solani</i> . Complejo fungo-bacteriano del arroz: <i>Sarocladium oryzae</i> . <i>Burkholderia glumae</i> .	2 a 2,5 kg por ha. Aplicar entre 30 y 70 días después de emergido el cultivo. Se deben realizar mínimo dos aplicaciones separadas 30 días de una y otra.
Piña <i>Ananas comosus</i> var	<i>Phytophthora</i> spp. <i>Erwinia</i> spp.	2 -3 kg/ha. Aplicar a intervalos de 15 días cuando aparezca la enfermedad.
Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i>	Tizón temprano (<i>Alternaria</i> spp). Tizón tardío (<i>Phytophthora</i> spp). Mancha bacterial (<i>Xanthomonas</i> spp).	0.75 a 1 kg/ha. Iniciar aplicaciones cuando las condiciones del tiempo sean propicias para el desarrollo de las enfermedades. Se pueden iniciar aplicaciones preventivas desde después del trasplante, hasta la madurez del cultivo. Aplicar cada 4 a 10 días.
Melón <i>Cucumis melo</i>	Mildiu vellosa (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>).	0.75 a 1 kg/ha. Iniciar aplicaciones después del trasplante, y repetir cada 7 días hasta máximo 4 aplicaciones.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Cero días, sin restricción.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Esperar a que se seque el rocío de la aplicación. En caso necesario de reingreso al área tratada antes, use equipo de protección completo.

FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico. No se ha reportado fitotoxicidad de Bacstar 25 WG cuando se ha usado siguiendo las recomendaciones de dosis y aplicación.

COMPATIBILIDAD: Este producto es compatible con químicos insecticidas o fungicida que no tenga una reacción alcalina fuerte, siempre y cuando se utilice el mismo día. No mezclar con productos bactericidas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.

Este producto no es inflamable ni corrosivo. No transporta este producto con alimentos, semillas, forrajes, medicamento, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los herbicidas en contacto con otros agroquímicos. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado de calor y lejos del alcance de los niños, personas discapacitadas y animales domésticos. No almacenar a temperaturas mayores de 30°C. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje empaques sin cerrar.

NO ALMACENE ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS
CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN.

Los síntomas de intoxicación son: puede causar irritación de ojos. Puede causar irritación de piel en personas susceptibles. Si se ingiere puede provocar irritación de tracto gastrointestinal con náuseas, salivación, vómito y diarrea.

PRIMEROS AUXILIOS.

En caso de ingestión: si la persona está consciente y no presenta convulsiones, no provocar el vómito dando a beber de uno a dos vasos de agua. Acuda a un médico de inmediato.

En caso de inhalación: lleve a la persona a lugar ventilado. Si la persona no está respirando, llame al 911 o a una ambulancia, después dele respiración artificial, preferentemente de ser posible de boca a boca. Llame a un centro de control de envenenamiento o a un doctor para más consejo de tratamiento.

En caso de contacto con los ojos: mantenga los ojos abiertos y lave despacio y suavemente con agua por 15 – 20 minutos. Retire los lentes de contacto si los tuviere, después de 5 minutos, después continúe lavando los ojos. Llame a un centro de control de envenenamiento o a un doctor para mayor consejo de tratamiento.

En caso de contacto con la piel: quitarse la ropa contaminada. Lavar la piel con bastante agua por 15 a 20 minutos. Llamar a un centro de control de envenenamiento o a un doctor para mayor consejo de tratamiento.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO.

No tiene antídoto específico. El tratamiento médico es sintomático y de soporte. En caso de intoxicación no olvide notificar al ministerio de salud.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN.

Institución	Teléfono	País
Centro Nacional de Intoxicaciones	2223 1028	Costa Rica

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.

Respete las áreas de protección de ríos, quebradas y otras áreas frágiles.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES O FUENTES DE AGUA SUBTERRÁNEA CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES.

En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas recogerlos con aserrín o con material absorbente y para producto sólido recoger con una pala, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlos en un relleno sanitario autorizado por el ministerio de salud.

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perforelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto.

No permita que el contenido de este recipiente se deposite sobre los cuerpos de agua o áreas fuera del cultivo. Asegúrese de darle un manejo y tratamiento adecuado a los envases del producto.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA.

El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su empaque original y cerrado herméticamente. También garantizan la eficacia del producto, siempre y cuando se le dé el uso estipulado en el panfleto. Debido a que está fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento y manipuleo de este producto, nos es imposible asumir responsabilidades por posibles daños que puedan causar ocasionarse debido a estos factores. Se garantiza asimismo la composición química del producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el envase se encuentre sellado.

FORMULADO POR:

CERTIS USA.
9145 Guilford Road, suite 175.
Columbia, Maryland 21046-1883
Estados Unidos.

DISTRIBUIDO POR:

DAC - DISTRIBUIDORA AGROCOMERCIAL S.A.
Tel: 2494-9800 • Fax: 2249-3733 • Coyol, Alajuela, Costa Rica.
info@agrodac.com • www.agrodac.com

País
Costa Rica

Número de registro
3756101

Fecha de registro
27/08/2015