

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS



The Chemical Company

Basagran® 48 SL

HERBICIDA - BENZOTHIADIAZOLE
BENTAZONE



DAÑO
ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1,16–1,22 g/cm a 20°C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O
SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS
Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN**

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN

**MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS
MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES
DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS**



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: Basagran 48 SL es un herbicida de contacto, post-emergente, su acción se basa en la inhibición de la fotosíntesis.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Aspersora de mochila, tractor o avión. Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise cuidadosamente que esté en buen estado de funcionamiento. Antes de aplicar Basagran 48 SL, calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que esté aplicando la dosis correcta. Se recomienda usar boquillas de abanico TJ 8003 o su equivalente. Para dosificar la cantidad correcta de acuerdo al tanque de la aspersora debe utilizar un tazón medidor. Después de la aplicación lave el equipo de aspersión con agua y jabón. Deje secar y guárdelo.



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA: Póngase el equipo de protección personal, antes de usar y manipular Basagran 48 SL. Como con todos los productos químicos evite en lo posible el contacto con la solución. No comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación de este producto. De acuerdo a la dosis de Basagran 48 SL a utilizar mézclelo en el tanque con agua limpia hasta la mitad, seguidamente complete el volumen de agua requerido, agite para obtener una mezcla homogénea antes de comenzar la aspersión. En el sistema convencional use entre 285–570 de agua por hectárea. En aplicaciones aéreas utilice 50 litros por hectárea con una presión de 40 a 50 libras por pulgada cuadrada. Después de la aplicación lave el equipo de aspersión con agua y jabón, deje secar y guárdelo.

RECOMENDACIONES DE USO: Para control de malezas en arroz de riego se necesita drenar el campo antes de la aplicación y colocar 2 días después de nuevo la lámina de agua. En arroz de secano aplicar cuando haya una buena humedad para que las malezas estén activas, no aplicar con estrés por falta de agua. En soja y maní aplicar con buena humedad y utilizar presiones altas, no adicionar coadyuvantes o surfactante, pueden aumentar la fitotoxicidad.



USOS AUTORIZADOS EN EL SALVADOR, BELICE, HONDURAS Y PANAMÁ:

Arroz [Oryza sativa](#)
Fríjol [Phaseolus vulgaris](#)

Soya [Glycine max](#)
Ajonjolí [Sesamun indicum](#)
Maní [Arachis hipogaea](#)
Papa [Solanum tuberosum](#)
Cebolla [Allium cepa](#)
Arveja [Pisum spp](#)

USOS AUTORIZADOS EN NICARAGUA Y COSTA RICA:

Arroz [Oryza sativa](#)
Fríjol [Phaseolus vulgaris](#)
Soya [Glycine max](#)
Maní [Arachis hipogaea](#)
Papa [Solanum tuberosum](#)
Cebolla [Allium cepa](#)
Arveja [Pisum spp](#)
Maíz [Zea mays](#)
Sorgo [Sorghum vulgare](#)

USOS AUTORIZADOS EN REPÚBLICA DOMINICANA:

Arroz [Oryza sativa](#)
Maní [Arachis hipogaea](#)
Papa [Solanum tuberosum](#)
Arveja [Pisum sativum](#)
Habichuelas [Phaseolus vulgaris](#)

NOMBRE DE LAS MALEZAS A CONTROLAR:

Coyolillo [Cyperus ferax](#)
[Cyperus rotundus](#)
[Commelina diffusa](#)
[Eclipta alba](#)
[Ipomoea spp](#)
[Polygonum hydropiper](#)
[Acanthospermum spp](#)
[Ambrosia artemisiifolia](#)
[Artemisia vulgaris](#)
[Bidens pilosa](#)
[Brassica spp](#)
[Chenopodium album](#)
[Commelina spp](#)
[Convolvulus spp](#)
[Datura stramonium](#)
[Emilia sonchifolia](#)
[Galinoga spp](#)
[Heliotropium spp](#)
[Portulaca oleracea](#)
[Raphanus raphanistrum](#)
[Richardia spp](#)
[Sida spinosa](#)
[Tagetes minuta](#)
[Fimbristylis littoralis](#)
[Jussiaea \(andurgia\) erecta](#)
[Ammania coccinea](#)
[Anoda hastata](#)
[Bidens pilosa](#)
[Heteranthera limosa](#)
[Heteranthera reniformis](#)
[Bacopa spp.](#)
[Jussiaea leptocarpa](#)
[Jussiaea linifolia](#)
[Jussiaea linifolia](#)
[Jussiaea repens](#)
[Monochoria vaginalis](#)
[Marsilea berterol](#)
[Alteranthera sessilis](#)
[Sida spp.](#)
[Cyperus sphaellatus](#)
[Lindernia dubia](#)
[Cyperus brevifolius](#)
[Cyperus diffusus](#)
[Cyperus esculentus](#)
[Limncharis flava](#)
[Cyperus ferax](#)
[Cyperus odoratus](#)
[Eleocharis geniculata](#)
[Rotala ramosior](#)
[Sphenoclea zeylanica](#)

Hierba de pollo
Botoncillo, eclipta
Campanilla
Hierba caimán
Acanthospermum
Altamisa
Artemisa
Mozote
Nabo
Cenizo
Siempre viva, suelda
Bejuco
Campanilla silvestre
Hierba socialista
Papacuyo
Gallito
Verdolaga
Rábano silvestre
Lirio de agua
Malva
Flor de muerto
Pelo de mico
Clavito, palisandro
Alfabetueta
Violeta
Alfiter
Lila, buche de gallina
Patito
Graciola
Palo de agua
Clavito de agua
Palo de agua
Clavito acuático
Monocoria
Aigret
Santona, sanguinaria
Escoba
Cortadera
Fábrega
Pelo de oveja
Coquillo
Coquillo
Hoja de buitre
Cabezona
Cortadera
Junquillo
Berro de perro
Stenoclea

DOSIS RECOMENDADAS:

1,5 a 2,0 litros por hectárea.

Se recomienda aplicarlo cuando las malezas ciperáceas y hojas anchas están en etapas de crecimiento de 2-4 hojas, tratando de hacer un buen cubrimiento de éstas.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Una sola aplicación al cultivo.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Treinta días, cuando el producto se aplica solo.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Esperar a que se haya secado el caldo pulverizado, lo cual ocurre 1 hora después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: Basagran 48 SL es selectivo a los diferentes cultivos aprobados. En caso de frijol se presenta una leve fitotoxicidad a granos blancos y/o moteados. Por lo cual recomendamos su uso, previo una pequeña prueba de tolerancia en el cultivo.

COMPATIBILIDAD: Debido a su alta selectividad a los cultivos recomendados, Basagran 48 SL puede ser mezclado con otros herbicidas para ampliar su espectro de control, para el caso de arroz se puede mezclar con Facet 25 SC, propanil u Ordram 96 EC. Cuando se mezcle con propanil no adicionar insecticidas organofosforados y/o carbamatos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No es inflamable ni corrosivo. No almacene ni transporte Basagran 48 SL junto con alimentos de consumo humano, animal, fertilizantes y semillas. Almacénese y transpórtese en su envase original, en un lugar seco y bien ventilado, lejos del alcance de los niños o personas mentalmente incapacitadas. Manéjese con cuidado para evitar derrames; si esto sucede, cúbralos con aserrín o tierra y luego entierre los residuos en lugares alejados de fuentes de agua y casas de habitación.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN



MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO

BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Irritación de la piel y ojos. Síntomas eventuales: náuseas, vómito, molestias estomago- intestinales, trastornos circulatorios.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente abundante agua. Dar al paciente tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua o tres claras de huevo. Buscar ayuda médica.

POR INHALACIÓN: Retire el paciente a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y vigile la respiración.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Abra los párpados y lave los ojos con un flujo continuo de agua limpia por 15 minutos. Consulte al médico.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón por 15 minutos.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES	PAÍS	TELÉFONO
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES	GUATEMALA	22513560, 22320735
DR. HURRISSA HAILU, HAPPY AVENUE INDEPENDENCE STAN CREEK DISTRICT.	BELICE	622-460
CENTRO DE INTOXICACIONES CARL HEUSNER, MEMORIAL HOSPITAL		230778
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA	EL SALVADOR	2280417 EXT 140
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES	HONDURAS	326213

CENTRO DE TOXICOLOGÍA, COMPLEJO DE SALUD CONCEPCIÓN PALACIOS	NICARAGUA	289-7150 298-33-28 2231028
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES	COSTA RICA	2692741
CENTRO DE INVESTIGACIONES E INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS Y TÓXICOS	PANAMÁ	6843478
HOSPITAL DR. LUIS AVIAR.	REPÚBLICA DOMINICANA	6812913
HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO P.		

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TOXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. Los remanentes de plaguicidas sin utilizar deben mantenerse en su envase original debidamente cerrado y etiquetado.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EL PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE

AVISO DE GARANTÍA: El fabricante garantiza el contenido de este envase, siendo apto el producto para los fines recomendados de acuerdo con las instrucciones de uso. El buen uso del producto será responsabilidad exclusiva del comprador.

FABRICANTE Y/O FORMULADO POR:

BASF Aktiengesellschaft, 67056 Ludwigshafen, Alemania

IMPORTADO POR:

GUATEMALA:	BASF de Guatemala SA Avenida Petapa 47-31, Zona 12, Ciudad Guatemala Tel.: 477-4659, Fax: 477-4680
EL SALVADOR:	BASF de El Salvador 89. Ave. Norte Edif.. World Trade Center, Torre II, 3er Nivel, Local No. 313, Colonia Escalon, San Salvador, El Salvador
HONDURAS:	BASF de Guatemala Avenida Petapa 47-31, Zona 12, Ciudad Guatemala Tel.: 477-4659, Fax: 477-4680
NICARAGUA:	
COSTA RICA:	BASF Costa Rica S.A Los Balcones, Plaza Roble, Escazú. San José, Costa Rica Tel.: 201-1900, Fax: 201-8221
PANAMÁ:	FERTICA S.A Carretera Interamericana Coquito, David, Panamá El Rancherito S.A Av. 1ª Oeste diagonal, Calle Norte, Chiriquí, David, Panamá
REPUBLICA DOMINICANA:	BASF Dominicana S.A. Ave. Gustavo Mejía Ricart No. 11, Edificio Rogama, 3er Nivel, Ensanche Naco, Santo Domingo, Rep. Dominicana. Tel 809- 334-1026 Fax: 809 334 1027

PAÍS	NUMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	78-90	24-11-02
BELICE	0011-1	24-11-05
EL SALVADOR	46-23-I	18-10-99
NICARAGUA	BA-073C-2-97	13-03-02
COSTA RICA	1273	24-08-94
PANAMÁ	1662	10-09-04
REPÚBLICA DOMINICANA	1967	25-08-99