

Tamaño completo: 27.21 x 15.21 cms
Tamaño documento: 25 x 13 cms

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y PANFLETO ANTES USAR EL PRODUCTO,
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS



We create chemistry

Basta® 15 SL

HERBICIDA- ÁCIDO FOSFINICO
GLUFOSINATO DE AMONIO



PELIGRO

ANTÍDOTO: NO TIENE
DENSIDAD: 1,10 g/ml a 20 °C.

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALACANCE DE LOS NIÑOS,
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y
MEDICAMENTOS.



ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

USO AGRONÓMICO: Herbicida de uso agrícola.

MODO DE ACCIÓN: Basta 15 SL es un herbicida no selectivo y que tiene acción translinamar, que penetra por las hojas de las malezas. Actúa interfiriendo la acción de la enzima glutamina-sintetasa, la cual cataliza la síntesis del aminoácido glutamina. Como resultado, el metabolismo del amonio en la planta es alterado poco después de la aplicación de Basta 15 SL y el amoniaco (NH₃), el cual es una fuente fitotóxica, se acumula en las células de las plantas y las destruye. Simultáneamente la fotosíntesis es también severamente inhibida. Basta 15 SL no se absorbe por las raíces de las malezas. Para el caso de hortalizas, debe aplicarse en preemergencia total del cultivo o bien antes de la siembra o trasplante.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Para aplicar Basta 15 SL puede utilizar aspersora de espalda, equipo accionado con tractor, es recomendable que verifique el equipo a utilizar y se asegure que el mismo se encuentra en perfectas condiciones.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Verter la mitad de agua en la aspersora, tonel o tanque mezclador. Agregue Adherente y agitar la mezcla. Antes de abrir el envase agite el producto. Agregar la dosis de Basta 15 SL recomendada

y mezclar constantemente con una paleta de agitación. Finalmente agregar el resto del agua requerida para completar la mezcla y ajustar el pH de 4 a 5. Se recomienda tener a la mano el siguiente equipo auxiliar: dosificadores, paletas de 4.5 toneles y cepillos, es necesario lavar el equipo de aplicación después de cada jornada de trabajo y darle el mantenimiento adecuado. En aplicaciones terrestres usar un volumen de mezcla de 200 a 400 litros por hectárea (140-280 L/mz). Una vez realizada la aplicación se debe lavar el equipo. Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: botas, mascarilla, anteojos, guantes, dosificador y equipo de aplicación en buen estado. Lavar el equipo al terminar la aplicación: cubetas, paletas de agitación, cepillo, etc. Este equipo debe estar bien marcado y no debe emplearse para otros usos.



RECOMENDACIONES DE USO:
USOS AUTORIZADOS EN GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Banano y Plátano <i>Musa spp</i> Café <i>Coffea arabica</i> Maíz <i>Zea mays</i> Sorgo <i>Sorghum vulgare</i> Papa <i>Solanum tuberosum</i> Cítricos <i>Citrus sp</i> Uva <i>Vitis vinifera</i> Repollo <i>Brassica oleracea</i> var. capitata Brócoli <i>Brassica oleracea</i> var. italica Coliflor <i>Brassica oleracea</i> var. botrytis Hule <i>Hevea brasiliensis</i> Frijol y frijol ejotero <i>Phaseolus vulgaris</i> Algodón <i>Gossypium hirsutum</i> Melón <i>Cucumis melo</i> Sandía <i>Citrullus lanatus</i> Pepino <i>Cucumis sativus</i> Zucchini <i>Cucurbita sp</i> Arvejas <i>Pisum sativum</i> Palma africana <i>Elaeis guineensis</i> Yuca <i>Manihot esculentus</i> Manzana <i>Malus domestica</i> Pera <i>Pyrus communis</i> Piña <i>Ananas comosus</i> Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i> Papaya <i>Carica papaya</i> Ajonjolí <i>Sesamunindicum</i> Aguacate <i>Persea americana</i> Tomate <i>Solanum lycopersicum</i> Chile <i>Capsicum annuum</i> Coco <i>Cocos nucifera</i> Mango <i>Mangifera indica</i> Maní <i>Arachis hypogaea</i> Ornamentales Malanga <i>Colocasia esculenta</i>	Conde <i>Syngonium podophyllum</i> Bledo <i>Amaranthus spp</i> Mozote <i>Bidens pilosa</i> Hierba buena <i>Borreria spp.</i> Verdolaga <i>Portulaca spp.</i> Bejuco <i>Ipomoea spp.</i> Hierba de golondrina <i>Euphorbia sp.</i> Caminadora <i>Rotboellia cochinchinensis</i> Pata de gallina <i>Eleusine indica</i> Pajón <i>Paspalum virgatum</i> Bermuda, Grama bermuda <i>Cynodon dactylon</i> Zacate de agua <i>Echinochloa colonum</i> Plumilla <i>Leptochloa spp.</i> Salea <i>Digitaria sanguinalis</i> Arrocillo <i>Echinochloa crus-galli</i> Zacate johnson <i>Sorghum halepense</i> Margarita, Morisco <i>Bidens pilosa</i> Picapica <i>Fleurya spp.</i> Zacate de leche, Zacate Honduras <i>Ixophorus unisetus</i> Zacate guinea <i>Panicum maximum</i> Caña brava <i>Paspalum paniculatum</i> Camalote <i>Paspalum conjugatum</i> Coyolillo <i>Cyperus rotundus</i>	- La dosis general es de 8 a 12.5 ml de Basta 15 SL por litro de agua *Café: 2.0 – 3.0 L/ha (1.4-2.1 L/mz) utilizar un volumen de agua de 286 a 500 L/ha (200.2 – 350 L/mz) *Banano y Plátano: aplique una concentración de 0,75 a 1,25 % utilizar un volumen de agua de 300 a 400 L/ha. (210 – 280 L/mz) *Ciperáceas: dosis máxima de 10 mL/L de agua. *Maíz: utilizar un volumen de agua entre 200 a 286 L/ha (140 – 200.2 L/mz) *Uva: utilizar un volumen de agua entre 300 a 400 L/ha (210 – 280 L/mz) *Maní: utilizar un volumen de agua de 250 L/ha (175 L/mz) *Ornamentales: utilizar un volumen de agua de 300 L/ha (210 L/mz) *Resto de cultivos: 2.4 L/ha (1,7 L/mz) utilizar un volumen de agua entre 286 a 300 L/ha. (200.2 – 210 L/mz) *Piña: utilizar un volumen de agua entre 2000 L/ha (1,400 L/mz)

Quequisque <i>Xanthosoma sagittifolium</i> Okra <i>Hibiscus esculentus</i> Ajo <i>Allium sativum</i> Cebolla <i>Allium cepa</i> Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum</i> Camote <i>Ipomoea batatas</i> Berenjena <i>Solanum melongena</i>	Hierba de pollo <i>Commelina sp.</i> Lirio acuático <i>Eleocharis griseipes</i>	*Coco, Malanga, Quequisque y camote: Usar volumen de 300 a 400 lts/ha (210 – 280 L/mz)
--	--	--

USOS AUTORIZADOS EN PANAMÁ:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Banano y Plátano <i>Musa spp</i> Café <i>Coffea arabica</i> Maíz <i>Zea mays</i> Sorgo <i>Sorghum vulgare</i> Papa <i>Solanum tuberosum</i> Cítricos <i>Citrus sp</i> Uva <i>Vitis vinifera</i> Repollo <i>Brassica oleracea</i> var. capitata Brócoli <i>Brassica oleracea</i> var. italica Coliflor <i>Brassica oleracea</i> var. botrytis Hule <i>Hevea brasiliensis</i> Frijol y frijol ejotero <i>Phaseolus vulgaris</i> Algodón <i>Gossypium hirsutum</i> Melón <i>Cucumis melo</i> Sandía <i>Citrullus lanatus</i> Pepino <i>Cucumis sativus</i> Zucchini <i>Cucurbita sp</i> Arvejas <i>Pisum sativum</i> Palma africana <i>Elaeis guineensis</i> Yuca <i>Manihot esculentus</i> Manzana <i>Malus domestica</i> Pera <i>Pyrus communis</i> Piña <i>Ananas comosus</i> Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i> Papaya <i>Carica papaya</i> Ajonjolí <i>Sesamunindicum</i> Aguacate <i>Persea americana</i> Tomate <i>Solanum lycopersicum</i> Chile <i>Capsicum annuum</i> Coco <i>Cocos nucifera</i> Mango <i>Mangifera indica</i> Maní <i>Arachis hypogaea</i> Ornamentales Malanga <i>Colocasia esculenta</i> Quequisque <i>Xanthosoma sagittifolium</i> Okra <i>Hibiscus esculentus</i>	Conde <i>Syngonium podophyllum</i> Bledo <i>Amaranthus spp</i> Mozote <i>Bidens pilosa</i> Hierba buena <i>Borreria spp.</i> Verdolaga <i>Portulaca spp.</i> Bejuco <i>Ipomoea spp.</i> Hierba de golondrina <i>Euphorbia sp.</i> Caminadora <i>Rotboellia cochinchinensis</i> Pata de gallina <i>Eleusine indica</i> Pajón <i>Paspalum virgatum</i> Bermuda, Grama bermuda <i>Cynodon dactylon</i> Zacate de agua <i>Echinochloa colonum</i> Plumilla <i>Leptochloa spp.</i> Salea <i>Digitaria sanguinalis</i> Arrocillo <i>Echinochloa crus-galli</i> Zacate johnson <i>Sorghum halepense</i> Margarita, Morisco <i>Bidens pilosa</i> Picapica <i>Fleurya spp.</i> Zacate de leche, Zacate Honduras <i>Ixophorus unisetus</i> Zacate guinea <i>Panicum maximum</i> Caña brava <i>Paspalum paniculatum</i> Camalote <i>Paspalum conjugatum</i> Coyolillo <i>Cyperus rotundus</i> Hierba de pollo <i>Commelina sp.</i> Lirio acuático <i>Eleocharis griseipes</i>	- La dosis general es de 8 a 12.5 ml de Basta 15 SL por litro de agua. *Café: 2.0 – 3.0 L/ha (1.4-2.1 L/mz) utilizar un volumen de agua entre 400 a 600 L/ha (280 – 420 L/mz) *Banano y Plátano: aplique una concentración de 0,75 a 1,25 % utilizar un volumen de agua de 24 L/ha. (16.8 L/mz) *Ciperáceas: dosis máxima de 10 mL/L de agua. *Maíz: utilizar un volumen de agua entre 200 a 286 L/ha (140 – 200.2 L/mz) *Cítricos: utilizar un volumen de agua entre 286 a 500 L/ha. (140 – 200.2 L/mz) *Uva: utilizar un volumen de agua entre 300 a 400 L/ha (210 – 280 L/mz) *Beras: utilizar un volumen de agua de 400 L/ha. (280 L/mz) *Frijol: utilizar un volumen de agua de 200 L/ha. (140 L/mz) *Cucurbitáceas: utilizar un volumen de agua entre 400 L/ha. (280 L/mz) *Arvejas: utilizar un volumen de agua entre 200 a 250 L/ha. (140 – 175 L/mz) *Mango: utilizar un volumen de agua entre 286 a 500 L/ha. (140 – 350 L/mz) *Ornamentales: utilizar un volumen de agua de 300 L/ha (210 L/mz) *Ajo, cebolla: utilizar un volumen de entre 400 a 600 L/ha. (280 – 420 L/mz) *Piña: utilizar un volumen de agua entre 2000 L/ha (1400 L/mz)

Tamaño completo: 27.21 x 15.21 cms
Tamaño documento: 25 x 13 cms

Ajo <i>Allium sativum</i> Cebolla <i>Allium cepa</i> Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum</i> Camote <i>Ipomoea batatas</i> Berenjena <i>Solanum melongena</i>	*Resto de cultivos: 24 L/ha (17 L/mz) utilizar un volumen de agua entre 286 a 300 L/ha. (140 – 210 L/mz) *Coco, Malanga, Quequisque y camote; Usar volumen entre 100 a 200 lts/ha (70 – 140 L/mz)
---	---

USOS AUTORIZADOS EN NICARAGUA:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Banano y Plátano Musa spp Yuca Manihot esculentus	Paspalum sp., Eleusine indica, Echinochloa colonum, Cyperus spp., Ipophorus sp., Leptochloa sp.	-1,5 – 2,0 L/ha Para Banano y Plátano utilizar un volumen de agua de 24 l/ha (16,8 L/mz) Para Yuca utilizar un volumen de agua de 200-300 l/ha (140 - 210 L/mz)

USOS AUTORIZADOS EN COSTA RICA:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum</i>	Hojas anchas, Gramíneas <i>hirta</i> , <i>Portulaca oleracea</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Rottboellia exaltata</i> , <i>Eleusine indica</i> , <i>Oplismenus burmannii</i> , <i>Amaranthus</i> spp., <i>Solanum nigrum</i> , <i>Drymaria cordata</i> , <i>Richardia scabra</i> , <i>Bidens pilosa</i> , <i>Euphorbia Galisonga</i> spp., <i>Erigeron canadensis</i>	1,5 – 2,0 L/ha utilizar un volumen de agua de 200 L/ha (140 L/mz)
Café <i>Coffea arabica</i>	<i>Meloidia Galinsoga</i> spp., Morisco <i>Bidens pilosa</i> Nabillo enano <i>Cardamine</i> sp. Zacate peludo <i>Paspalum panicum</i> Churrizate <i>Ipomoea</i> sp. Chiquizacillo <i>Richardia scabra</i> Eragrostis <i>Eragrostis</i> sp. Canudo de gallina <i>Eleusine indica</i> Verdolaga <i>Portulaca oleracea</i> Flor amarilla <i>Melampodium</i> sp. Oreganillo <i>Cuphea</i> sp. Pitilla <i>Sporobolus piretii</i> Zacate ratana <i>Ischaemum indicum</i>	2,0 – 3,0 L/ha utilizar un volumen de agua de entre 400 – 600 L/ha. (280 – 420 L/mz)
Yuca <i>Manihot esculentus</i>	Camínadora <i>Rottboellia cochinchinensis</i> Cangrejillo <i>Murdantia nudiflora</i> Lombricilla <i>Peperonia pellicuda</i> Cinquillo <i>Drymaria cordata</i> Chiquizacillo <i>Mitracarpus</i> sp. Clavellillo <i>Emilia fosbergii</i> Chiquizacillo <i>Spemacoco latifolia</i> Botón Blanco <i>Alternanthera nivea</i> Lechilla <i>Euphorbia hirta</i> Pastorcilla <i>Euphorbia heterophylla</i> <i>Meloidia Galinsoga</i> sp. Oreganillo <i>Cuphea</i> sp. Siempre viva <i>Commelina diffusa</i> Pata de gallina <i>Digitaria</i> sp. Florecilla <i>Melampodium</i> sp. Tamarindillo <i>Phyllanthus</i> sp.	2,0 utilizar un volumen de agua de 200- 300 l/ha (140 – 210 L/mz)

Helecho Hoja e Cuero** <i>Rumhora adiantiformis</i>	<i>Commelina Commelina diffusa</i> Camaroncillo <i>Blechnum</i> sp Alternanthera <i>Alternanthera</i> sp Bledo <i>Amaranthus</i> sp Gramilla <i>Cynodon dactylon</i> Morisco <i>Bidens pilosa</i> Cerrajilla <i>Erechtites valerianaeifolia</i> Santa Lucia <i>Ageratum conyzoides</i> Equinodoo <i>Echinochloa</i> sp Zacate peludo <i>Paspalum panicum</i> Comallillo <i>Hydrocotyle umbellata</i> Digitaria <i>Digitaria</i> sp Santa Lucia <i>Ageratum conyzoides</i> Morisco <i>Bidens pilosa</i> Canutillo; Siempre Viva <i>Commelina diffusa</i> Grama, Bermuda <i>Cynodon dactylon</i> Erechtites-Valerianifolius <i>Erechtites valerianifolius</i> Comallillo <i>Hydrocotyle umbellata</i> Paja Brava; Zacate Cabezon <i>Paspalum paniculatum</i> Alambrillo <i>Digitaria</i> sp	1,5 – 2,0 L/ha utilizar un volumen de agua entre 300 a 400 L/ha. (210 – 280 L/mz)
Banano <i>Musa Aaa</i>		1,5 - 2,0 L/ha utilizar un volumen de agua de 24 l/ha (16,8 L/mz)

** Aplicar el producto a una concentración de 0,75 – 1,0% con boquilla 8002.

OBSERVACIONES: El producto puede ser lavado por efectos de lluvia en un intervalo de 2 horas después de su aplicación. Evite hacer aplicaciones cuando se aproximan las lluvias.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Para el cultivo del maíz, proceder así: Primera aplicación: Al momento de la siembra Segunda aplicación: 25 a 45 días después de la primera. Tercera aplicación: A la doble del maíz. Banano y plátano: Aplicar cada 6 a 8 semanas. Otros cultivos: Dependende del tamaño de la maleza, la cual es bien controlada por Basta 15 SL cuando tiene de 20 a 35 centímetros de altura.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Banano y plátano: 0 días. Ornamentales: 1 día. Café: 20 días. Yuca: 15-30 días. Resto de cultivos: 15 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Una vez que el producto sobre la superficie tratada haya secado. En caso de que se necesite entrar antes de este periodo, utilice los equipos de protección individual recomendados.

FITOTOXICIDAD: Basta 15 SL es fitotóxico si se aplica al cultivo. Aplique directamente a la maleza a las dosis recomendadas. Advertencia: Evite la deriva del producto al aplicarlo, pues podría dañar cultivos vecinos.

COMPATIBILIDAD: No se ha demostrado la incompatibilidad de Basta® 15 SL con otros productos. No debe mezclarse con productos de fuerte reacción alcalina. Verifique la compatibilidad con otros productos antes de realizar mezclas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Utilice el equipo de protección personal recomendado consistente en: botas, mascarilla, lentes y guantes. Lavar el equipo al terminar la aplicación: cubetas, paletas de agitación, cepillo, etc. Este equipo debe estar bien marcado y no debe emplearse para otros usos. Una vez realizada la aplicación se debe lavar el equipo. Inutilice los envases vacíos, perforelos y elimínelos según la legislación y las normas locales vigentes. Manéjelo con cuidado para evitar derrames. Si ello ocurre cúbralo con aserrín u otro material orgánico absorbente y luego elimínelo según la legislación y/o normas vigentes.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Conservar y transportar el Basta 15 SL en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No transportarlo ni almacenarlo junto con alimentos, herbicidas, forrajes y medicamentos. Almacenarlo en un lugar fresco y seco.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN, Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE. DOSIFICADOR Y APLICADOR.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación ocular y dérmica, cambios en la postura, el movimiento y la coordinación motora, pilo erección, alteración de la actividad espontánea, temblores, salivación, somnolencia, disminución de la temperatura corporal, alteración de la frecuencia respiratoria, sonidos respiratorios anormales, espasmos y diarrea.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca el vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: Aplique tratamiento sintomático.

En caso de contacto cutáneo, retirar la ropa y accesorios contaminados, lavar/bañar la piel con agua y jabón.

Contacto con ojos: retirar lentes de contacto, luego lavar los ojos con abundante agua o suero salino por 15 minutos. Realizar lavado gástrico utilizando sonda nasogástrica siempre en la primera hora post-ingesta. Realice lavado gástrico con protección de la vía aérea de ser necesario si ha transcurrido menos de 1 hora desde la ingesta del producto, hasta que el agua salga sin olor al tóxico, luego administrar carbón activado a dosis de 1 gr/kg de peso en los adultos y 0,5 gr/kg de peso en los niños, posteriormente administrar una dosis de laxante (si no existe diarrea).

Mantener una correcta hidratación por vía oral o parenteral, garantice adecuada circulación y ventilación. Manejar convulsiones con Diazepam o Fenobarbital.

Tamaño completo: 27.21 x 15.21 cms
Tamaño documento: 25 x 13 cms

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN: INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONO
CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TOXICOLÓGICA	GUATEMALA	(502) 2251-3560/ 2232-0735
HOSPITAL NACIONAL ROSALES	EL SALVADOR	(503) 2231-9262
HOSPITAL ESCUELA	HONDURAS	(504) 232-6105
CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA	NICARAGUA	(505) 2289-4700 ext. 1294/ cel. 87550-983
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES	COSTA RICA	(506) 223-1028
CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS Y TÓXICOS	PANAMÁ	(507) 523-4948

PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.

**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O
CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

NO PERSISTENTE EN SUELO Y AGUA.

**RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRA ÁREAS
FRÁGILES.**

**NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA
ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.**

**ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS
AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO
VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.**

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En caso de derrames o desechos de plaguicidas recogerlos con aserrín o con algún material absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o desechar según la legislación nacional. Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos perforándolos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto. Los residuos del producto y su envase deben eliminarse con todas las precauciones posibles, según manejo y desecho de residuos peligrosos.



**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE
FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTÍA: Las instrucciones para el uso de este producto reflejan los resultados de la experiencia de la compañía basada en ensayos de campo y uso práctico. Dichas instrucciones se creen dignas de confianza y deben observarse cuidadosamente. Es imposible, sin embargo, eliminar los riesgos inherentes al uso de este producto. Cualquier daño a la cosecha, falta de eficacia y otras consecuencias involuntarias, pueden ser el resultado de factores que están fuera del control de BASF, como condiciones climáticas, presencia de otros materiales, el método de uso o aplicación. El usuario debe asumir dichos riesgos. BASF y el registrante sólo garantizan que el producto se ajusta a la descripción química de la etiqueta y que es razonablemente apto para los usos descritos en el panfleto, cuando se usa de acuerdo con las instrucciones y sujeto a los riesgos mencionados anteriormente. **BASF NO DA NI AUTORIZA A NINGÚN AGENTE O REPRESENTANTE PARA DAR NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA Y NO PRESTA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO.** Los periodos de carencia indicados en el panfleto son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.

FORMULADO POR:

Bayer S.A. km 29,5 Ruta al Pacífico Amatitlán, Guatemala Tels. 6628-7200 / 6628-7211

IMPORTADOR:

GUATEMALA: **BASF Guatemala**
Avenida Petapa 47-31, Zona 12, Ciudad Guatemala, Guatemala.
Tel.: 2445-7600, Fax: 2445-7698

COSTA RICA: **BASF Costa Rica S. A.**
Los Balcones, Plaza Roble, Escazú.
San José, Costa Rica
Tel.: 2201-1900, Fax: 2201-8221

EL SALVADOR: **Agroquímica Internacional (AGRINTER)**, Km 31 Carretera a San Juan Opico Sitio El Niño, La Libertad, El Salvador.
Distribuidores e Importadores Agrícolas (DIAGRI S.A DE CV). 6a Calle Ote. N° 24, Rosario la Paz Depto. La Paz, El Salvador C.A.
EL SURCO SA DE CV. 4ª. Avenida sur y calle Daniel Hernández No. 2-9 B, Santa Tecla

PAÍS

BELICE
GUATEMALA
NICARAGUA

Nº DE REGISTRO

0293-2
78-198
BY-127E-2-2005

NÚMERO DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO: